






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
6173/A







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
6173/A






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
6173/A




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
6173/A





DEBACQ LIBRARY









6173/A


L XXXIII
































42472  
METHODVS

# MEDICAMENTA

COMPONENDI,

EX SIMPLICIBVS

*iudicio summo delectis, & arte*

*certa paratis, quatuor li-*

*bris distributa:*

AUTORE D. IACOBO SYL-

VIO MEDICO.

*Indice adiecto copiosissimo.*

IN  
VIR  
TUTE,



ET  
FORTVNA.


LVGDVNI,

Apud Gulielmum Rouillium,

sub Scuto Veneto,

1556.

*Thibault  
Douten  
cor  
Mide  
Cone*








PETRO CA-  
STELLANO, TVTE-  
LENSIVM EPISCOPO,

IACOB. SYLVIVS  
MEDICVS

S. P. D.



*IUVINA M ac  
memorabilem illam in  
nos benignitatem cum  
studiosissimus quisque  
hominem iuvando pro-  
ximè imitari contendat: nulla tamen  
ratione alia plenius exprimit, quàm  
morbis tutò profligatis sanitatem pristi-  
nam restituendo: idque per usum causa-  
rum, quas ob id sal. res, appellamus.  
Inter quas licet magni sint momenti,  
aer, motus, cibus, potus, primas tamen*



medicamenta tenere optimo iure videntur, ut quæ maxima vi sua morbos etiam grauissimos plerunque tam celeriter propulsent, ut horum opus miraculi loco habeatur. Quapropter ea Deorum manus rectè vocauit Herophilus & Apollo, Aesculapius, Hippocrates, aliique non pauci celebres medici pro Diis sunt habiti. Et cum cunctis propè mortalibus insita sit per medicamenta curandi cupiditas, ac tu præcipuo eorum cognitionis studio incendaris, hæc me ratio vna commouit, ut amplitudinem tuam aliquo meorum laborum fructu recrearem: nec ea tamen sola, sed honestam cogitationem hanc nostram vehementer auxilium singularis tua, & cum omnium rerum bonarum cognitione coniuncta eloquentia, tum incredibilis in omnes literarum studiosos benignitas: quibus raris & maximis virtutibus nil mirum, si tam repètè clarissi



## NUNCUPATORIA. 5

clarissimus euaseris, dum docti omnes  
 certatim ore uno summa de te omnia;  
 uti res habebat, predicarent, teque non  
 modo studiorum praestantissimorum, sed  
 etiam peregrinationum & longinqua-  
 rum & multarum labris maximis  
 tam feliciter perfunctū, honoribus am-  
 plissimis iam perfungi dignissimum,  
 honorificentissimè apud omnes in clama-  
 rent. Rex verò noster Franciscus, mu-  
 sarum omnium pater ac illustrater ma-  
 gnificentissimus, hac adductus fama,  
 ultrò te in suorum primorum cliente-  
 lam accersuit, summamque tuam in  
 dicendo fecunditatem, perspicuitatem,  
 felicitatem admiratus, summis vite or-  
 namentis honestandum te & beandum  
 nulla mora censuit: sicque tua dicta am-  
 plexatur, sic fouet, sic praesentibus omni-  
 bus exosculatur, sic ex te recipit omnia,  
 tanquam ex tripode pronuntiata: ut si  
 quando vel te aliis, vel alios tibi (ut serè



in sermone sit) contradicendi cupiditas  
ceperit, quæ tibi libertas & modestia in  
refellendis, quæ facilitas in transmitten-  
dis aliorum sententiis parum probabili-  
bus, quæ denique dignitas in veritate  
asseranda? quem Lysiam, quem Plato-  
nem, quem Periclen, quem Demosthe-  
nem, te ceteris velut egide quadam eru-  
ditionis tuæ stupefactis audiendū exhi-  
bes? Quibus omnibus in quavis encyclo-  
pædiæ parte sic apud Regem flores, ut  
cum Rege summa sis in gratia. Quod si  
principibus viris placuisse laus sit præ-  
cipua, ut ille dicebat, quis pro dignitate  
felicitatem omni humana laude maio-  
rem satis commodè laudauerit? qui non  
principibus viris tantum places, verum  
etiam Regi Francisco per places, omnium  
qui iam sunt Regum gloriam, atque  
etiam ipsius antiquitatis memoriã vir-  
tute sua facile superanti, siue rei milita-  
ris scientiam, siue literarum omnium  
bona-



## NUNCUPATORIA. 7

bonarum amorem, & honorem & cognitionem, siue autoritatē, siue felicitatem in eo summam spectare libet. Quæ rara & maxima Regis Francisci ornamenta quoniam plenius attigi, tum pœmatio de memorabili ipsius & Henrici Anglorum Regis ad Ardeā conuentu, tū libello alio à me superioribus proximis mensibus conscripto de salubri ipsius viuendi ratione: plura nunc dicere supersedebo, cum hoc tātum dixerō, à Francisco Rege nostro vita longissima dignissimo Ptolemæum Philadelphum Aegypti regē, Attalūque Pergami, & si quos alios publicæ hominum utilitati natos Reges idem studium tenuit, in bibliothecis omni genere librorū celebrium instruendis longè exuperari. Nam illi pecunia mediocri singulas singuli bibliothecas collocupletarunt: at noster Franciscus innumerabiles bibliothecas sumptu maximo ea ratione exor-



nauit, & exornādas collocauit, ut nullo  
 unquā euo desitura videantur. Nōne  
 gloriosius est longē, ac multo magnificen-  
 tius, libros omni genere disciplinarum  
 bonarum refertissimos ex penitissima  
 Gracia, et regionibus aliis pecunia gran-  
 dissima coemptos, in Galliāque conue-  
 ctos non in bibliothecas tantum regias  
 coniecisse, sed manu fideli descriptos, ty-  
 pographia planē admirabili excusos, in  
 omnium bibliothecas contulisse: quā ma-  
 gnificētia quid diuinius, quid Rege  
 maximo potentissimōque dignius dici  
 aut fieri potest? Ad hæc tamen omnia,  
 adiecit amplissima virorum Latine,  
 Gracē, Hebraicē doctissimorū salaria:  
 p̄rque omnes literarum bonarum ordi-  
 nes statum Parrhisius florentissimū sic  
 tenent, ut nec melius, si Apollo ipse cum  
 Musis adesset, tenerent. O te tēque  
 quaterque fortunatam Galliā, quæ Re-  
 gem sortita es sapiētem, & omni sapien-  
 tia



## NUNCUPATORIA. 9

tiæ studio fauentem, quantum aliorum  
mortalium fauit vnquàm nemo. Cùm  
verò ad præclara hæc facinora propen-  
sum maximè magnū & sanctum Re-  
gem, & ad optima quæque natum regis  
animum consilio, opera, studio incitare  
non desinas, Castellane undecunque ab-  
solutissime, docti omnes habent, cui plus  
quàm tibi debeant, neminem, tuisque  
successibus prosperis gratulantur.

amplicrèsq; exoptant, &

obsecrant. Vale, & in

bonam partem


accipe hoc

nostrum


magnarum in medi-

cina rerum ru-


dimentum.



A S







DE MEDICA-  
MENTORVM SIMPLI-  
CIVM NATVRA, EX DIO-  
SCORIDE ET GALE-  
NO, ET ALIIS,

LIBER PRIMVS.



SIMPLEX composito prius  
natura & doctrina esse, tum  
rerum omnium cōditio, tum  
Galenī scripta vbiq; demon-  
strant. Propterea nobis com-  
posita medicorum pharmaca in melius ad  
veterum methodos reformaturis, de Sim-  
plicium notis & viribus, quæ Dioscoridi  
præcipue & Galeno scripta sunt, paucis  
agendum est: idq; totum in quosdam com-  
munes locos reducendum, quod etiam Dio-  
scoridi placuisse magis video, licet vbiq;  
id tam sollicitè non obseruarit. In singulis  
verò ipsis communibus locis ordinem al-  
phabeti (quod & Galenus fecit) sequemur.  
Quoniam verò multæ plantarum quarun-  
dam partes medicamentosæ sunt, ob idque  
in



in locos plures incidere debent, eas tamen omnes vno in loco perstrinximus, quem index palam commostrabit, ne res eadem aliquoties nobis repeteretur. Porro locos ipsos sumemus à plantis, animalibus, metallicis & terreis corporibus, à quibus non medicamentorum modò, sed etiam alimentorum materiæ accipi consueuerunt. Sed ne locorum multitudo lectori memoriam turbet magis, quàm promoueat, & inuentionem quæsitæ rei etiam remoretur, quæ ad metalla & terrea corpora pertinent, loco vnico concludemus omnia: quæ item ad animalia tota, & ipsorum quorundam partes, tam similes quàm organicas, in vnum coniiciemus locum. Ipsas verò plantarum partes, quia numerosæ sunt, & in cuiusque genere ampla est ceu familia, in plures locos digeremus, ordinem quendam naturæ sequuturi: primùm radices, & folia molientis: deinde flores, fructus, semina, & alia permulta, quæ omnia sequens diuisio planiora fecerit. Neque hic expectes omnium simplicium naturam omnem audire. Id enim Dioscoridem, Galenum & aliorum de re simplici commentaria describere fuerit. Mihi verò propositum est, ea tantùm simplicia leuiter attingere, quibus ad cõponenda libro quarto medicamenta  
est



est opus : eorūq; simplicium eas præcipuè  
 facultates explicare, quibus potissimum ad  
 vires illorum compositorum pernoscendas  
 egetur. Nec mireris Arabum quædam sim-  
 plicia hîc à me adscripta: hæc enim inuen-  
 tas ab his compositiones aliquot non ne-  
 gligendas magna parte complent : ob id  
 ex illorum libris vtcunque mihi perstrin-  
 genda fuerunt. In hoc autē labore si meum  
 studium doctis viris probari agnouero, ad  
 alia his maiora, de simplicium medicamen-  
 torum materia inuitabor. Quod si in hoc  
 libro quædam desideret pharmacopœus,  
 discat non sibi scripta hæc, sed medicinæ  
 studiosis potius : expectetque librum sibi  
 peculiarem de singulorum medicamento-  
 rum simplicium exacto delectu, illi maxi-  
 mē ad probas medicamentorum compo-  
 sitiones necessario : post hunc alium de his  
 quæ ad conficiendam rectē quauis com-  
 positionem sunt vel vtilia, vel etiam neces-  
 saria : ac tertium præter hos compo-  
 sita propè omnia complecten-  
 tem, & in singulis com-  
 ponendi modum pla-  
 nissimē expli-  
 cantem.

Plane



Medica-  
menta  
sumun-  
tur à

Plantis, &  
harum par-  
tibus simila-  
ribus & dis-  
similaribus

Radice.  
Floribus.  
Stipite.  
Ramis.  
Surculis.  
Foliis.  
Fructibus.

Seminibus  
Corticibus.  
Succis.  
Liquoribus  
Resinis.  
Gummis.

Animali-  
bus totis

Vulpe.  
Hirundine.  
Motacilla.  
Galerita.  
Limacibus.  
Cicadis.  
Cantharidibus.

Canceris.  
Ostreis.  
Buccinis.  
Purpuris.  
Lumbricis.  
Tinca.

Partibus  
animalium.

Organicis

Capite manidum.  
Hepate lupi.  
Testibus fibri.  
Renibus scincorum.  
Corpore toto vipera ex-  
cepta cauda, & capi-  
te, pelle, interaneis.

Similaribus

Pinguedine.  
Adipe.  
Cerebro leporis  
Medulla.  
Osse.  
Dente.  
Coagulo.  
Lacte & eius partibus.  
Sanguine.  
Tunica interna ventri-  
culi.  
Vnguibus caprarum, a-  
sinorum.  
Cornu cerui, unicornis  
Glutino tauri.  
Sene & a serpentis.



Medi-  
camen-  
ta item  
sumun-  
tur ab

Anima-  
liū excre-  
menta,

Stercore canum, luporum,  
puerorum, bubulo, caprino,  
columbino.

Felle. Sudore.

Urina. Salina.

Sorde. Lana succida.

Pilis.

Ovis.

Ceu excre-  
mentis.

Melle.

Cera.

Lacte.

terreū  
corpo-  
ribus

Marinis,  
ut

Salibus, & eius par-  
tibus.

Adarce.

Spongia. Alcyonio.

Nitro.

Asphalto.

Terra  
multipli-  
ci.

Pumice Pyrite.

Iaspide. Sapphyro.

Iudaico. Gagate.

Smarag. Hematite.

Lapidi-  
bus, ut

Metal-  
licis, ut

Salibus, nitris fossitis,

auripigmento, sanda-


racha, sulfure, cad-

mia lithargyro, chal-

citi, auro, argento, etc.

& horum partibus.





**R**ADICIBVS plantæ omnes alimentum sibi familiare, dulces dulce, amarum amaræ, & reliquæ ad portionem ex terra ipsa trahunt. Vnaquæque suo tempore potissimum in solo & sub cælo cuiusque naturæ magis propitio. Neq; enim omnis fert omnia tellus: neque cælum quoduis est plantis omnibus amicum, sed trahit sua quamque tanquàm voluptas quædam, qua incitantur plantæ stata anni parte ad alimentum copiosius è terra trahendum: quo habitiores redditæ edunt surculos, folia, flores, fructum, aut semen. Hæc posteriora veluti scopum quendam naturæ plantis cum animalibus communem: ambo enim sibi simile modis omnibus moliuntur excitare, vt si immortalia omnino non sint, saltem quadantenus sint immortalibus proxima, specie per tot supposititia singularia perennante. Hinc animalibus foetuum cura est præcipua, & quod mireris, plantis ipsis semina & fructus (in quibus spes sua est successionis) sic vestientibus, ornantibus, muniuntibus, armantibus. Quam rem cum sequentibus & aliorum de simplici materia libris, tum vel maxime admirabili & adorando naturæ in plantarum partibus artificio aperte deprehendas. Sed de radicibus  
prim



primum sermo nobis est, quas tum præcipuè euellat medicus, cum medicamentosæ sunt maximè. Quæ dos omnibus eodem non inest tempore, sed aliæ alio vegetæ magis sunt, quod suis locis audies: quanquam sunt qui putent omnes radices legendas autumno, vbi folia deciderunt: alij veris initio, priusquam in folia aut caulem erumpant. Omnes tamen integræ sunt, si fieri potest, vellendæ, & vnaquæque in solo & cœlo naturæ ipsius maximè familiari, bene nutritæ, bene habitæ, non præ alimenti copia enormes, neque ob inopiam strigosæ: tenues, rugosæ: mox aqua lauandæ, & radiculis portionem quandam alimenti repentibus & stolonibus etiamdum trahentibus purgandæ: post (nisi vtendi recentibus aliqua incesserit vel commoditas vel necessitas) siccandæ: quædam vmbra & vento, vt apij, fceniculi, iridis, & quæ aliæ sunt vel minores, vel ficciores, vel rariores, quarum vires sol ceu ignis promptè dissipet: quædam contrariè dictis sole & vento, vel igni siccantur, si cœlum est nubilum, aut hyems: & sepe versandæ, ne mucidæ aut putridæ fiant, vt bryoniæ: gentianæ, mandragoræ, rhei pontici. Si verò siccatis citò est opus, patellæ ignitæ impositas sepe versandas siccabis. Quædam item

b



integræ siccantur: vt gentianæ: aliæ in ta-  
leolas dissectæ, vt iris: aliæ lignosa matrice  
(sic enim cor plantarum Gaza ex Theo-  
phrasto vocat) adempta, vt fœniculi, petro-  
selini, apij. Deinde reponuntur loco non  
insolato, non infumato, non humido, non  
puluerulento: sed sublimi, puro, sicco, aut  
septentrionem, aut potius meridiem spe-  
ctante, præsertim quando hunc plantæ  
quedam adhuc humidiores requirunt, mo-  
dò non flent austri. Eadem quandiu vege-  
tæ adhuc sunt seruandæ, parvæ scilicet ac  
tenues & raræ, vt asari, asparagi anno tan-  
tum: quâvis elleborus vterque etiam trien-  
nio seruari possit, vt magnæ & crassa essen-  
tia præditæ, bryonia, rheon ponticum, ari-  
stolochia, gentiana. Hæc autem tria, colli-  
gendi tempus legitimum, repositio com-  
moda, & duratio, nō in radicibus solis ob-  
servanda sunt sed etiam in aliis plantarum  
partibus, atque adeò quibusdam animalium  
aliquorum partibus, vt sanguine hircino,  
*Li. I. ant.* hepate lupi, pulmone vulpis, vesica apri. Pro-  
pterea chamæpityn, chamædryn, thlaspi, cē-  
taurium, polium hipericum, aliâque, floren-  
tia capiebat Galenus, theriacem, vel aliud  
medicamentum compositurus, non sole  
æstiuo siccata, neque dum fructus eorum  
adhuc crudi & imperfecti sunt. Iuber  
idem



idem continua speculatione cognoscendum, quando fructus sunt futuri, quando aduntur, quando augmentur, quando denique vigent. Quo tempore potissimum eos commodè decerpas, & in siccis domunculis repositas custodias, ne à solis radiis vrantur, neque humiditate à tecto, vel muris madefiant. Ob id domo non vult subterranea eos reponi nec aliis vicina, neque sub tegulis, sed horum media, quæ ostia meridiem spectantia habeat: propè quæ tamen medicamenta ne reponas. Omnia igitur legenda, quando summarum sunt virium, & accusandi tum mercatores, tum herbarij, qui radices, liquores, succos, flores, germina, fructus extra anni tempus carpunt, & in vrbes conferunt. In quibusdam & astrorum observatio valere putatur. Pæoniæ enim radix ad epilepsiam legenda decrescente luna quibusdam videtur, & alysson sub æstu caniculæ vult legi Galenus: vt Aeschriun caneros fluuiatiles capi contra rabiem, vnde est herbæ nomen: tanquam vis quædam illis contra rabiem à fide accedat, rabiem canibus afferente. Plantas item calidas ex calidis regionibus, & ex harum editis & siccis locis, vt Cretæ mōtibus, præfert Gale. vt abundè in methodo medicamenta componendi audies. Neque velim

*Lib.3. cō.  
ph.p.gen.*

*Li.2.ant.*


*Galenus  
in horum  
simpl.vi-  
ribus.*

b. 2.



lectorem latere, multas efferri plátas per vs  
vel os masculinè, interdum etiam fœmini-  
nè vel per vim vel on genere neutro : vt a-  
corus, elleborus, hyssopus, fœniculus, cro-  
cus, lupinus, peucedanus, œsypus, vel aco-

*Libr. 10.* rum, eleborum, vt ὁ βούτυρος καὶ τὸ βούτυρον:  
*sim. & 4.* ὁ πῦρ καὶ χαλκάνθη, καὶ τὸ χαλκάνθη: ἢ ἔμπλα-  
*c. ph. rat.* τρη. ἢ ἀντίδοτ., καὶ τὸ ἔμπλαττον, τὸ ἀντί-  
*et 1. ph. g.* δόττον, ἢ ππ. præterea, id est equus in com-  
positione cum nominibus plantarū signifi-  
cat magnum vt βούς, id est, bos: quod do-  
cent hipposelinum: hippomarathrum: hip-  
polapatum: vnde opinor nostratibus iu-  
glandes caballinae vulgò vocatur omnium  
maximæ.



**A**corus gustu acri, & modicè  
amaro, odore iucundo, tenui  
consistentia, calidus siccus ordi-  
ne tertio Gale. libro 6. simplic. Is  
nunc esse videtur quibusdam Calamus  
aromaticus, aliis potius Galanga. Quibus  
repugnat Actuarius in antidoto aurea A-  
lexandri, in qua γάλαγγα (sic enim cum  
Arabibus vocat) & multis interiectis aco-  
rum, eodem pondere: ad finem verò cala-  
mum aromaticum pondere diuerso misce-  
ri scribit. Acorus omnino verus magnitu-  
dine ireos, galanga maior hodie vulgò di-  
ctus,



Atus, mihi Tornaco missus à Nicolao Godino eius vrbis præstantissimo medico. Ignotus tamen quibus adhuc est, eius loco galangam magno successu miscuerint: interdū calamū odoratū. Qui verò nobis frequens ostenditur, palustris acorus est, insipidus, inodorus, substantia crassa, frigidus ficcus: à xyri planta acri nobis notissima diuersissimus: quadripertito tamen sectus & sole siccatus, triennio seruatur: non vtendus hic, nisi Medicus imperauerit.

Veri autem prouentus nunc vberimus Lugdunū & in alias Galliaë vrbes celebriores conuehitur ex India: Lusitanorum (vt audio) nauigationibus.

**A** Garicus tanquàm fungus est enatus atrūcis arborū præcipue glādiferarum, vt illicū: toto cōtextu est rariore & fungoso, sed facie summa & mucrone est solutior: sede verò & radice semilignosa & semiputri, ob id ablicienda. In eo fœmina relictis venarū discursibus fracta cōstat, qui dentū murinorū vestigia in caseo duro repræsentent. Eadē leuior, rarior, mollior, albior, breuior, friabilior, splendidior, proinde præstantior. Mas verò in fracturis filosus nervorū modo, grauis, densus, durus, niger, lignosus, longus, interdū rotundus, sed vbiq̃ue compactior: neuter adulterationē re-

*Diosc. &  
Gal. li. i.  
antid. &  
li. 6. simp.*



*Gal. li. 6.  
simp.*

*Dioscor.*

*Lib. I. an  
ti. Gal.*

cipit. Vtique sapor est initio dulcis, mox amarus, tandem etiam subacer, & subastringens: vnde incidit, tenuat, terget, digerit, obstructa liberat. Vis autem phlegmagoga, hoc est, pituitæ purgatrix, stomacho aduersa: virtus tamen omnibus internis ab ea nati saluber est in omni ætate, ob quæ medicamentum familiæ veteribus est dictus. Datur drachmæ pondere seu à scrupulis duobus ad drachmas vnam pro ægri natura, ætate, viribus, consuetudine, & morbi natura & tempore cum vino, vino nō diluto, vino mulso, sapa, aceto, aqua, hydromelite, oxymelite. Quinetiam stomacho solutis, vt cibi tenax non sit, & acida ructantibus mādatur, & sine humore deuoratur Diosc. Nobis omnibus nauseabundus est, fortasse quia deterior nunc ex Alpibus Gall. & nostro Delphinatu affertur, quàm quem maiorib<sup>9</sup> mittebat Agaria Sarmatiæ regio (à qua illi nomen) & Galatia & Cilicia. Ponticus Andromacho iuniori in Theriaca probatur. Mendum igitur videri iure queat in fine libr. noni composit. phar. part. vbi suffocatis ab vtero datur 50. α. hoc est, vncia vna cū vino pro drachma vna. Corrigitur vino, zingibere, caryophyllis, nucem moschata, vel aliis stomachicis. Seruatur annis quinque integer, præcipuè cū dauco,  
lib



libystico, polypodio. Non solum autem sumitur, sed etiā foris admouetur, vt Galenus docet lib. 6. simpl. & in fine lib. 10. comp. ph. part. in ischiadicis remediis. De agarico autem inter radices agimus, quod is dicitur radix Dioscoridi, & Galeno li. 6. simpl.

Althæa siue Ebiscus est malua agrestis, foliis vt cyclaminus rotundis, lanugine canescentibus, flore rosaceo, caule bicubitali, radice lenta, intus alba, subastuigente. Partibus suis omnibus digerit, laxat, phlegmone leuat, mitigat, coquit abscessus coctu difficiles adipibus incocta & subacta. Radice autem & semine tenuiorum est partium, magisque tum siccatur, tum terget. Althæa autem dicitur, quod inter primas sit utilis, & pluribus polleat remediis, Diosco. Apium satium est, cui gratia vulgò est, cuiusque rami largis portionibus per iura innatant, & in condimentis peculiarem gratiam habent. Quæ Plinij verba nostrum vulgare petroselinū magis indicant: atq; idem σέλινον ἐνοδμον, id est, odoratum, Theocritus 3. εἰδύλλιον vocat. Sed apiū vulgare est Diosco. & Gale. Eleoselinū, hoc est cum Gaza, Paludapium, quia in paludibus & secundum aquæductus nascitur. Petroselinum autem verū ex Macedonia asperis & præruptis petendum, vt Gale. docet libr. 1. de

Lib. 2. alim.  
ment. &  
li. 6. simpl.  
ἀλθαίω  
& ἀλθίω  
curo, me-  
deor.

Pli. c. 11.  
lib. 10.



antido. de quo in litera P. Quod verò Macedonicum petroselinum vulgo dicitur, est hipposelinum, quod olus atrum seu pullum à Latinis appellari Hermol. Ruel. Marcel. in Dioscoride inscripserunt, quod meus codex Græcus non habet. Galenus autem verum Smyrniū (id est, vulgare Leuisticum) ἰλῆσαλλον Romæ vocari iam consuetum scribit lib. 2. aliment. Omnia hæc selinorum, id est, apiorum genera idem pollent tota, sed semine sunt potentiora, & in his præcipuè Macedonicum calidum siccum ordine tertio.

Ari radix vt dracunculi, ex fimo bubulo podagris illinitur, eiusdem cortex splenicos iuuat & hydropicos, Galeno lib. 9. composi. phar. part. calida sicca primo ordine: incidit, tenuat, terget mediocriter.

*Gal. li. 6.  
simpl. &  
lib. 1. ant.*

Aristolochia, quia sit ἀρίστη λοχόσσις, id est parturientibus optima & salubris, Dioscoridi & Galeno triplex, radicis figura præcipuè distincta. Quæ primo generi est tuberosum modo rotunda, ob id & malum terræ dicitur: secundo digiti crassitudine, dodrante longa: vnde (opinor) dactylitis dicitur li. 2. comp. phar. gene. & libr. 7. composi. phar. part. in arteriace Andromachi 16. Tertio longissima, quasi vitium nouellarum, ob quam clematitis, id est, sarmentosa dicitur.

Huius



Huius fructus putatur quibusdam *λόκκον* orientis, vulgo Gallorum dictus, stupefaciendis piscibus efficax, quam vim Plinius rotundè tribuit. Quartum genus addit Plinius Pistolochiam seu Polyrrhizon omniū tenuissimam, densis radicis capillamentis iunci plenioris crassitudine. Omnes valent tantum radice amara & subacri, sed rotunda omnium est substantia tenuissima: longa verò terget moderatiùs: clematitis, quia odore est gratiore, & cortice carnosio ad vnguenta (nardina Plin.) est quàm ad medicationes aptior. Præfertur Pontica. & huic Cretenfis libr. 10. composit. phar. part. Effodienda est mensesibus, & desquammato terreno seruanda. *Pli. libr. 25.c.8.*

Asarum Galli olim Bacchar vocabant, nunc syllabarum metathesi Cabaret. Valet foliis, flore, semine, sed efficacissimum est radice, ellebori albi modo purgatoria. Dioscorid. Galenus tamen in hiera picra etiam asarum recipiente solam aloën purgatoriam vim habere scribit: asarum verò humores malos ad vrinas deducere. libro 8. comp. phar. part. & libr. 6. simpl. vires habere radicis acori sed valentiores. Fodienda est cum folia mittere incipit, & in sole siccanda (nisi recens vtenda sit) quia in umbra situm celeriter trahit & senescit, præ-



tipue ex locis riguis, ex macris autem & fientibus ( quæ imprimis amat ) minùs est putredini obnoxia.

Asphodelus Latinis Hastula regia dictus, à caule insigni ex multis radicibus bulbofis emicante, quibus agnatis abundat, interdum ad 80. Radice utilis est tergente: eadem vsta magis calfacit, siccatur, tenuat, digerit. Nunc porcorum cibus est, olim etiam hominum, muribus venenum. Autumno legitur, cum valet plurimum.

*Lib. 2. aliment.  
li. 6. simpl.*

Asparagus, vel Atheniensium more per ph, Aspharagus, vel etiam aphæresi, Sparagus: generatim quidem est coliculus teneior herbæ, fruticis, arboris, ad fructum & semen increescens: speciatim verò herba vulgo nota, eaque duplex. radice utilis & semine ad detergendas renum & hepatis obstructions. Regij, qui in hortis nascitur, & Helij, id est, palustris, meminit Galen. libr. 2. alimentorum: & huius etiam initio libr. 9. comp. phar. part. ad icterum: & illius libr. 5. simpl. Petræi autem libr. 6. simpl. qui post inuentos altilis asparagos Corrua propriè dicitur: Polluci autem sylvestris asparagus. Hic multò est satiuo efficacior. In asparago mas à fœmina semine separatur.

*Gal. li. 5.  
simpl.*

**B** Ryonix, seu vitis albæ radix terget, siccatur, & moderatè calfacit: ob hoc induratos



ratos lienes liquat sumpta: & cum ficis ad-  
mota: & pforam & lepram sanat, fructus ve-  
rò eius maturitate ruber, racemosus, est Psi-  
lothrum vt planta ipsa. Nam ἀμπέλου λου-  
κήν βρυωνίαν καὶ ψιλωθρον λελεῖσι. Gal. lib. 6.  
simp. tamen ἀμπέλου λουκήν & βρυωνίαν sepa-  
rat lib. 1. compo. phar. part. in pilos corrump-  
entibus medicamentis.

Behen serapioni duplex, alba & rubra,  
magnitudine radicis pastinacę parue, calida,  
humida, odora, semen augens. ex Armenia  
defertur. Earum loco, si id solum possunt,  
Eryngij radicem substituerē potius, quàm  
radices nescio quas nobis ab institoribus  
venditari solitas: sed Ben eidem vt Mesue  
est Galeni Balanus myrepfica, de qua in  
Fructibus audies

**C**alamus aromaticus λέλαμϑ ἀρωματισ- Gal. li. 7.  
κός Dioscorid. Galen. μυριφύκτος, id est, simpl.  
unguentarius Hippocrati, Arabicus Plu-  
tarcho, Alexandrinus Celso: calidus siccus  
ordine secundo, leuiter astringit, minimū  
acer est, partium nonnihil tenuium reme-  
diis ventriculi & hepatis calidis misceri  
potest, ac menses mouentibus. Melior est  
fuluus, intus albicans, odore fragrantissi-  
mo, densè geniculatus arundinis modo,  
cætera mollis tactu, lentus in frangendo: Dioscor.



totus, raphani in morem rumpitur: fistula  
 intus plena araneorum, casia gustu, astringens, & cum quadam acrimonia amarus, in  
 mandendo glutinosus: In India nascitur,  
 triennio seruatur. Capparis radice cor-  
 tex amarus, acer, acerbus, terget, purgat,  
 tenuat, incidit, digerit, constringit: lienes  
 induratos & ischiadas ob hæc magnificè  
 iuuat, sumptus vel cum idoneis remediis  
 admotus. Eadem radix etiam hepatica est,  
 libr. 8. composi. phar. part. & splenica, lib. 9.  
 eiusdem. Flos eius & fructus aceto & sale  
 conditus primis mensis ad excitandam ap-  
 petentiam sumitur, licet stomacho noxius,  
 siticulosus, aluum turbare Dioscoridi dica-  
 tur. Folia capparis trita cum mero pota sple-  
 nica. lib. 9. composi. phar. part. admotà cum  
 virium vehementiam obtundentibus chœ-  
 radas sanant. Centaurij magni radix a-  
 cris, astringens, subdulcis, & subamara: vl-  
 cera glutinat, sanguinem reiciētibus pro-  
 dest: à Chirone Centauro Herculis sagit-  
 ra vulnerato inuentum & nominatum Cē-  
 taurium: annis decem seruatur Theophra-  
 sto. Centaurium autem minus radice in-  
 efficax est, foliis & flore utilis, subastrin-  
 gens: ob amaritudinem Fel terræ dicitur  
 Plinio. Cyperis seu radix cyperi calfacit,  
 siccatur sine morfu, subastringit, incidit, vlce-  
 ra



ra præhumida cicatrice claudit, calculos frangit, vrinam & menses mouet, oris halitum commendat, vt lignum aloës verum. Cyperus Indicus inter zingiberis radices inuētus Curcuma Venetiis dicitur. Ad odoris gratiam Cyperus additur tenuantibus capillos, libr. i. composi. phar. part. à figura caulis iuncus triangularis Plinio dicitur: quadratus Celso, licet rarò sit quadrangulus: angulosus Dioscoridi non definito angulorum numero. Cyperus Babylonicus Galanga (de qua mox) quibusdam dicitur, vulgaris scilicet ac minor: nam maior Acorus esse dicta prius est.

Cyclamini radix tota vehementer medicamentosa, magis eiusdem succus: incidit, terget, ora venarum aperit, trahit, digerit, illitus abdomini ventrem purgat, per nares trahit, cum melle illitus suffusos iuuat, scirrhus mirè emendat, menses & sudores mouet. Costus subamarus, modicè astringit, aceradeò & calidus, vt vlceret, Gal. lib. 7. simpl. & libr. 8. compo. phar. part. mihi Lugduno missus à Carolo Paludano eius vrbis medico iure primario, si Hieronymum Montuum nulli eruditione secundum exceperis. Costus præcellit Arabicus, candidus, leuis, eximia odoris gratia, recens, abundè plenus, densus, siccus, à teredinibus non

*Panisporcin<sup>9</sup>, quia porcis gratus.*

*Dioscor.*



non erofus. Secundus eft Indicus, vber, le-  
uis, niger. Tertius Syriacus, grauis, colore  
buxeus, odore feriens. Costus Arabum dul-  
cis, & amarus, Græcis indiētus: fed *λίγος* &  
*γλυκὺς* Arabas paſſim imitanti Actuario di-  
citur in ſecundo Dialachan, & paulò poſt  
in diaromato. Coſtus autem hortēſis, herba  
quanquàm amara eſt, fuerit magis Piperitis  
aut Siliquaſtrum Plinij.

Cucumeris agreſtis radix terget, digerit,  
emollit: potētius eius ſuccus, Elaterium di-  
ctus, ſummè amarus ordine ſecundo cali-  
dus: menſes mouet, cynanchis cum melle  
illinitur, ictericis cum lacte in nares trahi-  
tur & cephalalgicis.

**D**Aucus ſemine vehementer calet præ-  
cipuè agreſtis, triplex Dioſcoridi, Se-  
minis ſolius in aliis generibus uſus inua-  
luit, in cretico etiam radicis. Ob id Dauci  
Cretici radices ſcribit Gal. libr. 9. comp. ph.  
part. in malagmate diſpermatōn.

*Dioſcor.*

Dictamnī radix guſtu calfacit, partus ac-  
celerat. Folia eius pulegio ſimilia, maiora,  
denſa lanugine obſita, in uſu ſunt præcipuo  
ad ic̄tus & morſus venenatos, ac cætera, quæ  
præſtat pulegium: quo tamen ob eſſentiæ  
partium tenuitatem eſt efficacius. Horum  
foliorum vim largam Venetiis ad me at-  
tulerunt Simon Thomas, Stephanus Tul-  
ler.



Ierius, Martinus Gregorius, discipuli olim mei longè doctissimi, nunc medici æqualium celeberrimi. Quæ autem vulgo circunfertur dictamni radix, est potius pseudodictamni. Creticus laudatur potus & appositus. Metitur æstate & autumno.

Doronicum Serapioni est radix parua, foris subflaua, intus alba, dulcis, calamo aromatico similis: calida sicca ordine tertio: flatus præcipuè vteri dissipat, cordis palpitationi confert, ipsumque roborat, venenosis moribus & ictibus auxiliatur, sumptū & admotum. In officinis habetur: *λαρνακιάδιον* dicitur Actuário, vires illi easdem tribuent: tamen is in *διὰ μὲν* doronicum omittit, quod habet mesues in diambra compositione propè eadem.

Dracunculi radix aro acrior, amarior, ob id calidior, tenuior, viscera omnia purgat humoribus crassis & lentis à se tenuatis, ulcera cacoëthe sanat, vitilignes terget cum aceto illita.

**E**Lenij radix odorata, subacris, amara, *Enula cæ*  
 calfacit non primo statim occurſu, sic *pana.*  
 eatque non exactè ob humorem in se recrementitium, tandem verò etiā rubrificat,  
*ischia*



ischiadæ & affectus alios diuturnos ac frigidos: eclegmate cum melle, crassa & lenta expulmone & thorace expectorat, serpentium moribus prodest. Ex montibus & sicco solo præstantior, legitur æstate, particulatimque dissecta siccatur, vel melle aut saccharo cōdita seruatur: *ἰλένιον λευκὸν καὶ ἰρυθρὸν* Actuarius appellat.

Ellebori vtriusque tum albi tum nigri radix multiplex, tenuis, ab oblongo & exiguo capite procedens, calida sicca, ordine tertio: sed nigra gustu calidior, alba amarior: pituitam ac bilem vtranque vacuat, alba magis vomitu, nigra deiectione: alphas, lichenas, psoras, lepras deterget. Alba melior Cyrenaica, nigra ex Anticyra: ambæ in montibus & asperis locis messibus effodiendæ, in vmbra siccandæ.

Eryngij radix longissima, intus alba, foris nigra, odorata: calida, ad primum ordinem, sicca ad secundum: tenuium partium, ciet menses & vrinas, moribus venenatis resistit, flatus dissipat. Esula Scorpionis est Pityusa Dioscoridis & Galeni, radice, semine, foliis, succo, tithymallorum more purgans: ob id etiam tithymalli species à quibusdam putatur. Mesuæ & Auicennæ esula parua, est tithymallus paruos, id est maritimus: magna verò est tithymal



mallus platyphyllos, viribus tamen sunt  
iisdem valentibus, scilicet in purgando.

**F**Oeniculus calidus ordine tertio, ficcus  
primo, semine magis quàm radice, mi-  
nùs foliis quibus lac gignit, vt illis vrinas  
& menses magis ciet. Cortex radice in vsu  
est frequenti, lib. 8. comp. ph. part. *μαλα-* *Mara-*  
*θροσπέρμων* per λ vbiq̃ue scribit Actuarius, *thrum*  
id est, marathri semen. *cū Gra-*

Filicis radix maximè vtilis amara, sub-  
astringens, lumbricos latos necat, partum *Gal. lib. 8.*  
mortuū eiicit, vlcera valenter sed sine mor- *simp.*  
fu siccat imposita, hepatis meatus probè ter-  
get sine manifesta calfactione aut refrige-  
ratione. Gal. lib. 8. comp. ph. part.

**G**Alanga Actuarius Barbaros in multis  
imitato, est radix subrubra, genicula-  
ta, intorta, grauis, sapore acerrimo linguā  
admodū vellicante, calida, ficca tertio gra-  
du, odore & figura quadā cyperi: vnde qui-  
busdam Cyperus Babylonicus dicitur, vt  
prius in Acoro & Cypero docuimus. Adul-  
teratur cyperi radice aceto piperato mace-  
rata, sed adulteratio intrò non penetrat.  
Coctionem iuuat, flatu dissipat, oris hali- *Serapio.*  
rum commendat, venerem excitat etiam  
ore retenta, cerebrum roborat naribus in-



dita, cordis palpitationi prodest.

Gentiana radice est ob multam amaritudinem efficaci, ad tergendum, tenuandū, purgādum, obstructa liberandum: propter quam aloë Gallica dicitur: à Gentio Illyricorum rege inuenta & dicta.

*Dioscor.* Glycyrrhiza, Actuario sæpe Glycyrrhizon, γλυκῆα ῥίζα, & absolute γλυκῆα, lib. 7. comp. ph. part. dicitur Romanis dulcis radix, nobis partium merathesi Riglyce: radice sola & succo ex hac recenti expresso, dulci, & leuiter astringente valet, tepida, temperato proxima, modicè humida, vnde quia sitim sedat, ἀδιψ. & quoque dicitur. Asperitates lenit arteriæ & vesicæ scabræ. Melior nigricans & lenta, quàm buxea & fragilis. Puluis radicum eius pterygia seu vngues oculorum leuat. Dioscorides.

Gramen, seu gramen pecori esculentum radice est modicè frigida & sicca, parum mordaci, substantiæ tenuitatem exiguam sortita, qua calculos potu interdum frāgit.

**H**Ermodactyli duo fastigia facit Mesues, vnum radice digitali longitudine, quod Ephemerum esse videtur Dioscoridis, Gale. & Pauli: radice oblonga, digitali crassitudine, odoratum, iris agrestis appellatum, repellendi & digerendi facultate præ



præditum. Alterum radice rotunda, & ea foris vel nigra (quod Colchicum est ephemerum & deleterium, prædictis autoribus passim frequens, flore croci per autumnum erumpente) vel rubente, vel alba, ut intus, quam eligit solam, si crassa sit, ac modicè dura, & ex loco edito lecta: calida sicca initio secundi gradus, stomacho aduersissima est. Pituitam crassam à iuncturis præsertim extrahit, ob id podagræ, & ipsi arthritidi prodest, per se, vel decocto sumpta, aut etiã admota cum farina hordei, vitellis ouorum, mica panis.

Hæc omnino est, quam Paulus Hermodactylum vocat, & ab utroque ephemero separat, veteribus indicta radix, uti & quæ rubens Mesuæ dicitur. An verò quæ in officinis ostenditur, horum sit Hermodactylus, vel Colchicum, discernere non est difficile his qui legunt, aut integras habent radices, nam delibratæ ad nos conuehuntur. Canis tamen largæ eius vim per me depastus innoxie, & multorum tutò hac radice purgatorum experientia quotidiana facit, ut credam vel Hermodactylum huc esse Mesuæ, & neotericorum, veteribus indictum, vel saltem non esse Colchicum. Actuarium miror inter purgantia simplicia hunc non descripsisse, cum toties eius meminerit in



compositis medicamentis, ἱερμοδάκτυλον λευ-  
κὸν καὶ ἄλινον alicubi appellans. Serapio  
hermodactyli nomine principio Dioscori-  
dis Colchicum repræsentat, deinde etiam  
ephemeron. De omni hoc genere Musa in  
examine simplicium, & Tagaultius suis in  
Mesue simplicia annotationibus doctis pa-  
riter ac luculentis accuratius scribunt.

*Li. 1. an-  
tidotorū.*

**I**Ridis radix laudatior parua, densa, fran-  
gi contumax, subruffa, amara, sternuta-  
menta dum tunditur ciens, odorata, qualis  
ex Illyride mediterranea Dioscoridi, Ga-  
leno, cæteris omnibus prædicatur: ob id  
eam Illyridem vocare consuevit Andro-

*Lib. 6. c.*

*9. c. ph. p.*

*Li. 1. an-  
tid.*

machus. Elige autem in Illyricæ genere o-  
doratiorem: nam vnumquodque est præ-  
stantissimum, quod generis sui odorem  
habet valentissimum. Iris autem quæ ex  
Libya magna Romam affertur, tantum ab  
Illyrica deficit, quantum corpus mortuum  
à viuo. Quæ autem in aliis regionibus cre-  
scit, non ita multum deficit: vnde Iris Gal-  
lica alba purgata vsurpatur, lib. 8. comp ph.  
part. & hodie passim Florentina pro Illy-  
rica nobis obtruditur. Iris coquit, tenuat,  
calfacit, pituitam crassam & bilem purgat,

*Libr. 9. c.*

*ph. p.*

*Diosc.*

humorem ex pulmonibus crassum expe-  
storat. Ireos syluestris radix lib. 10. comp.  
ph. par. ephemeris radix videtur accipienda,  
de



de qua nunc in Hermodactylo egimus: vel potius spathulæ fœtidæ vulgò dictæ, flore & reliquo habitu Iridem omnino referentis.

Isatidis radix in diachamæmelo Actuario ea est amara, astringit valenter, siccat sine morfu, ob hæc vulnera magna etiam in capitibus muscutorū duræ carnis glutinat. *Li. 6. sim.*

**L**ilij radix terget primo ordine, digerit moderate, emollit, menses ciet, vulnere glutinat, etiam in capitibus muscutorū cum melle mista. Eadem præstat folium, sed imbecilliùs. Flos verò substantia constat mista ex tenui & terrea, & aquea: coctus ex oleo mollit, & citra morsum digerit. *Gal. li. 7. simpl.*  
Lilij radix mollit, coquit, terget, discutit: ob hæc vitilignes, lepras, pforas, achoras, furfures emendat, Diosco. addito melle, vel alio, vimeius tergendī imbecillam augente, *Gal. lib. 7. simpl.* *Gal. in fine c. ph. p.*

**M**Andragoræ maris ceu præstantioris delibratæ radicis cortex crassus, lino traiectus ad vsum suspenditur, refrigerandi valentissimæ, vt ordine tertio, & siccandi primo. Eiusdem & pomi succus prælo expressus, insolatusque donec concreuerit, fictili reponitur ad vsus eosdem: sed in po- *Gal. li. 7. simpl. & Dioscori.*



mo cum calore quodam est aliquid humiditatis, à qua est soporiferum.

Li. 1. an-  
tidot.

Li. 9. c.  
ph. p. &  
li. 7. sim.

Meum nobis frequens, Dioscoridis pistoram explet, tamen prestantius Macedonicum, aut Hispanicum: sed Athamanticum laudat Andromachus minor in sua theriaca. Calidum est ordine tertio, siccum secundo, urinas & menses mouet, ut asarum, sed largo usu, cephalalgicum est.

Li. 8. sim.

**N**ardi spica & radix, calida excessu primo, sicca secundo: astringit, subacris, & leuiter amara, iecur & stomachum roborat, sumpta & admota, urinam ciēt, fluxiones intestinorum, capitis, thoracis ficit. Nardus igitur mixta est substantiæ & facultatis tum digerentis, tum repellentis, & roborantis. Nardus præterea vim habet non exiguam coquendi omnes frigidas dispositiones. Ea est multiplex, præstantissima est Indica, secundo loco Gallica, post Cretica, & quæ apud nos montana ex Cilicia, & nardina herba potius quam nardus vocatur. Radix nardi Indicæ, & apud nos montanæ modicè astringit. Nardus Indica quanquam radix est, tamen etiā *ναρδος ῥαχὺς*, seu cum Actuaria & Hera. li. 6. comp. ph. part. in diabesasa *ναρδόρραχὺς*, id est, spicanardi, à similitudine formæ cum spica.

Tamen

Lib. 6. &  
8. c. ph. p.

Lib. 9. c.  
ph. p.

Lib. 6. c.  
ph. p.

Lib. 1. an-  
tidot.



Tamē Philo in sua antidoto Creticam nardum, vel, vt alij eius enigma interpretantur, Indicam radicis falso nomine dici aumat, quoniā spica nardi nūcupatur. Nardi Gallicæ cum radicibus & terra circumdata fasciculum vnum cum alijs ad columelas laxatas adhibet Archigenes: astringit enim & digerit nardus Gallica, ambo mediocriter. Nardi Celticæ flores vsurpantur lib. 8. eiusdem in tertio Andromachi medicamento. Nardus autem Gallica, seu Celtica dicitur: nam gentem eandem Gallos, Galatas, & familiaris Celtas appellant. In Liguriæ alpibus ea nascitur Dioscoridi. Radice igitur vtilior apparet ex initio li. 8. simp. & locis prædictis, spica tamen non inutilis. Laudatur enim recens, levis, larga coma, spica breui, flaua, odoratissima, cyperum redolente, diūque in sua odoris gratia permanens, amara, linguam mordens. Nardus etiā Syriaca vsurpatur in arteriace 12. Andromachi, sed imbecillior est quā Indica. Fugienda nardus quæ *ἡπλοῦς*, id est elota dicitur, & eligenda quæ *ῥυφὰς* lingua Barbarorum dicitur. Spica vulgaris, odoris & saporis gratiam illam non habet, imò inter coquendum odoris est grauissimi, & ægros lædit: estque verius pseudonardus, quā vera nardus.

Lib. 9. c.  
ph. p.

Lib. 6. c.  
ph. p.  
Ibidem.  
Lib. 1. antidot.

Lib. 7. c.  
ph. p.  
Lib. 1. antidot.



*Diosca.  
Vitiflora.*

**O**Enāthes radix in multa capitella ceu  
oliuæ fructus extuberās, ex vino strā-  
guriæ subuenit. Oenanthe autem vitis a-  
grestis ac erraticæ flos cū germine astringens in vsu est frequentiori Medicorum.  
Gal. initio li. 8. comp. ph. part. & li. 7. meth.

*Gale. li. 1.  
antid.*

**P**etroselinum, id est, apium petrosum o-  
mnibus notum, in regione Macedonię  
præcipiti nec magna laudatissimum nasci-  
tur, hoc est, acerrimum & amarissimum,  
maximè si recens fuerit, sed paucum, à qua  
Estreaticum dicitur & Macedonicum. Plu-  
rimum verò in Epiro gignitur, ex qua in  
Macedoniam comportatum, & propè to-  
tum in Thessalonicen: inde tanquam Ma-  
cedonicum à mercatoribus diuehitur: alio-  
qui vniuersis gentibus non sufficiat. Quo-  
modo mel Atticum melle ex Cycladibus  
locupletant, próque Attico vendunt: & vi-  
num Falernum in parua quadam Italiæ re-  
gione paucum genitum, sic ab indigenis  
adulteratur, vt in omnem Romanorum  
imperio subditam regionem feratur. Si au-  
tem Estreaticum Macedonicumque petro-  
selinum desideras, nihil peior, sed minùs a-  
mara erit theriace, & alia antidotus, si alte-  
rum iniicias. Non enim deleteriis pharma-  
cis, aut virulentarum bestiarum morfibz  
adeò



adeò aduersatur, quod principalissimum est theriacis promissum: sed id hydropicis, imbecilibus, & aliis quibusdam similibus affectibus succurrit. Hæc Gal. lib. 8. simpl. Calidum siccum ordine tertio, acre, & amarum, incîdit, vrinas & menses affatim ciet, flatus dissipat: semine tamen quàm radice & foliis est valentius: quapropter id maxime in vsu est.

Pyrethrum ab ignea & caustica vrentéque vi dictum, qua mansu saliuam potentiùs, quàm pro caloris modo elicit: vnde & Saliuaris quoque Latinis dicitur. In Apœnino frequens, annis quinque seruatur: affectibus omnibus frigidis efficax.

*Gal. li. 8.  
simpl.  
Diosc.*

Pæoniæ maris radix longa, althææ æmula rotundatur contra epilepsiam & melancholiam recens collo appendenda potius quàm fœminæ radix. Luna autem decresciente hanc legi volunt: leuiter astringit, subamara est cum quadam dulcedine & acrimonia, si diutius mandas, menses ciet, obstructa hepatis & renum expurgat.

*Manardus in epistolis.  
Li. 6. sim.*

Peucedani radix calida ordine secundo, sicca tertio, incîdit, tenuat, digerit, affectibus neruorum frigidis, lieni indurato, pulmmoni farto pituita crassa, lenta, vlceribus contumacibus auxilio est. Succus ex hac expressus valentior est.

*Li. 8. sim.*



Phu Dioscoridis, & cæterorum Græcorum, nostræ Valerianæ plurimum expriment, nisi florum, qui in muscario pusilli sunt, magnitudo desideretur. Phu Ponticū aliquid habet simile nardo, & petroselino, & cæteris seminibus urinam mouentibus li.8. & 9. comp. ph. part. antidotis inseritur.

*Li.8. sim.*

*Mesues.*

Polypodij radix dulcis, & austera, multum siccans, sed sine morfu, purgandi vim tacet Gal. bilem, pituitamque trahit, Dios. In quo non bilem sed melancholiam legit Serapio: sic & Mesues, & alij post eos plerique, melancholiæ purgatricē vim tribuūt. Sit crassum, solidū, cirrosum, ex rubro nigrescēs, colore intus herbaceo, vt pistaciū recēs, quercubus innatū potius quā saxis & muris: aliis cōtrā videtur, nisi astrigēdū sit.

Pentaphylli radix siccatur ordine tercio, sine morfu, tenuiū est partium, minimum acris, & calida: Tormētilla putatur Leoniceno, Manardo, Ruellio, quæ nunc quinquefolia, nunc septemfolia his & mihi sæpe visa est: vti & vulgare quinquefoliū etiā septēfoliū frequenter est: vti & Eupatoriū, quod etiā dicitur Pentaphyllum Gal. lib. 5. ph. part. Hæc radix in theriacen recipitur, & nostra tormentilla venenis & pesti resistere experientia multa est certissimum, vt si non sit eadem, eius loco vsurpari possit.

Rha,



**R**Ha, Rhaon, Rheon, Rhion, radix nigra, costis nigro foris, centaury magno intus similis, sed minor & rufior, fungosa & laxa, aliquantulum levis, sine odore, teredinibus non exesa, quæ mansa colorem reddit pallidum, ad crocū inclinantē, facile fragilis, amara: præter hæc legit in Dioscoride Serapio, astringens, si plusculum mandatur, subacris: sanguinem expuentibus, cœliacis, dysentericis cōfert. Ex riguis ad Rha fluviū supra Pontū (vnde Rha Pōticū Græcis & Latinis, & radix Pontica Celso dicitur) & Bosporū septentrionali tractu affertur: parū purgatoriū experiētia posteriorū, licet inuentu sit rarissimū, & hodie propè ignotum: obscuratum opinor à Rha barbaro seu Indico, quod ex India meridionali in totam propè Europā quæstu maximo cōuehitur, odoratum, grauitate insigni cōmendabile, astringens, amarū, cholagogū magis, colore dum mādatur planè croceo. Quod siue idem sit genere cū Pontico, viribus tamen, colore, odore, pondere non nihil dissimile soli & cœli ratione, siue omnino diuersum, aliis disquirendum relinquo, quibus plus est otij, & facultatis: cū præsertim etiam celebres hodie medici in ea controuersia sibi non consent, & nunc idem, nunc diuersum affirmant. **Marnardus**

*Rhaponticum.*

*Diosc.*

*Gal. li. 8. simpl.*



nardus nanq; in epistolis nunc idem, nunc diuersum cenſet: Meſues & Serapio ſuo Rhabarbaro tribunt omnia, quæ Dioſc. & Gal. Rheo. Mihi ſatis fuerit admonere, in locum Pontici iam propè deſiti Indicum viribus proximum, & vbiq; copioſum, potius eſſe ſufficiendum: tanto tamē parcius quanto efficacius, in Græcorum compoſitionibus, quā centaurij magni radicem minimo virium commercio cum Pontico conuenientem. Præſertim autem ſufficiendum eſt, quod in Indico eſt aſtringēs magis, minūſque purgatorium, quale multum inuenitur: aut ſaltem eius macerati vel aſſi magna, prout Medicus iudicauerit. In Arabum autem compoſitionibus vtrunq; diſtinguitur, illud Rheu Ponticum, hoc Raued Seni appellatum. Rhion vel ῥιον Ponticum, vel Rhion Pontici radix ferè Galeno dicitur in compoſitis medic. part. 7. & 8. & in anti. ῥιον ποντικόν, & ῥιον βαρβαρικόν, Actuario: & Rheu Pontici radix idem Pontica radix in Eſdræ antidoto: ῥιον ἰνδικόν Actuar. in διαλάχα pro Raued

*Meſues.* Seni Meſuæ. Seruatur annis 3. 4. pſillio, milio, cera oblitum ſola, vel cum terebinthina. Quod autem vulgus Europæ pro Rha Barbaro in hortis paſſim ſerit, Lappathi genus omnino videtur, licet radicis colore



lore Rha Barbaro nonnihil sit affine, viri-  
bus autem plurimum abest. At cum reli-  
qua Rhei vtriusque historia nemini scri-  
batur, sed radicis solius, conuincere ne-  
queas, congenerem plantam vel degene-  
re & diuersam, nisi ex partis vnus natura.

Rubia satiuia radice acerba, & amara, lie-  
nem & iecur expurgat, vrinas crassas, mul-  
tas, saepe etiam cruentas, & menses mouet,  
alpos albos cum aceto terget. Cortex Ru-  
biae recipitur in antidotum ad lienem A-  
ctuario.

**Σ** *Ἀρξιφάγον* Græcorum à nostra vulgari  
Saxifraga diuersum, tamen, vtrunque  
calculos renum cōfringere certum est: hoc  
multa neotericorum experientia, illud Ga-  
leno in theriace ad Pisonem, & lib. 5. san-  
tuendæ: quod esse Betonicam inde pater  
*κίστρον ἢ ψυχρότροφον* (quod locis aliosis  
gaudet Dioscor. *ῥομαῖσι ἢ βέτονικῇ* amariuf-  
cula est, ac subacris, incidit, calculos renum  
rumpit, &c. lib. 7. simpl. & apud Dioscori-  
dem capite cestri, seu betonicæ. *ἐπὶ ἢ τῶν  
λιθιῶντων, καὶ βετονικῆς τι πόας μίγνυται, καὶ  
κίστρο το παρὰ τοῖς κελύοις γενομένης, καλῶσι  
ἢ πῶ βοτάνη τάν πῶ σαξιφάγον.* lib. 5. san-  
tuendæ in sene calculoso: nisi quod hîc be-  
tonicam à cestro videtur separare, si pura est  
lectio, aut καὶ pro siue, vel id est capiendum.

Hac



Hac opinor causa Ruellius ætatis nostræ doctissimus medicus ex Dioscoride caput de Sarxiphago diuersum à capite de Betonica expunxit. Radix sarxiphagi Actuar. passim vsurpatur.

*Gal.li.8.  
simpl.*

Scilla calida ordine secundo, admodum incidit: assam aut elixam sumi præstat, vt virium eius vehementia exoluatur. Legenda ex terra quando folia eius & caules omnino aruerunt, lib. i. antid. Scillæ albæ segmenta seu taleolæ cultello ligneo separata, lino traiectæ modicis interuallis ne se contingant, in vmbra ficcantur diebus

*Dioscor. 60.* vt ex his fiat acetum scillites. Alba est *Plinius c.* masculus, eaque vtilior quàm fœmina *9.lib. 20.* gra. De ea leges plura in compositis medicamentis de Pastillis scillinis.

*Tamari-  
scus lib.7.  
simpl.*

**T** Amarix, seu Myrica, fructu, radice, foliis, extremis ramulis terget, incidit sine manifesta siccatione, parum astringit, tenuium partiū, lienī indurato cū aceto aut vino coctis prodest: fructus & cortex valentiū astringunt. Fructum ramen & succum & non radicem adhibet splenicis remediis, lib. 9. comp. ph. part. Quinetiā trunco in vascula vel potoria vel escaria cauato, lienē arcano quodam odio suis & hominibus longo vsu absomit.

Thymelæa Dioscoridis, est Mezereon  
Mesuæ



Mesua, ut patet conferenti fructum, myrti baccæ æmulum utriq; , quod granum gnedium dicitur Dioscoridi. Folia quæ oleæ similia faciunt ambo, sed angustiora Diosc. maiora Mesues: ramos Mesuæ bicubitales, Dioscoridi tripedaneos. Cum hi chamelææ (quam nonnulli mezereon putant) sint dodrantes & palmo tantum alti: vnicam autem thymelæam facit Dioscorides multas mezerei species facit Mesues.

Turbith Serapionis, est Tripolium Dioscoridis ad verbum. Turbith vel Turpetum Actuarij duplex est Dioscoridis, Alypon & Pityusa, quam etiam Turpet à Barbaris vocari scribit: nec fortè vox ea cum Leoniceo & aliis quibusdam expungenda ex Dioscoride fuerit, quum alias plerasque appellationes barbaras interponat. Turbith autem Mesuæ quibusdam videtur secunda tithymalli species. In hac opinionum varietate de radice hodie parum comperta, & quæ viribus maleficis est prædita (quamvis enim crudam, & crassam, & lentam pituitam purgare dicatur, magno id stomachi, cordis, & aliarum partium incommodo præstat) satius est, eius loco vel agaricum, vel aliam phlegmagogam substituere. Laudant Arabes eius corticem album, gummosum, vacuum arundina



dinaceum, recentem friabilem: corrigunt zingibere, & formatis ex eo trochiscis.

**Z**ingiber Galeno & aliis cum indigenis ferè dicitur: quibusdam Zioziber: aliis Gingiber: radix est herbæ graminis modo serpentis: candicans, odorata, piperis sapore & viribus, nisi quòd tardius calfacit, sed diutius, ut longum piper, ob humiditatem excrementosam: cuius occasione utrunque teredinibus facillè tentatur. Condiendum recens omnino est, nunquam vetus impostorum more. Mittitur ex Arabia & Troglodytica.

Zurumbeth Serapioni Auicennæ aliisque, & Zedoaria, *ξοῦδαρ* Actuário in aurea antidoto dicitur. *ξάδουαρ* eidem in *διανομήρῳ*, & in diantho, alibi *ξάδουαρ* & *ξάδουαρ*. res est ac nomen barbarum, Græcis prioribus incognitum.


Est autem radix aristolochiæ rotundæ æmula, sapore & colore zingiberis calidum siccum gradu secundo: flatus dissipat, odorem allij, capræ, vini tegit, morsui venenato resistit, vomitum cohibet.

\*

DE



## DE HERBIS.



Quæ prius in radicibus dicta sunt de collectione, repositione, duratione illarum: ad herbas transferri possunt, nisi quod his ferè recentibus utimur, quibusdam omnino, ut portulaca, lactuca, buglossa, atriplice, beta, brassica, acantho, nasturcio, helxine, mercuriali, viola nigra, intybo, fumaria, hioscyamo, mandragora, & aliis permultis. Quibusdam verò recentibus utimur, quando his mitioribus opus est, ut ruta, metha, *Gal.li.7. simpl.* absinthium, abrotanum: recetes minus calent ob mistam humiditatem excrementosam: siccatæ verò calidiores sentiuntur: & fumaria reces minus alium subducit magis sicca.

Colliguntur ferè cum floribus herbæ aut seminibus, sic benedictus carduus acanthium putatus, ceterarium paruum, calaminthe, chamædrys, chamæpitys, daucus, fumaria, maiorana, polium, pulegium origanum, serpillum, thymus: aut saltem cum vigent folia magnitudine, odore, colore præfertim quæ cacumini sunt propiora.

Siccantur in umbra magis, nisi si quæ scapo sunt crassiore, aut folio humidior, & ob id apto putrere. Vbi probè sunt siccatæ, reponuntur uti radices, sed minus diu servari possunt: ob id quotannis mutandæ.

d





Abinthium triplex forma, sapore facultate planè diuersum, vt interim natales omittam. Primum generis nomine dicitur, quale præstantissimum est Ponticum. Id folio & flore est multò minore, quàm cætera

*Lib. II. metho.* abinthia, & odore non insuauis, sed aromaticum quid præferente, qui reliquis omnibus planè fœdus: quapropter hæc fugienda. Utendum autem semper Pontico ad ventriculi & hepatis phlegmonas, ad tergendum, purgandum, subducendum prauos humores stomacho hærentes, & roborandum dictas partes contrahendo & con-

*Lib. 8. cõ. ph. par. in hiera picra. Gal. li. 6. simp. initio & fine.* stringendo. Cùm enim omni abinthio duplex sit facultas & qualitas, in Pontico astringens quidem plurima est, amara verò exigua: ob id calidum est excessu primo, siccum tertio. In cæteris abinthiis, vt abrotano, amara est vehementissima, astrictio autem obscura, aut prorsus nulla gustu sentitur: ob id stomacho sunt hæc inimicissima. Ponticum præterea terget sordes tunicarum ventriculi, non tamen si quid altius in eo imbibitum est, foras extrahit, aut expellit, aut saltem parum id præstare valet ob iunctam insignem astringendi facultatem. Hiera autem picra propter id ex cogitata salubriter, illud ipsum potest. Ponticum



ticum autem videtur esse, quod Romanum Mesues vocat, quodque passim hodie visitur. Diuersus enim Mesues Gale. tantum est, quod siccum tertio gradu hic, ille secundo scribit. Quæ controuersia in aliis simplicibus multis est inter medicos etiam doctissimos: quorum vnus in fine, verbi gratia, primi vel secundi, alter in principio secundi vel tertij intelligit: quæ ambiguitas etiam Gale. ipsi est in anetho, prasio, ruta agresti, & aliis permultis. Nam quod succum eius dicit Mesues ob nitrosam qualitatem nocere stomacho, ipsi Gal. id non aduersatur scribenti, succum longe ipsa herba esse calidiorum. Nostri autem vulgare absinthium sarmetosum, folio & flore multo maiore, quam cætera tria absinthia: veteribus inter absinthia comprehensum non videtur, nisi esse velis absinthium primum Diosc. quod vulgo notum dicit, & βαθύπικρον, vel potius βαρύπικρον vocari à multa amaritudine, qualis in aloë, cui subscribitur Dioscoridi, à qua vulgus aloina & forte appellat. Id autem, si primum in Dioscoride recipias, quænam alia in eo statues? Tamē id ad lūbricos, vti & santonicum, est efficacissimum sumptum & admotum.

Abrotanum scemina foliis seriphio & cypressso proximis albioribus: vnde cypres-  
sus & chamæcypressus vulgo dicitur. Mas

Lib. 6.

simpl.



verò abrotanum generis nomen tenet, calidum siccum tertio recessu à mediis, admodum amarum, coma cum floribus vtile, vt absinthium & cineribus suorum sarmen torum ad pilos reddendos.

*Libr. 6.* Acantha, vel Acanthus brancha vrsina  
*simpl.* vulgò: foliis modicè digerit, radice siccatur, leuiter incidit, est tenuium partium, emolliendæ aluo iniectionibus hodie destinata.

*Li. 1. cōp.* Adiantum, seu Polytrichon calido, frigidum temperatum, gustu acerbo siccatur, tenuatur, digerit, ob id strumis confert, lapides frangit in nobis, crassa & lenta ex pulmone educit, capillos reddit, præsertim vstum. Triplex Dioscoridi esse videtur, primum speciatim Polytrichon vocat, Adiantum album Theophrastus. Gaza cum vulgo Capillum Veneris. Alterum Trichomanes nigrum Theophrastus, vulgus Polytrichon. Tertium foliis filicis, vulgò Adiantum: vt Dioscoridis textus hoc loco mancus videri possit. Nam foliorum filicis & lenticulæ tam dissimilium bis in eodem adianto non meminisset. Quartum addi potest Salvia vita vulgò dicta: quartanis curandis efficax est. Galenus adiantum nō diuisit, fortè quòd omnium eadem sit facultas Calitrichon à nonnullis Trichomanes dicitur: tamen qui de herbis scripserunt, adiantum vocant

*Gal. li. 2.*  
*cōp. ph. p.*  
*in caluitio*  
*intempe-*  
*stiuo.*



cant callitrichon potius quàm trichomanes: Polytrichon autem & callitrichon diuersa facit, lib. 1. comp. ph. part. Recens melius, nisi cū siccādū & astringēdū valētius.

*Αγν* & , id est, castus, quod ad castitatem conferat, foliis & floribus sumptis & substratis, & semine frixo, vel non frixo: id enim sumptum, vt semen rutæ, nocturnas veneris imaginationes cohibet, lib. 6. sim. & lib. 5. sanit. tuendæ. Calfacit, siccatur ordine tertio, acris est ac astringens, & substantiæ multū tenuis, flatus omnium maximè discutit. Ob id lege lib. 1. alimētorum calfacit, non cum Græcis exemplaribus & veteri interprete refrigerat, quod effecta illic adscripta indicant. Item lib. 2. comp. ph. part. de cephalalgia ab æstu, vbi Agnū inter refrigerantia cōmemorat: & paulò post vbi Archigenis dicta distinguit, folia lauri calidissima. Agni verò mediocriter refrigerant, legerem non *ἀγν* sed *ἀνίν*, quæ planta Dioscoridi refrigerat, & astringit, etiam si Gale. fortè alibi nusquàm ea herba sit vsus. Neq; enim placet elusio, quod per accidens refrigerat: id enim etiam foliis lauri & calidis omnibus commune est.

Alyssos herba marrubio similis asperior tantum, & spinosioribus pilulis, flore cœruleo, aduersus rabiem efficacissima, *Gal. li. 2. antido. & Act.*



vnde illi nomen. Legenda autem sub fer-  
uenti æstu caniculæ: siccata trita creta re-  
conditur, ne quid virium eius expiret.

*Li. 6. sim.* Anethum calidum secundo ordine, siccum  
primo, tenuium partium, digerit, ex oleo  
decoctum dolores sedat, somnum conciliat,  
crudos humores coquit, præsertim viride,  
quia minus calidum & humidius est. Vstū  
autem calidū siccum gradu tertio fit, vlce-  
ra præhumida præcipuè pudendorū & præ-  
putij cicatrice regit.

Coma florum odoratissima, & semine  
nobis consuetissimum est.

**B**etonica amariuscula, subacris, incidit,  
calculos renum frangit, pulmonem,  
thoracem, hepar purgat & terget, menses  
mouet, epilepticis, acidum ructantibus,  
ischiadiciis, pota prodest: admota autē vlce-

*Li. 8. sim.* ri, omnibus bestiarum morsibus. Vide *exp.*  
*et lib. 1. ξιφάγρον.* Beta viridis, alba, & nigra, nitro-  
*et lib. 1. φ.* est facultatis, qua digerit sine calore mani-  
*et lib. 1. φ.* festo, terget, per nares purgat, alba adhæc  
valentior: nigra substringit præsertim ra-  
dice: coquendo has vires exuit.

Blitum imbecilliter refrigerat & hume-  
stat. lib. 2. comp. ph. part. in secundo re-  
fuso à temperatis, lib. 6. sim. iam vulgare est.

*Caulis.* Brassica esculenta sapore nitroso: parum  
acri, siccatur, terget sumpta & admota, indu-  
ratur



ratas phlegmonas digerit, lepras terget,  
 vlcera etiam maligna glutinat. Cinis vltor- *Gal. li. 7.*  
 rum eius cauliū ficcitate est caustica, cum *simpl.*  
 adipe veteri mistus veteratos laterum do-  
 lores discutit. Brassicæ sylvestris semen  
 maximè tenuat, efficaciter ficcatur, & dige-  
 rit, lib. 9. comp. ph. part. Brassica marina *Soldanel-*  
 sub salsa, & sub amara, ventrem deiicit, & *la.*  
 cætera præstat, quæ has qualitates sequi  
 consueuerunt. Buglossus bubula lingua *Gale. li. 6.*  
 Catoni dicta, calida humida, ob id vinis *simpl.*  
 iniecta latitiæ ac hilaritatis causa esse cre-  
 ditur, vnde Euphrosynon Græcis vocatur,  
 & nobis Corago, corruptè Borago, Her-  
 tulli ob faucium asperitatem natæ cocta in  
 melicrato confert. Iulio mense colligitur  
 Dioscori. Buglossum magnum, Cirsium  
 Dioscoridi dictum, Buglossus vulgaris vi-  
 detur, caule dum veterauit triangulo, vel  
 in triangulum inclinante, tuncque tam spi-  
 noso, vt citra noxam non tangatur. Notæ  
 tamen quædam Dio. in vtroq; desiderantur.  
**C**ardus à nostris Benedictus, ob sin-  
 gularem plantæ torius amarissimæ  
 facultatem aduersus pestilentes, putresque  
 alios affectus: an verò sit acanthiū vel cha-  
 mæleontis quædam species, dictu facile nō  
 est ob imperfectam horum historiam.  
 Cichorium, Romana lingua Intybum *Li. 8. sim.*



olus dicitur, Gal. lib. 2. comp. ph. part. Id  
verò & reliquæ sereos species, foliorum  
magnitudine & cultu distincte, facultati-  
bus parum discrepant, nisi quòd agrestia  
satiuis sint sicciora & amariora. Omnia  
enim hæc subamara sunt, subfrigida, mo-  
dicè astringentia: sed agrestia frigida sic-  
ca secundo ordine: domestica verò magis  
refrigerant, & in his multa humiditas mi-  
sta siccitatem extinguit. Ob hæc hepatis  
intemperiem calidā tum solā, tum cū cor-  
ruptis humoribus & ichoribus maximè iu-  
uant refrigerando, roborando firmam eius  
partem & gibbam obstructione liberādo:  
præsertim si cum vino albo bibantur, & cū  
melle, sic enim illos humores per vrinas  
pellunt: nec frigida multum lædunt, vt alia  
per multa, quæ sunt frigida, humida sine a-  
maritudine & astrictione: sumuntur succo,  
decocto puluere, lib. 8. composi. phar. part.

Condrilla omnis, & Sonchus, & Hiera-  
cium vtrunque sereos species etiam Dio-  
scoridi & Galeno putata, & sereos ac ci-  
chorij nomine etiam ab his & aliis digna-  
ta (licet Chondrillam lactuæ non seri iun-  
gat, lib. 2. alimentorum) vt forma & tempe-  
ratura sunt affines, sic viribus minimū  
discrepant. Ob id ea tanquā congeniera  
iungit Dioscorides. Pro intybo autē vul-  
gus



gus Endiuia re & nomine corrupit, vt pro feri scariolam quasi feriolam dicere tentauit.

Calaminthe, vel cum Nicandro Calaminthum, Galeno duplex est: domestica, & eo efficacior montana, quam ab Andromacho minore miratur Nepitham voce Romana potius quam Calaminthen Græca vocari in sua theriace, cū cætera Græcè appellarit. Dioscoridi triplex est, primò montana, vulgare calamentū: secunda pulgiū syluestre, tertia herba cataria Ruelio videtur. Musæ contrā, tertia vulgare calamentum, secunda cataria putatur. Ob imperfectam omniū historiam in hac sententiarum varietate iudicium difficile, *λαμίνδην ποδάμια* addit Act. Galeosis autem quæ vulgò herba cataria putatur, esse vrtica fœtida purpurascens floribus videtur. Calaminthe calida sicca gradu tertio, acris, parum amara, tenui substantia, cutim calfacit, mordet, fugit, postremò ulcerat: tamen eius succum vulnerei etiam cerebri meningas diuidenti infusum, milij farina sicca superiecta glutinare affirmat Archigenes apud Gal. lib. 2. compo phar. part. Chamædrys, id est, quercula, amara, subacris, calida sicca tertio gradu, sed calidior paulò quam sicciior. Ex Creta Cæsari affe-

*Libr. 6. c. ph. par. et li. 7. simp.*

*Li. 1. antidotor.*

*Li. 7. sim.*

*Li. 8. simpli.*

*Li. 1. antidoto. Ga.*



rebat ad theriaces compositionem: tamē ubiq; nascitur, etiam in Romæ suburbiis, odore & gustu quā Cretica vehemētior, præsertim si multo imbre non fuerit irrorata, quamuis hac campestris sit melior.

Prægnans semine cum Diosc. aut succo cum Plinio, aut etiam flore cum Gale. carpitur.

**Li. 8. sim.** Chamæpitys, id est, pinus pumila, quod odore & foliis eam imitatur, Aiuga Idea Scribonio dicitur, aliis Abiga, vulgo Iua: calida secundo gradu, sicca tertio: amarior quā acrior, terget, purgat, obstructū iecur liberat, ictericis ischiadicis cum melicrato pota succurrit, menses, urinas ciet, viridis vulnera magna glutinat, vlcera putrescentia sanat, mammarum durities discutit. Huius radicem vsurpat Asclepiades, succo tamen decocto, semine, puluere idem pollet, Gale. lib. 8. comp. ph. part.

**Li. 7. sim.** Cicuta refrigerat extremē, id est, quarto gradu, ob id lethalis est: eius vna species nobis est pumila odorata, quæ frixa & admotā dolorum causas leues dissipat. Cicutæ semē excorticatur, li. 10. cōp. ph. par. in fin.

**E**vporium, vel Hepatorium, vel Hepatitis, omnino agrimonia vulgaris videtur, Diosco. Eupatorium cum Serapionis agrimonia, & Mesuæ eupatorio conferenti. Corruptū verò nomen ex argemone  
appa



apparet, quàm falsò Eupatorium quidam  
(vt Dioscor. ait) putarunt: incidit, terget, *Li. 6. sim.*  
tenuium est partium sine manifesto calore,  
subastringit, iecoris ob id obstructions  
aperit, ipsúmque roborat, vnde & nomen  
inuenit: vel cum Cicerone, ab Eupatore  
rege. Hanc etiã Pentaphyllũ vocari, quòd  
folio sit quinquepartito, scribit Gale. lib. 5.  
comp. ph. part. vt dixi in Pentaphylli radi-  
ce. Eupatorij nunc folia, nunc radicem  
Actuarius miscet. Eufragia veteribus in- *Hermo-*  
comperta herba, Pampinulæ similis, folio *laus in*  
minore, & magis serrato, flore luteo, præ- *sarxi-*  
cipuæ claritatis ad omnia oculorum vitia: *phago.*  
vnde ophthalmica dici potest: ab euphro-  
syno detortum nomen apparet. Montana  
melior, quæ ferè est polyclonos, alibi mo-  
noclonos magis.

**F**Umaria acris, amara, subacerba, vri- *Li. 7. sim.*  
nam biliosam & multam commandu- *Dioscor.*  
cata aut pota prouocat, hepar obstructum *Mesues.*  
purgat & roborat, scabiem & pruritum in-  
de sanat: siccata ventriculum cum vino  
roborat, cum melicrato aluum subducit,  
succo suo oculorum claritatem, & dela-  
crymationem fumi modo molitur, vnde  
illi nomen.

**G**Allitrichum pro Gallicentrũ Ruellio  
videtur esse Horminũ Græcorũ, aliis  
Ver



Verbenaca recta, ob picturæ Hormini & verbenacæ rectæ obscuram breuitatem, iudicium difficile. Callitrichon autem prius in Adianto diximus.

*Li. 8. simpl.*

**H**YOSCYAMUS, id est, Suis faba, quòd eius pastu apri conuellantur, & resoluantur, nisi mox cancos fluuiales ederint, Helianus: his enim fabis apros Erymanthios in Arcadia ab Hercule occisos scribit Philo in sua antidoto, lib. 9. compo. ph. part. Galeni. Triplex Dioscoridi & Galeno: primus flore purpurascente, semine nigro, venenosissimus: alter flore & semine luteo, mitior, sed etiam deleterius: tertius flore & semine candido, ad sanationes aptissimus, frigidus ordine tertio, siccus primo, Gal. lib. 3. methodi.

*Gal. li. 8. simpl.*

HYSSOPUM calidum siccum ordine tertio, tenuium partium: crassa & lenta expulmonibus extrahit, humorem crassum per aluum etiam purgat, obstructions terget: montanum est efficacius hortensi: Ciliacium præfert Dioscorides: Creticum verò commendatur Archigeni, lib. 8. comp. ph. part. Gal. in Chrysocome & origano Heracleotico. Quædam à Dioscoride Hyssopo tribuuntur, quæ in nostro desiderari videntur. Cum florum spica legendum est aut cum semine turgere.

*Dioscor.*



**L**auri folia & fructus calfaciunt, & sic. *Li. 6. sim.*  
 leant vehementer, sed hi magis quàm *& lib. 2.*  
 illa: leuiter astringere addit Dioscorides, *c. ph. part.*  
 quam vim & amaritudinem soli radici cor-  
 tici tribuit Galen. qua calculos confringit.

Lapathū digerit modicè, oxylapathum *Gal. li. 7.*  
 digerit & repellit, vtriusque semen leuiter *simp.*  
 astringit, vnde dysenterias & diarrhœas  
 sanat præcipuè oxylapathi. Hippolapa-  
 thum, quod in aquis omnino nascitur, ea-  
 dem præstat, sed imbecillius: idem verò va-  
 lentius fuerit in hortos hodie translatus.

**M**arrubium, seu Prasium album, sapo- *Li. 8. sim.*  
 re amaro, calidum ordine secundo,  
 ficcum tertio: lienis & hepatis obstructio-  
 nes soluit, pulmonem & thoracem purgat,  
 menses ciet, ad motum terget, digerit, &  
 cum melle oculorum aciem claram reddit.

Malabathrum sui generis foliū, Indicæ *Libr. 1. c.*  
 nardo, vt odore & sapore, sic viribus simil- *ph. par. et*  
 limum, sed nardo efficacius. Laudatur re- *lib. 7. sim.*  
 cens ex candido nigricans, contumax fran- *Dioscor.*  
 gi, integrum, odore vegeto nares feriente,  
 & qui folio semoto persistat. Id nunc de-  
 fuit, à quo tamen vnguentum foliatum di-  
 uitibus Romanis mulieribus frequens est  
 dictum. Defuit & folium Syriacæ arboris  
 Plinio celebratum. In horum locum Mau-  
 ri inuexerunt folium laurino proximum,  
 sed



sed maius, & neruis tribus folium inter-  
cursantibus distinctum, odore iucundo. Pri-  
mum illud folium Indum dicitur Serapio-  
ni: tamē Actuarius in hedychroo magma-  
te, φύλλον ἰνδικόν, & φύλλον μαλαβάθρον ceu  
diuersa miscet: φύλλον ab his diuersissimū  
Dioscoridi describitur, vulgò Italis folium  
syluestre dictum, Hermol.

Lib. I. an-  
do.

Maron herba furculosa vulgò cognita,  
flore origani, sed odoratiore, foliis multò  
candidioribus, subastringit, modicè cal-  
facit, sisymbrio similiter, Dioscor. Ma-  
ron planta est vehementer odorata & ama-  
ra, amaraco proxima, quò tamen est multò  
odoratior & amarior, minùs tamen eò est  
acris, vnguento amaracino fortè dicto,  
quòd amaraci plurimum olim reciperet,  
nunc solum marum immittunt, satius ta-  
men est: æqualem amaraci & mari portio-  
nem imponere, vt hedychroi compositio-  
ni: qua mistione minùs quidem odorum,  
non tamen minùs efficax erit, hæc Gal. Su-  
spicio est nobis vehemens Marum esse her-  
bam Mastic vulgò dictam, maioranæ si-  
millimam, flore tamen muscoso in pappos  
abente.

Maiorana, amaracus, Sampsyclus, Dio-  
scoridi, Theophrasto, Plinio eadem sunt  
herba: vnguentum tamen amaracinum à  
fam



sampsychino cur diuersum sit Diosco. do-  
ctè mihi Musa comiectare videtur ex plan-  
tæ huius appellatione consueta vtriq; re-  
gioni, in qua vtrunque id vnguentum fie-  
bat laudatissimum. Calida est herba & sic-  
ca ordine tertio, & tenuium partium Sam-  
psychum, Gal. lib. 8. simpl. Amaracum verò  
calidum ordine tertio, siccum secundo, idem  
lib. 6. simpl. Ex qua temperamēti varietate,  
& quòd seorsum de his agit, Amaracum  
Galeno, & post eum Paulo esse dictā, vulgò  
Matricariā suspicantur Hermolaus, Ma-  
nardus, quæ iisdem autoribus Dioscor. est  
Parthenium: sed amaracum Galeni nō esse  
Matricariam vulgarem odore aspernabili,  
sapore amarissimo, conuincit quæ de Ma-  
ro & Amaraco nuper ex Gale. antido. pro-  
tulimus. Adhæc Amaracum se vidisse in  
Italia crescere scribit Gale. lib. 2. antidoto.  
tanquàm planta esset Italiæ rara, cū tamen  
Romæ familiarem esse Matricariā Musa  
Ferrariensis affirmat. Nec satis ad confir-  
mandam ipsorum sententiā est, Galenum  
bis de re eadem non scripsisse, cūm his de  
absinthio, de astere seu bubonio, de chalci-  
ti scripserit. Parui præterea est momenti  
varietas ordinum siccitatis, quòd scilicet  
amaracus sit siccus ordine secundo, sam-  
psychus autem tertio: ille enim cōpleto, hic  
inci



incipiente esse possit, ut in absinthio dixi. Quo fit, ut ex his plantas esse varias nemo possit colligere.

*Melissa.*

Melissophyllum, id est, apum foliū, quod herba hæc præsertim florente, apes plurimum gaudeant, unde Apiastrum Latinis dicitur: & à citri odore Citrago. Viribus est marrubio simile sed imbecillius, ob id etiam usu rarius.

*Ibidem.*

Myriophyllum, Romanis Millefoliū, siccitate multa glutinat vlcera.

*Li. 8. sim.*

**O**Rigani genus omne calidum siccum tertio ordine, incidit ac tenuat. Tragoriganum etiam subastringit, præfertur montanum, vel Creticum, vel Heracleoticum.

*Gal. li. 6.*

*simpl. &*

*li. 3. c. ph.*

*part.*

**P**Lantago refrigerat siccatur, ordine secundo, astringit, repellit, digerit: ob hæc vlcera recentia & vetera etiam rebellia glutinat, hæmorrhagiam sistit, fluxiones & putredines, & ab his dysenterias coercet, hepatis & renum obstructions tollit. Semen & radix eadem præstant, sed siccant magis, refrigerant minus. Ad hæc semini adest essentia tenuitas. Duo eius genera facit Dioscorides parvam, & hac efficaciorē magnam. Præter hæc est tertium nobis Arnoglossum, vel Arnoglossa nomine generis appellatum, folio rotund



rundiore, sessili, hirsuto, in vfu medicorum frequentissimum.

Portulaca frigida ordine tertio, humida *Lib. 2. cō.*  
 secundo, subaustera: fluxiones biliosas, & *ph. p. & li*  
 æstus febriles maximè cohibet sumpta, & *br. 6. sim.*  
 admota. Hæmodiam, id est, dentium stupo- *Gal. li. 6.*  
 rem non omnem, sed eam solùm, quæ ab a- *simpli. &*  
 cerbis, austeris, acidis est nata, sanat: quia ab *de optima*  
 his asperè exiccata lenit: & replet humidi- *secta.*  
 tate lèta, Galenus: vel quia suo lentore aci-  
 dulo hærens, ac subiens, acorem illum sibi  
 affinem sapore ex dente extrahit, Aristote-  
 les sectione prima, problemate 38. Huius  
 autem effecti omnibus cogniti causam in-  
 explicabilem, & soli Deo notam, scribit A-  
 phrodisæus in initio problematum suorum.

Populus duplex, *λίπκη*, id est, alba, & *ἀί- Lib. 6. sim*  
*γυρ* Gal. *ἀίγυρ* Diosc. id est, nigra. egypti- *pli.*  
*ρι ἀνθη*, id est, flores, seu *σφαίρια*, id est, pilulæ,  
 primo foliorum partu exilientia (vt in leu-  
 ce vocat Dioscor.) calida primo à tempera-  
 tis recessu: nam in *τῷ πρώτῳ ἀποσάσεως*, Pau- *Oculi po-*  
 lus, Manardus, Fuchsius in Galeno legunt: *puli.*  
 licet in *τῷ τρίτῳ*, id est, in tertio, habeat co- *neutra po-*  
 dex Aldinus, & ita legerit in Arabibus, vn- *pulus flo-*  
 de vertit vetus interpres: & Oribasius Græ- *tere vide-*  
 cus medicus lib. 2. ad Eunapium, & lib. 15. *tur Her-*  
 ad Iulianum Cæsarem, paulò ficiōra, quàm *mol.*  
 quod humido & sicco est temperatum: te-



tenuum partium potius quàm crassarum. Folia floribus sunt similia, sed imbecilliora: & resina eius exigua floribus similem habet facultatem, sed calidiorem: semen floribus & resina siccus, non multò calidius, sed partium est tenuium. De hac utriusque populi lacryma in succino seu electro leges postea. Folia *λίυκης*, id est, populi albæ, media sunt inter folia lauri calidissima, & folia *ἀνίυς*

*Gal. Lib.* herbæ, refrigerantis Dioscoridi: sic enim lib. 2. c. phar. 2. comp. ph. legendum censuerim potius quàm *ἀγυς*, qui lib. 6. simp. dictus est calidus

*part.* ordine tertio, etiam si vetus ex Arabibus eo loco habeat agni casti. *λίυκης λιάρπης*, id est, populi albæ fructus digerentis est facultatis, ibidem paulò antè. Gustanti Manardo Populum nigram & communem, visa est modicè astringere, postea minimum amara, odore non insuavi, sed languido. Ex eius igitur floribus myracopum populeum refrigerat, cum præter adipem & populi oculos modicè calida, cetera habeat frigida, etiam magna parte ad supremos usque ordines. Populus alba temperata ex aquea te-

*Lib. 7 sim* pida substantia, & terrea tenuata terget: Populi nigre seu nō bicoloris flores multum acres nobis sunt, ex his; vulgò fit unguentum populeū: quod acopum *ἂν ἀγύς* apud Galenū & Paulum legitur, non *ἀνὰ λίυκης*.

Ruta



**R**uta hortensis est imbecillior agresti: *Lib. 8. simplic.*  
 hæc enim calida ordine quarto, (tan-  
 tum tertio dicitur libro 6. comp. ph. part. in  
 stomachica diabesafa) illa tertio: utraque  
 acris, amara, tenuium partium, valenter  
 siccans, incidit, digerit valenter crassos &  
 lentos humores, urinas mouet: flatus, & ve-  
 neris appetitum cohibet. Syluestris Moly,  
 Besanum, Besafa dicitur: Syri indigenæ  
 Harmola vocant, libr. 6. & 9. comp. ph. part.

Rosmarinus coronaria nobis est fre-  
 quens, utilis folio & flore, quem vulgus ab- *Li. 7. simplic.*  
 solute *ῥοσμαρίν* male vocat, nec antidotus *ῥοσμαρίν*  
*ῥοσμαρίν* Actuarij solius Rosmarini florem  
 recipit, sed aliorum, ut p<sup>o</sup>st leges. Sterilis li-  
 banotis ad Montem Pessulanum plurima.  
 Tertia fecunda duplex est Dioscoridi: om-  
 nes emolliunt, incidunt, tergent, digerunt,  
 istericis decocto præsunt, & oculorum acie  
 ab humorum crassitie obtusam succus ra-  
 dicis cum melle emendat.

**S**aluia quod ad multa, præcipue ad fec-  
 unditatem sit salutaris, *ἡλιδόφαν*  
 Græcis, quasi syluestris lens dicitur, folio  
 est maiore, scaldiore, scabriore: Sphace-  
 celus verò breuiore & lauiore. Quæ Theo-  
 phraستي verba nostram Saluiam francam  
 Sphacelo videntur exprimere. Calfacit e- *Lib. 6. simplic.*  
 videnter, & subastringit *ἡλιδόφαν*.



*Lib. 8. sim-  
pli.* Scordium ab odore & acrimonia scordi-  
di, id est, allij, dictum est: subamarum, acre,  
acerbum: calfacit, purgâtque viscera, obstru-  
ctiones liberat, urinas & menses mouet: vi-  
ride magna vulnera glutinat: ficcum autem  
sordida purgat, contrumacia cicatrice regit.  
Optimum ex Creta petitur, quale etiâ An-  
dromachus iunior suæ theriacæ miscet: nō  
malum tamen in aliis regionibus possis in-  
uenire. Putriferis animalium venenis & phar-  
*Li. 1. An-  
t. d.* macis deleteriis succurrit. Quæ vis eius in-  
de est coniectata, quod quæ in bello occisa  
fuerant corpora, diuque insepulta super scor-  
dium fortè iacuerant, minus putria sunt in-  
uenta, quod à viris quibusdam fide dignis  
acceptum tradit Gal. lib. 1. Antid. Nobis in  
agro Parisiensi locis riguis est largissimum  
verum scordium.

*Lib. 5. sim-  
plic.* Scolopendrium idem cum Aspleno con-  
tendunt Musa & Massarius in librum no-  
num Plinij: tamen Galenus ait maiores lie-  
nis obstructions vehementiora postulare  
remedia, capparis corticem, tamaricis radi-  
ces, scolopendrium, & scillam, & eam herbâ  
quæ asplenos appellatur, effectum id nomi-  
ne representans. Vbi aperte scolopendrium  
ab Aspleno separat, licet postea in censu sim-  
plicium aspleni vires describat, scolopen-  
drij non meminerit. Libro tamen Methodi

13. sco



13. scolopendrion quoq; lieni conuenire scribit, nulla mētionē aspleni facta: quanquā ibi alia quoque eius remedia attingat. Diuerſas etiam herbas facere videtur in ſplenīcis, lib. 9. comp. ph. part. *μυρίκκς λαρπῶ, βόλάνης ἀσπλήνως λεγομένης σκολοπενδρίον, ἢ ἡμιονίτιδ* & *ἀνὰ*: tamen paulò antè in Andromachi ſplenīcis ſcribebat, *ἡμιονίτιδ* & *βόλάνης ἢ οἱ μὲν ἀσπληνον, οἱ δὲ σκολοπένδριον λέγουσιν*. Ex quibus colligere poſſis, herbas eſſe affines non viribus modò, ſed forma & habitu, vnde nominum hæc incertitudo nata ſit. Quod & in Dioſcoride paſſim obſeruabis, & in Aſpleno quoque, quem ab aliquibus *σκολοπένδριον*, ab aliis *ἡμιόνιον* vocari ait: non tamen *ἡμιονίτιδα* dixit, quòd hæc folio ſit diuerſiſſimo, quam tamen *σπλήνιον* quoque vocari ſcribit. Vnde Maſſariuſ & ex Theophrasto affirmat Hemionum vel Hemionion eſſe vulgatum nobis Ceterach: Aſplenon verò, ſeu ſcolopendrion plantam eſſe aliam, ex foliorum & radicū pictura perſuadere conatur. Quæ autem vulgò eſt ſcolopendria, Dioſcoridis eſt *φυλλίτης*, à quibuſdam Lingua ceruina multò iuſtiùs appellata, quàm à Gaza ſcolopendrion Theophrasti, quam rectius Ceneripedariam vertiſſet. Siue autem Ceterach ſit aſplenon aut ſcolopendrion, ſine hemio-



nus dicta, quod mulæ hac herba plurimum delectentur, parui est momenti, quod hæ omnes lienem diminuunt, & liquent, & substantia tenui sine calore lapides etiam in vesica frangant: lib. autem 8. simplic. & Dioscorid. phyllitis acerba cum sit, diarrhoeas & dysenterias pota iuuat.

*Li. lant.*

Stœbe herba quæ apud nos nascitur fruticosa est, calida, acris, odoratum quippiam resipiens, ad vini conseruationem ne accescat, aptissima, si calor huius doliis admotæ ignis calore excitatus, vina crudiora percoxerit. Stœbe, quæ & Phleos dicitur, spinam habet in folio & caule Plin. lib. 21. cap. 15. lib. autem 22. cap. 11. omnia ex Diosc. Stœbe mutantur, quod astringat foliis & semine, ob id hamorrhagiæ, dysenterix, oculis cruentatis, auribus purulentis conueniat, quæ vires Galeni Stœbæ acri & calidæ non conueniunt: neutra tamen harum nostra est Scabiosa vulgò dicta, quod scabiei sanandæ sit idonea, folio erucæ cum a doleuit hirsuto, aculeis tamen non horrente, flore cœruleo, quæ pulmoni purgando & hepati confert, & carbunculum recens admota horis tribus perrumpit. Psora autem Aëtij non esse nostra Scabiosa hinc apparet, quod huius vstæ fumo arborum erucæ non moriantur, imò non moueri eas  
magis



magis quàm stipularū fumo expertus sum:  
quam tamen facultatem Aërius Pſoræ tri-  
buit.

**T** Hymum commendatur maximè At- *Lib.4. fa-*  
ticum, aut ex locis siccis & editis: ca- *ni. tuend.*  
lidum siccum ordine tertio, incidit, menses *Lib.6. sim*  
& vrinas mouet, crassa & lenta ex pulmone *plac.*  
& thorace expectorat.

**V** Erbascum, Phlomis Græcis vulgò *Lib.8. sim*  
Tapſus barbatus, & Bullio albus & *plac.*  
niger: foliis terget, siccatur, digerit: radice est  
acerba, ad fluxionis affectus, & dentium  
dolorem idonea.

Verbenaca recta, id est, *ῥιγιστιγίων ὁ ὀρθός*,  
præfertim viridis & recens, sed etiam sicca,  
cum radicibus oleo incocta, perfusaque ca-  
piti, dolorem eius omnem diuturnum à frī-  
gore, aut crassis humoribus omnium maxi-  
mè digerit, & caput roborat. Galen. lib. 2.  
composition. Pharm. part.

## DE FLORIBVS.

**F** LORES vt plantarum partes re-  
liquæ legantur, cū maximè vi-  
gent, vt capparidis in gemma, rosa  
expandi cœpta, reliqui ferè aper-  
ti. Sed haud ita pridem & ex quibus vis nō-  
dum exhalauit, siccantur sole magis minus,  
pro varia ipsorum natura: quidam siccādos  
volunt, donec ex ponderibus decem vni-



cum superfit. Reponuntur vt alia, quotannis mutantur, quanuis schoenu anthos etiā decennium efficax seruari possit: chamæmelum item diu vegetum est, ob fortem partium suarum mistionem.

Flores, absinthij comæ, buglossi vtriusque, chamædryos, chamæpityos, capparis, rorismarini & aliorum quorundam in herbis prius dicti sunt: reliqui sunt dicendi.

**B**Alaustium syluestris punicæ flos, cytinus satiuæ & domesticæ Dioscoridi & Galeno *νεῖ ὀνομάσθηται λύτριοι αἱ ὡς ὁ λύτροι ποταμὸς*, id est, primogenia punica. Nam quando arbor florere desinit, fructus ipsius apparet in mali Punici speciem figuratus.

*Lib. 6. cō. ph. p.* Hi in fine Veris gignuntur, & meliores sunt ex granatis acidis & acerbis, quia magis astringunt. Ibidem. Ambo tamen insigniter astringunt, refrigerant, siccant, crassæ sunt substantiæ: ambo etiam hodie à medicis cum Plinio Balaustia vocantur.

*Li. 6. simplic.* Buphthalmi flos cardiacus Actuar. oculi bubuli effigie, vnde illi nomen, colore floribus Anthemidis, sed multò maior & acrior, *Lib. 3. ca. 9. & libr. 6. simplic.* ob id valentius digerit: putatur esse Cotula non foetida, vulgo dicta Chamæmelum ab odore mali dictum, seu Anthemis: calfacit, siccatur ordine primo, stipata rarefacit. tensa laxat,



laxat, plena digerit, dura emollit, essentia  
 tenuis vt rosarum succus, lassitudines sol-  
 uit, dolores capitis & aliarum partium fri-  
 gidos, si homo plethoricus non sit, nec cru-  
 ditate laboret, sedat, libro secundo compo-  
 sitionis pharmacorum particul. biliosas fe-  
 bres percoctas, & quæ ex cutis densitate na-  
 scuntur, potu persanat: melancholicas au-  
 tem, & pituitosas, & quæ ex visceris alicu-  
 ius phlegmone oriuntur, concoctas stre-  
 nuissimè iuuat: ob id à sapientissimis Aegy-  
 ptiorum vnicum putatur febrium omnium  
 remedium. Tria huius genera Dioscoridi  
 sunt flore tantum diuersa, intus in omnibus  
 aureo, foris candido in leucanthemo, meli-  
 no in chrysanthemo, purpureo in eranthe-  
 mo, quod Vere floreat. His nominibus Ma-  
 cer distinxit.

*Chama-  
melum cõ-  
mune est  
leucanthe-  
mum.*

**C**aryophyllum, quasi nucifolium, quã-  
 Cuis hanc non seruet naturam, quæ no-  
 mine prætenditur: fructus est arboris Aëtio  
 & Simeoni: flos autem est Paulo cuiusdam  
 arboris Indicæ, festucaceus, niger, longus,  
 acer, subamarus, odoratus: calidus siccus se-  
 cundo gradu Aëtio, tertio gradu Paulo: ad  
 obsonia, suffusus, & multa medicamenta vti-  
 lis. Dioscoridi & Galeno indictus.

*Clauus à  
figura vul-  
go dicitur.*

Crocus calidus ordine secundo, siccus  
 primo, parum ac mediocriter astringit, qua



*Lil. r. an-*  
*tid.*

Libro 14.  
metho.

4xh̄v̄, et  
 4xh̄v̄,  
 et 4xh̄v̄-  
 d̄v̄, et



educēdum humorem melancholicum. Horum loco si Arabum epithymo, hoc est, casutha thymo innata, vt satureæ seu thymbræ epithymbrum Actuatio dictum, & hysfopo, & maioranæ, epyllopum: & orobo orobanche: & lino linanche, vti libet, quia vires cum thymi flore easdem illi Plinius veterum solus tribuit, dabitur cum Mesue ob imbecillitatem à drachmis quatuordecim ad drachmas viginti. Epithymus autem Arabum, vt thymus, est duplex, hortensis, & hoc calidior ficior Montanus.

Ericæ digerentis plantæ flore potissimum ac foliis vtendum: semen etiam adhibetur lib. 6. comp. ph. part. Ericæ fructus sæpe lib. 9 comp. ph. part. in splenicis. *Libr. 6. simpl.*

**G**eniste nostratis, & Sparti folia, flores, semina, succus valenter trahunt, ob id anginis, ischiadibus salubriter admoventur, & hydropicis sumuntur.

Flores eius antequàm dehiscant, aceto & sale conditi annos etiam tres integri servantur, idonei primis mensis, & delicati capparum loco, quibus etiam valentius obstructa liberant. *Libr. 3. simpl.*

**I**on, id est, viola omnis, & præcipuè nigra seu purpurea, quamuis in eodem genere est etiam alba, vulgò Martia dicitur. & Quad



& Quadragesimalis, quod Martio mēse, & quadragesima floreat. Est etiam multifoliū, ob id Dasypodium Græcis dictum, concolor prima sed plenior: frigida est ac humida primo ordine. Syrupus ex multis florū violæ nigræ recentium, vt rosarū, florum perfici, infusionibus soluit aluum, vt in compositis ipsis dicemus. Quin & semen violæ nigræ album, rotundum, milij æmulum aperte cholagogum est. Est quoq; eius generis syluestrior toto habitu strigiosiore, magis serpens, flore cæruleo, in album languescente, inodoro λευκῶν verò quauis violā albam significet, ad omnes tamen violas præsertim eas, quæ primo vere nascuntur, siue albæ, siue luteæ, seu purpureæ fuerint, seu nigræ cum Hippocrate, seu cæruleæ, vt quidā Dioscoridis codices habēt (quod expūgendum putāt pleriq; præsertim Plin. lib. 20. & Paulus de oleo ioto, id est, violaceo, album, luteum, purpureum, leucoion tantum commemorant) extenditur. In his efficacissimæ sunt luteæ, Keiri Arabibus dictæ. Tamē cæteræ tres aut duæ caryophyllatæ, à floris figura caryophyllum imitante, nobis dictæ, nō sunt inefficaces: linguam enim valenter calfaciunt, & acrimonia sua mordent folio, sed magis florē, qui in his colore plurimum variat, arte opinor quæsito, vt in floribus aliis,



aliis. *Αιουοια* verò Theophrasti, quod florum primum se ostendit, etiam nondum exacta hyeme: radice bulbosa an sit quæ nobis circa natalem Christianum florem album pulcherrimum trifolium intus virentem ostentat, ab aliis malo diuinari, quàm à me rem non satis compertam pro vera pronuntiari. De quo multa Massarius in libr. 9. Plinij.

**M**elilotum coquit, digerit, & parum *Gal. li. 7.*  
astringit, ut crocus: largior enim est *simpl. &*  
in eo substantia calida quàm frigida. *libro 4. c.*

**N**ymphæa, quod aquosa amat, dicta: *phar. par.*  
vna est flore albo, radice nigra, & semine nigro: altera flore luteo, radice alba. Vtriusque radix & semen frigidum, ficans sine morfu, parum detergens, proinde alui profluvia, & dysenterias cohibent: semen immodicè profluens siue per insomnia, siue aliter, retinent ex vino nigro austero pota: in id efficacior lutea, adeò ut medeatur muliebri profluvio, ut ad tergendum alba prepollet, quæ aqua macerata alphas, pice liquida alopecias sanat: Autumno radices exciduntur: Hæc Dioscorides & Galenus, verum facultatis florum, quibus hodie solis utimur, non meminerunt.

**P**ericlymeni fructus & folia subamara, *Caprifoliū, & ma*  
tandè acria, adeò valenter calfaciunt, &  
inci



*ter sylua.* incidunt, vt multo vsu cruentas vrinas edu-  
*Gal.li.8.* cant, lienosos, ægrè spirantes ex oleo ad-  
*simpl.* mota iuuat. Vides quàm fœdè labantur,  
 qui Lycium veterum ex hoc fructu re-  
 presentant. Nunc flore ferè vtimur, & ex  
 eo vel flore ligustri aqua capitello destil-  
 lata, ad oris & faucium aphthas & nomas  
 colluendas.

*Rose pa-* **R**osa omnis amara est atq; astringens,  
*ru astring* præcipuè rubra, à qua substantia re-  
*gunt, vt* frigerat, siccatur, flos autem eius astringit ma-  
*lib.4.cõp.* gis, proinde etiam siccatur valentiùs. Rosa-  
*ph. part.* rum flores potius quàm rosas, quia Imbecil-  
 lam astrictionem habent, in Diabesasa po-  
 nit Heras libr. 6. comp. ph. part. Gal. & An-  
 dromachus in stomachicis, lib. eodem. Flos  
 autem est pars interior, in qua semen est &  
 capillus. Id semen vulgus Antheram vocat,  
 cùm Anthera compositio sit Græcis rosas  
 siccas & alia recipiens: quin & sine rosarum  
 flore anthera medicamentum est, lib. 6. cõp.  
 ph. part. Rosæ præstâtissimæ sunt, quæ lon-  
 gè omnium sunt suauissimæ, & aliis rubi-  
 eundiores. Siccandæ verò sunt loco subli-  
 mi meridiano, quo solis radij penetrent, ro-  
 sas tamen non tangant. Rosarum succus  
*Li.1.ant.* essentia est tenuissimæ, nam celeriter ace-  
*Lib.3.sim* scit, & lentore caret, & vnguentorum o-  
*plac.ca.9.* mnium odores exoluit & obscurat. Ex rosis  
 calid



calidissimæ videntur Moschatæ, post has  
roseo colore insignes, incarnatæ nobis di-  
ctæ, quæ & cerebrum valenter feriunt, pau-  
lò minùs albæ.

**Σχοίνον**, id est, iuncus absolutè scri- *Li. I. ant.*  
ptus, iuncus odoratus, Arabicus, Li-  
bycus, seu cum Celso rotundus, à trian-  
gulari cypero eum separante. Nescio au-  
tem qua causa vulgò **ἀνθόν σχοίνον** dicitur,  
cùm rarò flos eius ad nos deferatur, sed  
herba sepe, eius parte superiore à came- *Li. 8. sim.*  
lis erosa. Eam enim in Arabia viis copio- *et lib. 6.*  
sissimè crescentem, ob id parui pretij, li- *cōp. ph. p.*  
bentissimè cameli pascuntur. **σχοινόν ανθόν**  
**Αἰθουρίον**, vulgus Scœnanthum: modicè  
calfacit, & modicè astringit, est nonnihil  
tenuium partium, ob id mediocriter di-  
gerit, & mediocriter repellit: radix astrin-  
gentior, flos calidior, vrinas ac menses ciet,  
sumptum & foru adhibitum, iecoris, sto-  
machi, ventriculi phlegmonas iuuat, hæ-  
moptoicis, id est, sanguinem screantibus  
cum aliis prodest: solo odoratus vigore de-  
ligitur: nam odoris illius gratia celeriter  
vanescit. *lib. antidotorum.*

**Στορχάριον** nascitur multa vbiq; terrarū, co-  
piosissimam in Creta insula, & dictis Storch- *νύκλαριον*  
dibus insulis, in mari Iberico, à quibus appella *Gal.*  
ta est nascitur et in Arabia, vnde et Arabica *Li. 8. sim.*  
vocatur




*Libro 9.* vocatur. Amara est, modicè astringit, pro-  
*s.ph.p.* inde tenuat, terget, obstructa liberat, robo-  
 rat viscera & corpus reliquum, putredinem  
 arcet. Habitior & melius nutrita atque me-  
 lior ex insula Creta petitur, libro 1. Antid  
 Est in Gallia Narbonensi Stœchas citrina  
 vulgò dicta, à comæ & corymbi floris co-  
 lore luteo, Dioscoridis Heliochrysum, &  
 Galeni Amaranthus videtur: altera autem  
 flore purpureo.

Ex prædictis, & non paucis sequentibus  
 plantarū partibus, & animalium, atq; adeò  
 metallorum, aqua fit vi caloris vel ignei, in  
 flamma, prunis, arena, cineribus, scoria fer-  
 ri, calce irrigata, aqua feruente (quod diplo-  
 ma, id est, vas duplex dicitur) vel putre-  
 dinosi in fimo equino, corticibus putrenti-  
 bus, vel solaris. Tenuata enim humidi-  
 tas à calore vapor fit, qui elatus capitelli  
 vitrei, terrei, plumbei, argentei, vel alia ma-  
 teria frigida crassa constantis frigiditate  
 concrevit in aquam per nasum eius. deflu-  
 xuram in vas subiectum, quo modo pitui-  
 ta in capite humano ex totius vapore gi-  
 gnitur, & per nasum destillat. Cui si ignis  
 valentior sub finem accesserit, rerum ipsa-  
 rum humidum substantificum tollitur, & si  
 quod rebus ipsis inerat oleaginum, vel de-  
 habitur pro vasorum situ & figura. De qua  
 re



re fusiùs in compositis medicamētis agam,  
quod hæ aquæ quamuis simplices sint, quia  
tamen aliquid opera nostra acceperunt, & *Libro 1.*  
fortasse veræ sunt compositæ, vt aqua cal- *simpl.*  
facta Galeno.

## DE SEMINIBVS.



**S**EMEN à fructu differt, vt con- *Lib. 2. ali*  
tentum à continente, seu potius *mē. initio.*  
vt pars à suo toto. Fici enim fru-  
ctus sunt ipsi ficus, *νεχράμυδες*  
verò in fructu granula sunt semina, in mo-  
ro similiter. Et *γίραλλα* in acino fructu sunt  
vitis semina: & tria aut quatuor grana in  
medio pomo, pyro, sunt eorum fructuum  
semina: & in cucumere, cucurbita, pepone,  
melo pepone fructibus, semina insunt plu-  
rima & conspicua. In ceraso, pruno, mēspi-  
lo, vtroque corno, dactylo, myxis, seriphis,  
granatis, oliuis fructibus, quod ligno in-  
cluditur semen est, vt fructus, seminum sit  
munimentum quoddam & propugnacu-  
lum. Quoniam plantarum sit permultarum  
finis semen procreare, in quo spes maxima  
est speciei suæ propagandæ, & quoad eius  
fieri licet, perpetuandæ. Ob id magna id  
cura est à natura munitum, & loco penitio-  
re tanquàm tutiore repositum, ac non sola  
f



fructuum carne munitum, sed saepe ligno, vel osse, saepe cartilagine, saepe callo quodam duriore aduersus caeli & animalium iniurias. vel potius sit fructus, quod ex semine & reliquo constat, ut in leguminibus siliqua inuolutis. siliqua cum semine est fructus, plurima eorum substantiae pars est in seminibus. Est tamen ubi tenui discrimine distant semina à fructibus, ut segetes & legumina, Galeno scripta toto libr. i. alimentorum.

Præterea nuces regia, nuces Ponticae seu auellanae, pistacia. Quin per saepe Dioscoridi & Galeno *ναρπῖς*, id est, fructus, *ἀνθὸς ἀνέμωνα* & scribitur. Semen althææ, apij, agni, anethi, asparagi, dauci, fœniculi, genistæ, hyoscyami, lauri, plantaginis portulacæ, nymphæ, rosarum, & aliorum non paucorum in radicibus, aut herbis, aut floribus cognominibus; dictum est: quam rem index apertissimè demonstrat. Legenda autem semina, cum sunt matura, & fructus quibus includuntur, sunt maturi. Semina verò quotannis mutare præstitit, etiam si pleraque diutius seruari possint.

Diosc. &  
Gal. li. 6.  
sim. & li.  
7. comp.  
ph. part.

**A** Momum calfacit, valide siccatur, astringit, coquit magis quam acorum, siccatur minus, cætera facultatem habet eandem.

Odos



Odoris conciliandi gratia medicamentis etiam principalibus miscetur, vt in componendi ratione audies. Delige candidum vel fuluum, simplici tamen colore non vario, laxius in vua parua seminis tamen plena diffusum, non astrictius cohaerens, odoratum, nares vulnerans, acre, mordax, recēs, non cariosum. Amomi vua saepe Galeno & Actuario ob id dicitur, quod racematim velut in vua cohaereat. Laudatur amomum Scythicum, lib. 8. comp. ph. part. Non esse verò rosam Hiericuntis, aut Hierosolymitanam vulgò dictam aperte conuincit vtriusque historia. Hodie passim desideratur, nam quod ostendunt officinae, inodorum est: habeo apud me fuluū, paruum, oblongum, angulosum, odoris dum fricatur iucundissimi.

Amcos semen calidum siccum in fine ordinis tertij, tenuium partium, album, subamarum, acre, digerit, vrinam mouet. Ami commendatur Illyricum, lib. 9. comp. ph. part. alij Aegyptium laudant. *Li. 6. sim.*

Anisi semen calidum siccum ordine tertio, vrentibus proximum, acre, subamarum, vrinas ciet, flatus ventris dissipat; digerit: addit Dioscorides venenis resistere. Inter prima laudatur Creticum: melius recens & plenum. Eius loco & pe- *Li. 6. sim.*



*Li. 6. sim.* nuria Anisum dulce vsurpamus, quod γλυνάριον Actuarius sepe appellat. Ita sentire malo, quàm cum nonnullis Anisum vulgare Græcorum Anethum initio tertij gradus calidum, siccum primo affirmare. Anethum verò vulgare calidius siccus, Anisum Græcorum calidum siccum tertio gradu. Nam vero veterum Aniso (vt dixi) caremus. quod semen paruum apij semini simile, sed maius Dioscorides scribit: Anetho autem semen latum & foliatum Ruelius tribuit: ex quo scriptore nescio, nisi fortè Anethum nostrum pinxit non descriptum veteribus.

Acantha leuce Dioscoridis & Galeni, est Bedegar Serapionis, vt descriptiones & vires conferenti Sole clarius euadet: astringit enim, & siccatur minùs quàm spina Aegyptia seu Arabica amborum, quæ Succha est Serapionis, fructu & radice utilis: cum nostra Acantha leuce eadem, nisi quòd ob Soli & celi naturam est inefficacior.

**B**ombacis semen simplex cerasi nucleo simile. recentiores ad vitia pectoris purganda adhibent. Melita insula mittit multiplex, sibi implexum, nigrum.

Βασιλικόκαρπός, id est, Basilici semen. cardiacum Actuarius est: in vsu etiam interdum apud Gal. in comp. ph. part. inuenitur.

Cuc



**C**ucumeris esculenti semen magis incidit, terget, tenuis est substantiæ (præsertim arefactum, cōtritum, cribratum) quàm ipsa eius caro frigida humida ordine secundo, cum semen ipsum siccet ordine primo, aut etiam secundo incipiente. Ob hæc urinas mouet, & corpus *ῥύμα* & vice terget, & splendidum reddunt. Addit Dioscorides vesicæ exulcerationibus subuenire. Urinas magis mouent Pepones quàm Melopepones & Cucumeres, & Cucurbitæ, quod substantia sunt magis humida, aquosa, & tenui, & quæ in ventriculo facilius corrumpatur, & quæ vim quandam abstergerendi habeat, ob quam expeditius quoque deorsum quàm prædicta ferantur. Sordidam cutim, *ἰσχυλὴν*, lætes in facie, *ἀλφύς* extimos & superficia-  
rios detergent, semine potentius quàm carne, ut etiam renum calculis conveniat. Nulla verò seminis cucurbitæ Dioscoridi & Galeno in simplicibus est mentio, quum tamē hodie solenni quodam more vulgus medicorum in componendis suis medicamentis omnia hæc maritent, scribētes passim quatuor semina frigida maiora, ut distinguant à frigidis quatuor minoribus, lactucæ, portulacæ, intybi, fereos, id est, endiuicæ, scario-  
læ. Inter illa verò citreoli semen non melopeponis numerant.

*Gal. li. 8.  
simp.*

*Lib. 2 al.*



*Gal.li.7.  
simpl.*

Cari semen calidum siccum ordine tertio, mediocriter acre, vrinas mouet, flatum discutit: planta etiam reliqua ad hoc utilis à Caria regione laudatissimum afferebatur: vnde illi nomen multiplex, Carum, Carion, Careon, Caroon.

Coriandrum essentia amaræ habet plurimum, parum humiditatis aqueæ tepētis, pauxillum astrictiōis, à qua refrigerat, vt ab amarore calfacit, terget, digerit, tenuiū est partium, lumbricos necat: sed largius sumptum mentem mouet non sine periculo, ob id aceto maceramus, post siccamus.

*Cresson  
alenoy  
vulgo.  
Libr. 7.  
simpl.*

Cardamum, id est, nasturtium, semine & folio siccum est caustico & adurente, vt sinapi, phænigum, hoc est, rubrificationē, in coxēdicis aut capitis dolore excitat, eclegmatis mistū astmaticos crassis & lētis pulmonū excrementis valenter purgat vt sinapi.

Cardamomum Serapionis vtrunq; tam maius, quod Granum paradisi vocatum putant pleriq;, quàm minus, nihil habet commune cum vero, id est, Dioscoridis & Galeni Cardamomo, etiam hodie desiderato. Cardamomum absolutè & Cardamomum

*Libr. 1.  
antid.*

nigrum, lib. 9. comp. ph. part. & 1. antid. & in theriaca ad Pisonem.

*Carthamus.*

Cnici semen calidum, ordine tertio, purgat pituitam, vt cap. 5. lib. 2. simp. docet Galenus



lenus, & lib. 5. sanat. tuenda: quod in diacni- *Gaze cū*  
co compositione postea plenius leges. Ni- *vulgo.*  
hil tamen aut minimum harum virium in  
consueto nobis semine Cnici expertus, for-  
te quod à regionibus calidioribus non sit  
allatum, sed in agro Parisiensi natum.

Cumini semen vtile magis, calfacit ordi *Gal. li. 7.*  
ne tertio, siccatur, astringere addit Dioscori- *simpli.*  
des, urinam mouet, flatum extinguit: satium  
est ac syluestre, idque duplex Dioscoridi: lau-  
datur Aethiopicum, deinde Aegyptium.

Coccus baphica, vel coccum baphicum, *Kermes*  
id est granum tinctorum, baccula est aspara *& Al-*  
gi emula, foliis innata fruticis aquifolij ili- *kermes*  
cis. Theo. Plin. astringens, amara, siccatur sine *vulgo cū*  
morsu, ob id ad vulnera magna etiam ner- *Mauris.*  
uorum congruit, roborat partes siue his qua- *Li. 7. sim*  
litatibus manifestis, siue etiam (vt quibus- *pli.*  
dam placet) totius substantiae familiaritate,  
quam dicunt habere cum corde precipuam:  
de hoc in antid. *Διά λόκκων βαφινών.*

**E**RUCA foliis & semine calida, flatuosa,  
ob hac venerem largiore vsu excitat,  
in condimenta venit, urinas mouet. Sylue-  
stris satiuia est acrior. hac synapis vice vtitur  
Iberia occidentalis, Dioscor. Eruum cali-  
dum primo ordine, siccum secundo, amarum pro- *Orobis*  
inde, incidit, terget, obstructions liberat. *cū Graci*



lib. 8. sim-  
pli.

largo usu sanguinem per vrinas euocat, præsertim rufum. Nam Eruum non candidum sed rufum vehementer amarum est, candidum dulcius, lib. 1. antid.

Erysimi semen sapore nasturtij, calore igneo, vel aqua maceratum, vel linteolo & crusta pistoria inuolutum & tostū, ac eclegmatis mistum, crassa & lenta ex pulmone valenter promouet: id enim sic torrefactum terget, libr. 7. comp. Phar. part.

**F**Oenum græcum ficcum primo gradu, calidum secundo, libr. 8. simpl. calidum autem mediocriter, & ob id digerere dicitur, libr. 1. comp. Phar. part. Nam is gradus est medius inter summum & omnino temperatum, quod nec calidum absolutè, nec frigidum iure dixeris: phlegmonas arduas irritat & exacerbat, minus calidas & duras digerendo sanat.

**L**igusticum à Ligusticis alpibus, in quibus frequēs nascitur, Galeno & Actuário vnius literæ mutatione Libysticum: hodie rarum, semine solo visum Manardo, radix imperatoria vocatur Leoniceno & Musæ. Hoc autem accipiendum in compositionibus Arabum pro Keisim seu leuistico, apertè docet diatrion pipereon & diacalaminties, à Nicolao & Mesue ex Galeno paucis admodum mutatis descripta. In quibus



bus & aliis non paucis Arabum descriptionibus, vt diacymino, diamoscho, Libysticum reposuit Actuarius: vulgatum autem Leuisticum aut Smyrnium est cum Ruelio, aut apij vel dauci genus: cum Manardo Smyrnium, putante petroselinum Alexandrinum vel Macedonicum.

*Λινόςπερον*, id est, lini semen, humido *Libr. 7.*  
& sicco quodammodo temperatum, cali- *simp.*  
dum autem quodammodo ordine primo:  
flatuosum est etiam si frigatur, adeò plenum est humiditate recrementitia. Quia igitur calidum humidum flatuosum, semē homini generat. Lini semen torrefactum terget, vt prisma & farina fabarum, *libr. 7.*  
comp. phar. part.

Lini semen vires habet foenigræci, discuti- *Libr. 6. c.*  
tit, & emollit omnem inflammationē, dio- *phar. par.*  
scor. Erui semen admodum digerit, & lini *Libr. 11.*  
semen moderatius. Lini semen tepidè cali- *method.*  
dum, vt chamæmelum. Lini semen in aqua *Lib. 6. fa-*  
coctum refrigerantem succum gignit. Li- *nitat. tuē.*  
nospermō & succus rosarū frigidioris me- *Li. 3. sim.*  
dia temperie sunt naturæ, sed non ita mul- *c. 9.*  
tò, quin potius caloris sunt tepidi. Lini se- *Li. 4. rat.*  
men refrigerat, siccatur. Linospermon tan- *viēt. in*  
quàm frigidissimum vitandum asthmatici- *morbis a-*  
cis censet Galenus, vt meconium, mandra- *cutis.*  
goram, hyosciamum, cicutam, psyllium.



Linospermon urinas exigue mouet: frustum autem vreticum magis fit, & aluum magis sistit esu.

Lithospermon, quia semen duritie est lapidea, vel quia cum vino potum calculos frangit. Dioscor.

Lupinus est satiuus, idemq; vel dulcis, vel amarus: agrestis vero minor sed amarior, & ad omnia valentior domestico, terget, tenuat, incidit, digerit, siccatur sine morfu: vitiligines, psoras, achoras, vlcera cacoethae sanat, lumbricos necat sumptus & admotus, iecur & lienem purgat, phymata, chæradas liuida ex aceto, vel posca, vel oxymelite pro ægri natura & affectus varietate coctus digerit.

Li. 8. simplic. & li. 1. alimēt.

Nigella  
Gaze  
Nigella  
Romana  
vulgo.

Lens calido frigido temperata, sicca secundo gradu, valenter astringit, ob id ventrem sistit, abiecta priore aqua aluum mouente.

**M**Elanthium est Gith, quanuis flore sit ex cæruleo albicante, semine nunc nigro nunc rufo, calidum siccum tertio gradu, tenuium partium, amarum: assiduo olfactu catarrhos sanat, orthopnoeam iuuat, lumbricos necat, lepras terget, menses ob crassitiam & lentorem retentos mouet. Quæ vero in segetibus altius adolescit, Nigella vulgo dicta, inodora, pseudomelanthium, & Githago vocari possit, Hermolaus.

Ocy



**O** Cymum calidum secundo ordine, ex- *Li. 8. sim.*  
 crementitia humiditate, ob quam nū *pli.*  
 fumendum, sed foris illitum coquit & dige-  
 rit. Ocymum calfacit, tenuat, non tamen  
 valenter, lib. 2. comp. ph. par. Ocymi semen  
 Actuar. vsurpat.

**P** Syllium dictum quod semen habeat ef- *Dioscor.*  
 figie pulicis, humido sicco tempera- *Gal.*  
 tum, frigidum ordine secundo: ne putes  
 eum Arabibus corticem frigidum gradu  
 quarto, medullam gradu quarto calidam.

Papaueris genera sex Dioscoridi & Ga-  
 leno. Satiium calyce grandi, flore & se-  
 mine albo, minus frigidum, ob id esculen-  
 tum, & mediocriter somniferum. Sylue-  
 stre, flore ad medium nigricante, calyce  
 minore, semine nigro, admodum frigido.  
 Tertium etiam sylvestre procerius, squali-  
 dius, calyce longiore, omnium frigidissimum,  
 proinde stupefacit: amborum scapo sub ca-  
 pite conuulnerato succus defluit lacteus,  
 opium dictus: Meconium vero succus ex  
 his expressus crudis. Horum frigiditate  
 aliorum vehementem calorem obtundunt  
 Medici in suis compositionibus. Quartum  
 papauer Rhœas. Quintum Corniculatum,  
 Sextum Herculeum, *λεωκαί μίνων* & vsur-  
 pantur Actuario.

Sesi



*Siler vul-  
gò cum  
Virgilio.*

**S**esili radice & fructu, id est semine, valde calet, ac tenuium est partium, quare vrinam mouet, epilepsiae & orthopnoeae confert: laudatur Massiliense. Est alterum etiam Aethiopicum, & tertium Creticum Dioscoridi.

Staphis agria semine velut in vuam coacta (vnde illi nomen) vehementer acri & vrente, quod mansum pituitam in os ex capite plurimam detrahic, & illitum ex oleo capiti puerorum pediculos enecat: vnde Pituitaria & pedicularis quoque herba dicitur.

*Lib. 8. simpl.* Sinapi calfacit, siccatur ordine quarto. Sinapi Alexandrinum laudatur, lib. 9. comp. pharm. part.

*Lib. 1. an-  
tid.*

**T**hlaspi duplex, Cappadocium, nigrius, non exactè rotundum, sed quadam sui parte velut ἰσθλασμα habet, id est, infractum, exiguum, vnde illi nomen. multò maius & præstantius quàm secundum, quod etiam in Cappadocia & Creta, & vbiq; nascitur ὠχροφάνθον, id est, ex pallido flauum, rotundum, admodum exiguum. Creticum tamen plerique immiscunt theriacæ.

**V**rticæ fructus, id est semen & folia præcipuè vtilia sunt, non vehementer calfaciunt, tenuium sunt partium, digerunt, phym



phymata & parotidas, crassis & lentis humoribus pulmones purgant.

## DE FRUCTIBVS.

**F**RUCTVS est ea plantæ pars, quæ carne constat & semine: sæpe etiam pro semine ipso sumitur, vt libro sexto simplicium fructus vrticæ: lib. 8. simpl. fructus seseleos, fructus hyperici, fructus scille, periclymeni fructus & eiusdem semen, li. 9. cōp. ph. part. & alibi sæpe. καρπὸς τῆς τρύχης, Solani bacca Aëtuario.

**A**Mygdala amara incidunt, tenuant, tergent, digerunt sine morfu: ob id expulsiuone excreationē crassorum & lentorum promouent, obstructum hepar, lienem, renem, colum à crassis & lentis humoribus expediunt. Amygdala dulcia sunt moderatē calida, leuiculam tamen amaritudinem habent, sed à dulcedine occultatam, quæ tamen temporis spatio fit manifesta.

Libr. 8. c. 1.  
ph. p. 6.  
li. 6. sin p.

Anacardus, vel cum Aëtuario Anacardion, à cordis figura & colore dictum videtur, calidum siccum quarto gradu Melsæ, veteribus Græcis indictum, affectus cerebri & neruorum frigidos humidos mirè iuuat, ad motum cutim vlcerat, verrucas tollit, In India, Sicilia, Apulia, frequens.

Βαλατ



Li. 6. sim-  
pli.

**B**Αλαν & μυρεψιχὴν, id est, glans vnguentaria, Myrobalanus quoque Plinio dicta, ex Barbarica regione allata, Ben Arabibus dicta, hodie frequens, stomacho aduersatur, cū hydromelite pota carnis huius drachma vna est vomitoria: cum oxycrato autem iecur & lienem purgat, cū aceto item (quo maximè gaudet ad agendum) lepras, psoras, lētes, vitiligines, pruritum extergit, lieni & hepati indurato illinitur cum farina aliqua siccate vt erui, lolij: lieni etiam prodesse scribit Galen. in theriaca ad Pisonem. Carnis huius succo facultate calido vtūtur aromatarij: id enim inodorum cū sit, omnibus suscipiēdis odoribus est aptissimū, vt insipidū saporibus, & coloris expers coloribus. Id oleum Balaninū Dioscoridi dicitur. Olea expresso quod reliquum est magma terreum & amarum, incidit, terget, contrahit, stipat, ad prædicta etiā efficax, sed minus. Id autē videtur esse μυροβαλάνη πίσμα, id est expressum, quod cataplasmatibus miscet Galenus, lib. 11. & lib. 13. meth. & bis. li. 9. comp. ph. par. splenicis remediis, & ad scirrhusos lienis affectus adhiberi scribit Galen. Quo in loco μυροβαλάνη tantum, aliquando μυροβαλάνη σαρκὴς, aliquando βαλάνη μυρεψικῆς leues, aliquando μυροβαλάνη ἄλσθεν, id est farina & puluis, & μυροβαλάνη λιπαρά, χαυα,



*χαυα*, id est putamē & cortex, & *μυροβαλάν*  
*λίπυρα λινομήνα ηγίσσιονήνα*, id est, Myro-  
 balani testæ & cortices incisi & tusi cribra-  
 tiq;. Omnia hæc ad splenicos scribuntur, ut  
 sit credibile maxime de fructu eodē, scilicet  
 Balano myrepfica, & eius partibus, omnia  
 hæc intelligi. Quam verò myrobalanū Ara-  
 bicam intelligat Dioscorides, cui similē fa-  
 cit fructum palmæ Aegyptiæ, de qua nunc  
 dicam, planē ignoro. Nam Arabum recen-  
 tiorum Myrobalani quinque generibus di-  
 stinctæ veteribus indictæ putantur, & pru-  
 norum generi potius, quàm Balanorum, id  
 est glandium, assignandæ sunt. Sunt verò  
 hæc: Lutea seu citrina refrigerans, cholago-  
 ga. Inda & nigra, melancholiam purgat, &  
 exhilarat. Cepula phlegmagoga, visum illu-  
 strat, coctionē iuuat, pectus purgat hydro-  
 picis confert. Empelítica (quæ actuario *ἀμ-  
 πελίτις* & *ἐμβίσι* quoque dici videtur) etiam  
 phlegmagoga, venter purgat & robo-  
 rat, appetentiam reuocat, vomitū sistit. Be-  
 letzica empyos iuuat, hæmorrhoides & ca-  
 pilli defluuium. De his plura leges in Arabi-  
 bus. Ignorata quoque videtur hodie *χρυσο-  
 βάλλαν* Ⓞ, digerens & roborans, ut spica nar-  
 di, & ad colicos affectus, & stomachi ardo-  
 res & singultus adhiberi scripta Gal. li. 8. & *Libr. 10.  
 method.  
 Dioscor.  
 lib. 9. comp. phar. part. Epithema ex pin-  
 guib*



guibus palmulis, quas παλίτρε vocant, salubriter viscera refrigerat, si harum caro omni membranoso exempto coquatur cum aceto solo claro, vel etiam aqua adiecta donec tenerescat, & rufa applicetur. φοίνιξ in Aegypto nascitur, viridi colore, odore mali cotonei, medio maturitatis vigore per autumnū decerpi solet, Arabici Myrobalani similis, sine osse, quā Myrobalanum quoque vocari Hermolaus affirmat. πῶμα autem & ἄλφιον etiam Dioscoridi vocatur, quod ex hoc fructu palmæ Aegyptiæ humidiores, acerbo, astringente expresso, potus sit sitim sedans, Solino autore, qualis nobis ex pomis, pyris, sorbis. Hic autem fructus si usque ad maturitatem in arbore sinatur, solibus nigricat, & φοινικοβάλανον vocatur.

- Libr. 6. c.** φοίνικις ἢ φοινικοβάλανοι, vel quomodo aliter  
**phar. p.** vocare libet, moderatè stringunt, acerbo sapore:  
**Libr. 9. c.** φοινικοβάλανων τῆς σαρκὸς, & in codice  
**phar. p.** Scribonij ibidem. Caro φοίνικος συριακῆς in  
**Libr. 7. c.** arteriace Andromachi 12. & caro φοινικοβάλανων in 15. φοινίκων βάλανοι proprietatem  
**phar. p.** quandam habent capitis dolorem excitandi: easdem tamen dat ibidem in cephalalgia:  
**Libr. 2. c.** sed addit, si sint consuetæ & accipienti iucundæ.  
**Libr. 8. c.** Adhæc bilem pellunt deorsum, ut absinthium, & refrigerant, φοίνικις θηβαϊκὴ  
**Herm.** à Thebis Aegypti opinor, & paulò post, φοίνικ



*Φοίνικες πάτηλοι* celebrantur, *φοίνικες πάτηλοι*  
*μίτρι* bis lib. 9. comp. ph. part. & paulò  
 antè, *φοίνικων λάγνον*: *πάτηλοι* autem vo-  
 cantur, quòd id genus tertium palmula-  
 rum cariotarum præhumidum in parente  
 rūpat se præ humore, calcato simile reddi-  
 tum. *φοίνιξ* verò palmæ ipsius fructus, præ-  
 sertim dulcis, nō paucam obtinet calidita-  
 tem: tamen desiccatur, roboratur, contrahitur, sti-  
 pat, desat, sumptus & admotus. Hic autem  
 fructus à palmæ Aegyptiæ fructu ex osse dif-  
 fert: nam hic os habet magnum & longum  
 & durissimum, in quo semē id os vstum &  
 tritum valenter digerit, lib. 5. c. ph. part. Da-  
 ctylus à digitorum forma dicitur. *ὄφυ φοίνιξ*  
 verò dictus Act. & aliis quibusdam Græcis  
 recētioribus ab acido sapore, palmæ sylue-  
 stris fructus. Tamar Indus, id est, Dactylus  
 Indus Barbaris vocatus: quamvis cholago-  
 gus sit comprimendò, vt palmæ Aegyptiæ  
 fructus Phœnicobalanus, tamen os habet  
 quod satum arborem nobis produxit, aliis  
 multis conueniunt & differunt, vt mox au-  
 dies: sed Oxyphœnix veteribus indictus,  
 cū Phœnico balanus in his frequens sit.  
 Oxyphœnix subniger, lucidus, tener, villis  
 tanquā radicibus mistus, recens, pinguis,  
 acido sapore. Quibus notis apparet, quan-  
 tum conueniat cum Phœnicobalano, &



quātū discrepet: adhuc osse vt dixim⁹, & vsu  
hic recentiorū tantū, ille etiam veterū. Si frī-  
gidus est ventriculus oxyphœnici, debet mi-  
steri mastiche vel macis vel spica nardi. Ra-  
rò per se datur, picrocholis saluberrimū ad  
vncias quatuor dari potest. annis 10. serua-

*Nux mos-* tur. *Μοσχονάριον*, vel *μοσχοναρύδιον*, vel  
*chata' vul* *λίαννον μυστινόν* Græcis recentioribus, vt  
*gò, etiā si* Aët. dicitur. *λίαννον ἀρωματισμένον* Aëtio, veteri-  
*moschum* bus ignotum. Probatur hæc nux recēs, gra-  
*non oleat.* nis, præpinguis, & quæ acu vulnerata mox  
humorem reddat oleaginum. Reliqua hu-  
ius historia tam graphicè pingitur Ruellio  
medicorum huius ætatis doctissimo, vt po-  
steritatem latere non possit, vtī neque nux  
Indica oleo prægnans, semen augēte, & ve-  
nerem stimulante, vt ait Auicennas, veteri-  
bus quoque incognita, suis coloribus ab  
eodem bellissimè absoluta: & nux vomica,  
quia vomitum citat, & stupefacit, canes ac  
ceruos esu mox necat: cæteras aues, & pisces  
stupefacit, vt manu capi possint sopiti.

*Nux pi-* *C*œni Atticis vocatū olim fructus, Coc-  
*nea lib. 7.* cali verò & Strobili à quibusdā nunc  
*c. ph. p.* dicti, virides toti sunt subamari, & subacres  
*Li. 7. sim* emplastici sunt, & tergēt, purulentā & cras-  
*pli. et libr.* sam lentāque exoritionem promouent. Nu-  
*2. alimēt.* cleus autē eius esculētus, nutrimentū est coctu  
dif



difficile, validū: aqua maceratus acrimoniā *Ga. lib. 7*  
exuit, asperitatēq; lenit, & calido frigidoq; *simpli.*  
reperatuseuadit. In sua nuce pinea seruatur.

Cypressi pilulæ, quæ etiam Cœni quibus-  
dam dicuntur, vnde Coniferæ cyparissi. Vir-  
gil. siccant valenter sine insigni calore aut  
acrimonia: ob id hæ molles & recentes vlce-  
ra magna in duris corporibus glutinant, en-  
terocelas iuuant.

Cydonia Græcis, Cotonea Catoni, ma-  
lo omnibus nota. Quo in genere quædam  
sunt rotundiora, minora, acerbiora, quæ ma-  
scula vocamur: vt alia fœminea lōgiora, ma-  
iora, dulciora minùs acerba: quæ Struthia cū  
Asiaticis suis Galen. vocat, lib. 6. sanit. tuen-  
dæ: & στρεβύμυλλα, lib. 2. alimentorū. ex his-  
que vel aliis diacydonion cōponit, ibidem.

Citrū, vel malū citreū, seu citriū. seu me-  
dicum & aureum, succo acido (qui frigidus  
siccus ordine tertio, ex pane admotus phleg-  
monas internas cohibet, semine amaro, cor-  
tice odoro, medicis in vsu est aduersus inter-  
nas & pestilētes putredines, venena & partiū  
principū & stomachi imbecillitatē. Nam &  
roborat, tamē agrē is coquitur. Inter citrea  
mala Aranciū numeratur Hermolao, corti-  
ce, succo, semine illis proximū, vti & quod  
Limonem vulgus Gallorum appellat succo  
frigidiorē quā citrū: & quod ex insitione



*Diosc. & Gal. Lib. 7. simp.* pomum citreum vulgò dicimus Pomcire. Colocynthe, id est, Cucurbita sativa, frigida humida ordine secundo, ut cucumer satius, ad phlegmonas & sitim uterq; efficax. Colocynthidis verò fructus in pilæ mediocris speciem conglomeratus vehementer amarus, validè purgatorius, præsertim sua medulla, cuius oboli 4. bilem & pituitam etiam crassam detrahunt: balanis etiam & clysteribus sedi immittitur, stomacho tamen admodum aduersa est: ob id sola non vteda, quod docet hiera dia colocynthidos: legenda cum coeperit in pallidum colorem permutari. De hac Mesues multò plura scribit, quæ tãquam parũ momentanea neglexi.

Cucumeris agrestis quàm satiui fructus multò est minor, oblongis glandibus similis, cuius succo elateriũ qua ratione fiat, docet Dioscor. amarus est, bilem pituitamque purgat, præsertim hydropicis citra stomachi iniuriam, radice alba, magna, & præsertim eius cortice & foliis etiam utilis est, sed inefficacius utrunque, ciet menses, emollit, terget, digerit, purgat, quàm elateriũ: summè amarum, tenuium partium, leuiter, ut ad secundum ordinem, calidum.

*Dioscor.* Calpobalsamum, id est, fructus Balsami, flauum sit, plenum, grande, graue, mordax gustu, & feruens in ore, modicè opobalsamum



mum redolens. Adulteratur semine hyperi-  
 co simili, quod Petra Palæstinæ oppido af-  
 fertur: sed id Carpobalsamo maius, inane,  
 viribus ignauū, sapore piperis. Carpobalsa-  
 mum tamē adulterari non potest, lib. 1. an-  
 tid. Galen. Balsamo planta secundo exces-  
 su calida sicca, tenuium partium: & Carpo-  
 balsamo, & Xylobalsamo liquor est te-  
 nuior, minū tamen calidus quā quidam  
 existimant, tenuitate partium decepti. Sepe  
 enim expertus sum non iuuisse dispositio-  
 nem calfactione egentem. Opobalsamo  
 igitur (quod & βαλσαμίλαιον vocari dicit  
 Simeon) recenti, validi odoris, subruffo, al-  
 bo, vel viridi (nigrum autem pessimum est)  
 syncero, dilui facili, læui, astringenti, non  
 acido, linguam modicē mordenti, est præ-  
 cipua inter has plantæ huius partes autori-  
 tas, & vis efficacissima. Laudatissimum au-  
 tem est Syriacum, siue Iudaicum, siue ex Sy-  
 ria Palæstina, ac præcipuē Sigadinum, è lo-  
 co Palæstinæ, in quo copiosissimum & op-  
 timum gignitur. Opobalsamum fit Syria-  
 cum, tenue, perspicuum, substantia non cras-  
 sum, quale in fundum vasis subsidere solet,  
 quale item fit vetustate. Opobalsamum va-  
 riis adulteratur modis, ut egrē possit etiam  
 ab exercitatissimis cognosci, ut in adulteri-  
 is docemus: alias veri opobalsami notas ex

*Li. 6. sim-  
plic.*

*Gal. lib. 2  
c. ph. p.  
Dioscor.*

*Li. 1. anti  
Lib. 4. cō-  
phar. p.*



**Diosc.** Dioscoride requiras : hodie propemodum defuit videri. Xylobalsamū autem surculus est recens, sarnēto tenui, fuluus, odoratus, Opobalsamum nonnihil spirans.

Cassia fistula Arabum veteribus Græcis indicta, recentioribus Cassia syringodes, id est, fistulacea, & nigra Actuaria, scribēti passim *λασσίας μελάωνος τοίνος*, à quo belle describitur. Ex India, Syria, Aegypto affertur: optima est collucens, grauis, plenior, & quæ cōcussa clausis intus granis nō strepit, atramēto intus seu pulpa pingui, splēdente, succulēto, nō situlēto, nec putri: calida humida primo gradu: vacuat: omnes humores leniēdo pueris & prægnaſtibz à drach. sex ad vnciam vnam & dimidiam. Si verò alius fluit, mastiche aut myrabalanis assis corrigitur. Cassia autem Græcorum quæ sit, post leges in Cinnamomo inter cortices.

**Lib. I. antid. & in theriaca ad Pisonem.**

**Li. 7. simplic.**

Cubebę non sunt cum Serapione & aliis quibusdam neotericis, Galeni *λαρπύσια*, nec Dioscoridis oxymyrſines seu myrti syluestris fructus (nam is Carpesiorū non meminit) vt Cubebas cum prædictis conferēti patet. Hæ enim sunt fructus tenues piper æmulantes, sed minus acres & subamari. Galeni verò *λαρπύσια* sunt *λάρφη*, id est, festucae tenues, *ἀνρίμοσι*, id est, surculis cinnamomi, similes odore vocati *φά*, sed valentiore, & nonni



nonihil aromatico, quē & gustatus deprehendit, facultate etiam Phu similia: sed quia sunt tenuiora, viscerū obstructions potentiū detergent, & urinā mouent, & renū calculos expurgant. Non adeo tamen sunt tenuium partium, ut cinnamomi loco usurpari possint, cū Quinto: cum multo sint deteriora optima Casia. In Side Pāphiliæ loco: quia luxuriat carpesium ibi est vilissimum. Actuarius tamē *κομπίβας* vel *κομπίβας*, etiā *λαγπίσια* vel *λαγπίδια* vocari scribit.

*Locis prædictis, & lib. 3. c. ph. part.*

**F**icus recens præhumida modicè calida, digerit, non potest coquere: Ficus verò arida seu passa, id est carica calida, in fine primi gradus, vel initio secundi partium tenuium, degerit, tenuat, coquit, pinguior magis coquit, acrior potentiū terget, & digerit: *σύνκα λινκά* ficus candida, interdum pingues Actua.

*Libr. 3. c. ph. p. & libro 8. sim.*

**G**alla est fruc. roboris, & cæterarū gladiiferarū arborū. ea vel est omphacitis, id est, immatura, parua, nodosa, grauis, solida, non perforata, cæteris præstantior & maiore vi in medicina: ob id ea, sed magnitudine mediocri, deligitur. Heræ. libro 6. comp. ph. p. Altera est magna, rotundissima, læuis, leuis, laxa, perforata, flaua. Vtraque refrigerat ordine secundo, siccatur tertio, crassæ est essentiæ, astringit.



*Li. 6. simpli.*

**I**Uniperi fructus calidus ordine tertio, sic-  
cus primo: sed folia calida sicca gradu ter-  
tio.

Iuiubæ, Zizipha Græcis Zinzipha etiam  
Actuario, fructus Myxariis affinis facultate:  
nā calidus humidus primo gradu, etiā pul-  
monarius: est duplex, sericum, id est, rufum,  
nobis frequens, & candidū, adhuc ignotū.  
Affluxiones calidas, acres, tenues, in pectus  
salubre: ut alimentum verò à Gale. damna-  
tur lib. 2. alimentorum. Quem locum Aui-  
cennas, Sauonarola citant in suis Iuiubis.

*Diosc. &  
Gal. li. 8.  
simpli.  
Libr. 6. c.  
ph. p.*

**M**Alum granatum seu punicū triplex,  
dulce, acidū, acidodulce scilicet suc-  
co, saporis naturam viribus refert: omnium  
tamen flos, cortex nucleus astringit, sed aci-  
di & acerbi magis, dulcis multò minus: me-  
di horum mediocriter. malicorium, id est,  
cortex nondum aduكتور sed perfectioni  
propinquorum est melior ad astringēdum  
in ore affectus ex fluxione nascentes.

*Sebesten.*

Myxæ, & myxa, & Myxaria Actuario &  
Græcis quibusdam aliis recentioribus, ἀπὸ  
τῆς μύξης, id est, à mucco lento è naribus  
fluente: cū simili hi fructus abundant, bi-  
lem detrudere, & sitim sedare dicuntur, hu-  
mida primo gradu, calido frigido tēperata.

Myrti vtriusque germina, folia, bacca,  
succus



succus constant substantia calida, tenui, & cōtraria illi frigida, terrea, astrīgēte, magis syluestris quā satiuā. Bacca Catoni Myrta, Murta Varroni, Myrtili vulgò, Myrt<sup>o</sup> alba & nigra passim dicitur Gal. in cōp. ph. p.

Myricę fructus generosissimè astringit: libr. 6. comp. ph. part.

Morum album Græcis veteribus inditum videtur, & Latinis, præter quā Ouidio, fortè quia per infitionem in populo alba gignitur: nigrum cantatissimum, & arbor cuius foliis bombices pasti sericum nēt pulchrius & splendidius. Mori tamen albæ folium ad hos alendos est mollius, eoq; hodie tota Italia vtitur. Sycomorum seu ficū Aegyptiam non habet Italia, Musæ.

**K** *ἄγρον βασιλικόν*, idest Iuglans seu Nux Lib. 7. simp.  
regia, nucleo est tenuium partiū vbi *plic.*  
inaruit, siccatē etiam sine morfu, ex quo inueterato oleum valenter digerit.

*Ἀπὸ τῆς ἄγρου*, id est nux tenuis, Pontica, *Ibidem.*  
Prænestina, Auellana, à locis vbi luxuriat Ponto, Præneste, Auellis dicitur. plus habet terreæ & frigida substantiæ, ob id austerior.

Nuces teneræ, rancidæ vstæ, cinere digerunt & astringunt, libro sexto part.

Nux Indica Actuário in diasatyrio & diaromato.



**O**liuæ halmades, quæ in muria sua seruantur, & in ea vel oleo suo quasi urinabundæ innatant, Colymbades ob id dictæ, plurimum astringunt & digerunt: sunt tamen mitissimum ad aphthas remedium lib. 6. comp. ph. part.

Oxyacanthæ vel Oxyacanthi racemosa bacculae dū maturuerunt rubentes, astringunt, vis eadē foliis, sed languidior. Radix infixa corpori spicula extrahit, trita & ad-mota Dioscor.

*Lib. 8. sim  
plic.  
Lib. 2. an  
id.*

**P**iperis fructus inter initia ceu siliqua coryli nucamēto similis, longū piper est: humidius, ob id citò perforatur, vt zīgiber, & tardè, sed diu linguā mordet, vt arus. Hęc siliqua postea in grana milij emula racema tim degenerat, quæ aucta & ficcata, sed adhuc tāquā omphacodea & immatura Piper albū sūt, nigro *ἀπὸ πύρινον*, id est, acrius, nam nigrū iam superassatum sole & superficcatum est, tamen utrūq; valenter calfacit & ficcatur, & maximè digerit. Idē in agreste rufum cœli & foli iniquitate degenerauit.

*Lib. 1. an  
nd. & lib.  
4. san. in.*

Piper lōgū adulteratū seculo Galeni erat duplex, afferebatur alterum ex Alexandria, alterum erat germen herbae cuiusdā, quale est nobis coryli aut betulae nucamentum.

Piper longum nec sit pertusum, nec adulteratum: album sit maximum, plenissimū, graue:



grauē: itidem & nigrum, neque id sit rugosum. Piper nigrum maius est alio pipere, & corticem habet tenuiorem & minus rugosum, lib. 1. Antid.

Piper albū stomacho est accommodatius, & acrius nigro, li. 9. cōp. ph. p. Piper omne coctionē sumptū iuuat, sed albū supra duo reliqua genera stomachū roborat, lib. 4. sanit. tuendæ, & lib. 9. c. ph. par. Radicibus piperis maximè proceris etiam vititur Andromachus apud Gal. lib. 7. comp. ph. parr. His vires costo similes tribuit lib. 8. simpli.

Piper longū & rotū dū bis scribitur li. 10. comp. ph. p. vt id albū & nigrū cōprehēdat.

Piper *κωνόμ*, id est, commune Actuario in antidoto podagrica, diapæronia, & diatrion pipereon, est nigrum: nam longum & album ibidem commemorat.

Pistacium fructus strobilo proximus, ex Lib. 8. simpli. Syria largus affertur, subamarus, odoratus, tenuis essentia, obstructions præfertim iecoris, sed & pulmonis, & thoracis liberat.

Pruna dulcia aluum subducunt, alia pro Lib. 9. sanit. tuendæ. qualitate saporis nos afficiunt, bilē ex ventre comprimendo vacuāt astringentia. Damascenis ad aluum subducendam longe præfert Galenus Hispanica seu Iberica, vulgò hodie Augustana, quia mense Augusto matura leguntur, & Cathalaunica etiam  
Italis



Italidis dicta ab hac Hispaniæ regione, in qua luxuriant.

*Sumach.*

**R**hus hic aut hæc, est fructus racemosus, cortice acido, astringente, repellente, nunc medicamentarius tantum, olim etiam culinaris, pro sale obsoniis aspergebatur: stomacho valde idoneus: alter verò & coriarius desandis pellibus applicabatur. Ille etiam Syriacus & ruber, libr. 3. & lib. 6. comp. ph. part. Vterque tamen musto austero incoctus stomachicum est medicamentum optimum, lib. 6. com. ph. part. Eius succus omphacij vice est in Gallia Narbonensi, in hortis Gulielmi Pellisserij, Episcopi Montispeffulani longè omnium doctis. et optimi.

*Ibidem.*

Ribes Arabibus dictus, fructus est racemosus, acidus, acerbus: frigidus siccus secundo gradu sitim extinguit, vomitum & fluxum alui biliosum sistit, morbilis & variolis (quas vocant) saluber, frutex nobis poteriū rubrum dicitur. Quid sit, frutex an herba, & quæ, ambigit Serapio in suis testimoniis.

Succus ex his expressus cum saccharo cydoniati modo coctus est delicatissimus.

Ribes Damascenus Musæ additur foliis rotundis, & magnis viribus iisdem.

*Li. 3. hist. plant.*

Rubi, seu Sentis, Græcè βάτον genera Theophrasto tria sunt: magnus seu rectus, humilis, & medius. Batus magnus seu rectus est



est Dioscoridis & Galeni *λυυοσβάτ* & fructu oblongo per maturitatem rubente, cyrino simili, in quo ceu lanę flocci arteriam si deuorentur infestant: huic foliis, fructu, rosa similis est cynosrhoda, Englentier nobis dicta: & rosa frutex omnis, nisi quod ferè gerit folia florum magis multiplicia & maiora, arte opinor adiuta: sed Cynosbatos spinis hamatis horridior, rector, & altior asurgit, odore caret, quem Cynosrhoda tota habet præstantissimum: rosa verò frutex flore solo est odorata, nunc albo, nunc rubro, nunc amborum medio (incarnatum vocant) nunc etiam moschato. *Χαμαιβάτ* & autem, id est, humilis rubus. Dioscoridi & Galeno absolutè tantum *βάτ* & dicitur, foliis multo maioribus quàm cynosbati, bicoloribus, per nodos ternis, sarmentis longissimis & firmissimis, qua parte terram attingunt, radicem iterum faciētibus, flore albo, tenui, racemoso. Cui succedunt Mora grandia, racemosa, multis granis coagmentata, per maturitatem nigerrima, *βάτινα* Galeno dicta. Medius denique est *βάτ* & *Ἰάχι* & Dioscoridis, longè tenerior priore, ac minoribus spinis horrēs, quāquā & sine spinis inueniatur: freques is est in syluis, folia habet chamæbati, sed paulò minora; rectus ferè surgit ad duo aut tria cubita, scapo gracili

Ronce  
Gallus.



NO DE MEDICAMENT. SIMPL.

gracili & infirmo, & minimum spinoso, flore simili, & fructu, sed minore & granis, quinque, sex coagmentato, & per maturitatem nigerrimo, sed in cœruleum inclinante ob aërium quoddam tectorium, nigrisvuis & prunis, & aliis multis fructibus innascoli: astringunt, siccant, refrigerant omnia hæc magis & minus. Ad rubum Ideum docti hodie reducunt hortensem rubi recti, brevis, parum spinosi speciem. foliis bicoloribus, fructu dum maturuit olfactu & gustu iucundissimo, fragi rubri (est enim etiam album) æmulo: quem fructum herba trifolia & bicolor fert acre, præsertim semine. Flos rosarum astringit magis quam ipsæ rosæ, lib. 6. comp. ph. part. & alibi sæpe. Est autem id crocatum in flore medio, quod Anthera vulgò dicitur, corrupto fortè vocabulo, pro ἀνθὸς ῥόδου: cum Anthera Galeno sit nomen compositi medicamenti.

**S**enna Hermolao, Serapioni Sene, folliculis latis sed falcatis, & in his semine utilior purgando humori melancholico, in morbis ab eo prodeuntibus. Datur pulvis eius ad drachmā vnam, decoctum vel infusum eius à drach. 2. ad drach. quinque: multis torminosa est, aliis est clemens pro varia sumentium natura: tutius tamē est, mastiche vel




vel caryophyllis & alio corrigere: foliis nō est inefficax. Non esse autē Dioscoridis vel Empetrum, vel Delphinium, vel Peplium, vel alypum, planē intelliges, si rem cum picturis horum conferas: veteribus enim omnino indicta est planta, amara, subastringens. Indica, Aegyptia valentior vncia dimidia, quā Apula, aut Ligustica vncia vna: & recens præstantior quā inueterata.

**V**asatiuæ vitis coquit, astringit, læuiter digerit. *Li. 6. sim.* Vux passæ caro tantum astringit, quantum eget hepar affectū. Habet præterea facultatem coquendi crudos humores, & euincendi malignos: ægrè corrumpitur, tota substantia familiaris est hepatis, & vsu crebro consueta est: ob id felicissimè miscetur medicamentis hepaticis. *Lib. 8. cō. ph. part.* *φάλας λιναθαρμύρας*, id est, exemptis vineis Actuar.

Fructus herbarum, vt mandragoræ, cucurbitæ, vtriusque cucumeris, peponis, ex herbis, quarum naturam ferè sequuntur, noti sunt: tamen pomum mandragoræ calorem quendam odore testatur: & colocynthidis fructus medulla amarior & purgantior, quā ipsa planta, vt antè diximus: *ἀγούριον* peponibus addit Actuarius.



Diosc.  
Lignum  
aloës.



**A** G A L L O C H V M est lignum, quod ex India & Arabia defer-  
tur, maculatum, odoratum, gu-  
stu astringēs, & subamarum, cu-  
te aliquantum versicolore. Halitum māsu  
commendat, ventriculum frigidum iuuat.  
Act. est enim eustomachum. Pro thure ad  
suffimenta substituitur Dioscoridi, eiusque  
modo liquefcit, sed tardiùs: aquæ iniectum  
subfidet, & bullulas edit. Arborem huius  
triplicem scribit Ludouicus Rom. Patrici-  
us in tractu Indico videri, Calampat perfe-  
ctissimam, Bochor vilissimam, Iubam me-  
diam. Xylaloë Aëtio & Actuário dicitur,  
id est, lignum aloës, arboris non herbæ.  
Rhodiis militibus est frequens in corollis  
precariis. Quod verò ostendunt officinæ,  
verius est aspalathū acre & austerum, Gal.  
lib. 6. sim. quod aroma apud suos nasci idem  
Gal. scribit lib. 8. comp. ph. part. & in Syria  
& Rhodo Dioscoridēs: graue, detractō cor-  
tice rubens aut purpurascens, densum, odo-  
ratum, amarum, astringens: alterum deteri-  
us, candidum, lignosum, inodorum, Diosc.

**B** Ersilium, vel Verzinium, à Verzinia  
vrbe Indiæ aduectum & dictum, me-  
dicis.



dicis in vsu nondum venit, sed infectorium tantum est rubenti colore.

**G**Aiacum lignum haud ita pridem inuentum, morbis omnibus ex humore praesertim frigido natis salubre est: nam acrimonia & amaritudine incidit, tenuat, terget, vacuat. De huius facultate mira doctissimus Antonij Galli medici commentarius, his diebus paucis in lucem editus, facit, ne mihi de hoc pluribus sit agendum: ut interim taceam Huttenum, Mathaeolum, Massam, & alios quamplurimos, qui verbosissime vires eius nobis inculcarunt, potissimum in curanda lue Hispanica: sed tamen etiam morbis aliis, praesertim frigidis, conferre tam est hodie persuasum, ut certatim eo etiam magnates uti gestiant.

**Λ**οτὸ ῥίνημα, id est, scobs & rasura Loti, *Libr. 7.*  
ad sanguinis sputum vsurpatur Actuario in *Διὰ κλέντρα:* Galeno autem ad mulie- *simpl. in*  
bre profluuium, dysenteriam, coeliacos affe- *loto arbo*  
ctus. Huius fructus etiam valenter astringit. *re.*  
Alisa vulgo dicitur, & arbor ipsa Alisier.

**S**antalum triplex Actuario Græcorum *Sādalum*  
foli, Arabes ut videri potest, imitato: al- *vulgò.*  
bum pessimum, rubrum bonitate medium,

h



*λίτριον* Act. flauum odoratissimum & optimum: frigida omnia gradu tertio, sicca secundo, hepar roborant Act. Ex agro Calicuti Indiae emporij aduehunt Lusitani. Quod autem officinae vsurpant, est calidum, & linguam acrimonia pungit, praecipue citrinum: vt cedri vel alterius aromaticae & calidae arboris lignum iure optimo cenferi debeat: nec vtendum nisi medicus iusserit.

Xylobalsamum in carpobalsamo dictum est. Xylocinnamomum, in cinnamomo dicetur mox, & Xylocasia Actuarij in casia.

*Lib. 9. cō.  
ph. par.*

Aromatica verò medicamenta sunt nardus Indica & Gallica, *οξύς & υδός*, casia, amomum, cinnamomum, costus, spica nardi, calamus aromaticus, iris, ladanum, malobathri folium, styrax, bdellium, opobalsamum, xylobalsamum, & reliquis aromaticum catalogus, aspalathus, myrrha, crocus, macer, opus Cyrenaicus, pretiosa haec & sumptuosa: pauperum verò communia, meum, distamnus, acorum, cardamomum, *lib. 6. & 8. comp. phar. part.* Piper verò non esse aroma, ex priore loco colliges. Omnia autem aromata sunt calida sicca, tenuium partium, *libr. 7. comp. phar. part. in fine.*

DE CORTICIBVS.

COR





**C**ORTICES fructuum, vt aran-  
cij, citrei, granati: radicum arbo-  
rum, vt oxyacanthes, capparis, ta-  
maricis, fraxini, sambuci, mori,  
thuris: & herbarum radicum, ebuli, apij, pe-  
trofelini, foeniculi, mandragoræ, raphani,  
in cognominibus plantis vel dicti sunt, vel  
dicuntur. Qui verò præter hos sunt exoti-  
ci, & ob raritatem quidem, etiam ob facul-  
tatem in maiore pretio habiti, nunc præci-  
puè dicuntur.

**C**innamomum arbor lauro foliis & bac-  
cis similis, & eius ramorum non truci,  
tertio quoque anno delibratorum cortex:  
Ludouicus Romanus Patricius. Cinnamo- *Li. 7. sim.*  
mum calidum tertio ordine, siccatur autem & *Lib. 6. cō.*  
digerit super omnia æquè calida, propter *ph. par. in*  
summā essentia partium tenuitatem: propter *diabesa-*  
hec dispositionibus scirrhis mederi solet. *sa.*  
Idē cunctas corrigit putridas & venenatas *Lib. 7. cō.*  
viresichorum, & humorū, & lethaliū phar- *ph. part.*  
macorum, & veneni virulentarum bestia- *Lib. 8. cō.*  
rum. Idem sua facultate alteratrice & dige- *ph. part.*  
rente, & odoris gratia, præsidium est non par- *Ibidem.*  
uum aduersus omnes prauas dispositiones,  
& casta, & pleraq; alia aromatum materia.  
Cinnamomum quia tenuissimarum est par-  
tium, ventriculi meatus aperit, qui humo-  
res crassi & lenti inhæserunt, tenuat, &



terget, ob id cōmodè hieræ miscetur. Cinnamomi autem facultas qualis initiō adest, integra seruari nequit ad annos triginta, multò minus ad centū, vel etiā ducentos, vt quibusdam visum est, cinnamomū senij expertis putantibus. Nam id seruātū vasculis ligneis ab imperatoribus variis, Traiano, Hadriano, Antonino, Commodo, Seuero, imbecillius tāto est expertus Galenus, Seuerus theriacen componens, quāto vetustius: cōtrā tanto valentius, quanto recentius. Nam Seuerus Imperatori theriacā parare iussus, qualē Antonino Imperatori parauerat, coactus cinnamomum capere ex Traiani & Hadriani temporibus relictū, cū nōdum triginta anni prēteriiissent, multò inualidi<sup>9</sup> expertus est, lib. i. antidot. Arborem enim totam primi generis cinnamomi ex Barbaria in scriniolo cubitos quatuor & semisē longo ad Antoninum allatam vidit Romæ Galenus, ex eāq; theriacen paratam aliis lōgè pręstantiorem expertus est, vt ea etiam ante duos menses Antonino vti licuerit, nō expectata medicamenti cōctione. Cinnamomum optimum, iis qui id crebrò viderūt, omnium facillimè dignoscitur: & cū principum cinnamomorum sex sint differtēz generales, optimi tamē supra deterrium insignis est excessus, vt in cassis, quarum



rum tamē optima parum à prauissimo cin-  
namomo abest. Id autem cinnamomum est  
odoratissimum, ac indicibilē quandā odo-  
ris gratiā super alia omnia refert, gustatu  
admodum calidum est: non tamen adeò, vt  
molestè rodat: color illi est lacteus, cū *q. a. u.*,  
id est, giluo, & cum cyaneo mistus. Cinna-  
momum quantò casia sit præstantius, do-  
cet Gal. lib. 5. comp. pharm. part. in dentifri-  
cio: quod si odorum facere vis, misce casia  
aut amomi drachmas duas: si regi paras, cin-  
namomi drach. vnam, vbi non solum casia  
pōdus duplat, sed etiam mediocribus dicat  
cinnamomum regibus. Ob id penuria cin-  
namomi duplum casia miscendum omnes  
propemodum veteres scripserunt, vti quod  
pondus aliquis robustus ferre consuevit, eo  
absente ferant duo imbecilli. Quintus au-  
tem penuria cinnamomi multum vti du-  
plum carpesij miscebat, cinnamomo miscet  
casiam duplicatam, Aēt. in pastillo ad ileo-  
sos. Pseudocinnamomum verò est simile,  
ob id facile nobis imponit, sed gustu & odo-  
re lōgè est inferius. Xylocinnamomum li-  
gnosum est: valida habet virgulta, nec simi-  
lem habet suaueolentiam. Cinnamomū o-  
mnium præstantissimū est cineritiū colo-  
re, virgultis gracilibus, nodis frequentibus.  
odoratum vehementer: idque odore longè

*Libr. 1.**antid.**Gal. i the  
riace ad  
Pisonem.*



optimo & suauissimo, gustu acri, & admodum mordaci, & quod mansum *πικρὸν* id est, rutam olere videatur, laue, confringi facile: addit ibidem veri cinnamomi genera aliquot. Vero igitur, cinnamomo nos caremus: nostra autem Cannella aut Casia est, aut pseudocinnamomi species. *λεπτοκάρπιον* Act. pro optimo vsurpatur.

*Casia lignea vulgò, & aromatica: est autem nostra cannella.*

*Li. 1. ant. Galen. in theriace ad Pis.*

**C**asia verò genere proxima cinnamomo est, quin ipsa nonnunquam ex accumulatione euadit cinnamomum, vt totum quidem veluti exacta arbor, casia videatur: surculi autem in ea quidē cinnamomi, ramis casia proximi reperiantur. Optima Casia in cinnamomum degenerat. Vidit enim sepe Galenus casia sublimis & ramosa ac fruticis emule in magnitudine surculos cinnamomi surculis omnino similes, corticis tenuitate, & firmissimis cinnamomi notis in odore & gustu deprehensis. Casia sepe imponit, nisi sis in diiudicando expertus: pseudocasia enim veræ est persimilis, sed odore minus est grato, & corticem medullæ adherentē habet. Optima autem laudatissimaque est *λίππα, ποδίσσα, δινίσσα*, id est, rufa, rosam expirans, & vinum olens, gustum dulcem præferēs, fistulosa, & aromatum modo vehementer odora. Casia cortex Actuario

*Li. 4. & cō. ph. p.* etiam dicitur. *οὐρίξ τῆς κασίας* idem, Casia Aegyp



Aegyptia idem, in afyncritico casia cathar-  
tica, id est, purgatrix quibusdā dicitur. *ἡ σύ-  
ριξ τῆς κασίας*, li. 1. antidotorum in compo-  
sitione theriaces. Casia *σύριξ*, id est fistula,  
& *ῥιζά*, id est, rufa dicitur in arteriacis An-  
dromachi: *πυρρά* verò bis lib. 6. eiusdem. *μυ-  
λάνη* autem in fine lib. 7. bis, & libr. 8. eius-  
dem. *ῥοδίσις* denique, id est, rosam spirans,  
lib. 8. *ξύλο κασία* eadem Actuário, & Arabum  
alumnis casia lignea. Casiam fistulam cum  
Andromacho minore ad Galeni ætatem  
omnes theriacæ miscebant: hæc autem o-  
mnibus nota est, & comparatu omniū fa-  
cillima. Corticem verò exteriorem (quem  
& fistulam dicunt) odoratu & gustatu valē-  
tem habet: quod autem intus est, maximè  
imbecillum, ob id inutile. Aduersus putria,  
deleteria, venena, proxima post cinnamo-  
mum casia, quæ optima est, atq; illi cogna-  
ta valet: aromataq; cætera, nardus, iuncus  
odoratus, calamus, aspalathus, myrrha, cro-  
cus, eandem habent facultatem: sed cinna-  
momum digerit: casia verò & malabathri

*Κασία δα  
φνίτις.*

*Lib. 9. c.  
ph. part.*

*Lib. 1. an-  
tid.*

*Libr. 8. c.  
ph. par.*

*Libr. 4. c.  
ph. par.*

**M** Acer Dioscoridi est cortex flau-  
scens, seu cum Plinio rubens, radicis




*Libro 7.  
simpl.*

magnæ, nomine suæ arboris nobis incognitæ, crassus, gustu perquàm astringens, ex Barbaria allatus. Galeno autem est cortex gustu multum acerbo, cum leui quadam acrimonia, odorem iucundum redolens, vt pleraque aromata, siccat ordine tertio, calore & frigore est temperatus. Tamē libro 6. comp. phar. part. in compositione διὰ ῥοιῶν, ad finem scribit καλὸς μύρον μάκις φλοιὸς τις ἀροματικὸς ἰκανῶς θυμαίνων τι καὶ τύφων: nisi causeris aduerbium ἰκανῶς transponendum, vt solūm determinet τύφων. Ex India verò affertur. Macis autem Arabum membrana est extima nucem moschatam propè totam vestiens, tenuis, rufa, aut flaua, interdum nigricans, aromatica, odore suauis, sapore subacri, & minimum amaro, tenuium partium, calida sicca tertio gradu, ventriculum roborat, coctionem iuuat. Ex quibus liquet, Macis & Macer res planè diuersas, licet odore, colore quadantenus conueniant: at temperamento tamen differunt, nisi contendas in Dioscoride & Galeni simplicibus mēdum esse, quod vix queas demonstrare. Quòd si res sint diuersæ, vt ex Plinio aperte patet, Macer hodie est incognitum: tamen pro Nicolai Macis Actuarius μάκις reponit.

DE SVCCIS.

χυλός





ὕληs, id est, succus ex plantis to-  
 ris, vel plantarum partibus cōci-  
 sis & tuis torculari, vel manu,  
 vel aliter expressus, aqua inter-  
 dum aspersa, aut vino, aut liquore alio, vel  
 recens vsurpatur, vel vase, aut loculamento  
 aliquo reponitur, hīc q; vel liquidus, vel sic-  
 cus. Liquidus item aut per se seruatur, vt vi-  
 num, acetū: aut misto sale, vt omphacium,  
 oleum: aut superfuso phialæ oleo, vt succus  
 rosarum, granatorum, limonum, cydonio-  
 rum, sambuci, ebuli, & similia: aut sole, ve-  
 rustatēve, aut igni per se ficcatur, vt succus  
 glycyrrhizæ, opus Cyrenaicus, scammo-  
 nium: aut coctione cum melle, vel saccharo  
 ad iustam crassitiē facta sole vel igni vt in  
 plurimis syrupis audies. Quiverò succi sine  
 melle [aut saccharo] reponūtur, plurimū  
 corrūpuntur: nisi igne diutiū cocti, aut so-  
 le æstiuo vsque ad mediocrē crassitiē sicca-  
 ti fuerint. Iidē temporis spatio ficciores eua-  
 dūt, pluribūsq; annis seruati, eo ficcitatis ve-  
 niunt, vt balausticis similiter læuigari pos-  
 sint (quales sunt succus hypocisthidis, vuæ  
 acerbæ, glycyrrhizæ, cētaurij, & alij propē  
 omnes) qui verò ex his lentore quēdā natu-  
 ra habēt, dilatātur magis, quā læuigētur,  
 nisi ficciorib<sup>9</sup> multis mista horū parua por-  
 tio. Portulacæ, semperuiui, cotyledonis, &

*Libr. 6. c.*  
*phar. par.*

*Lib. 1. co.*  
*ph. g.*



122 DE MEDICAMENT. SIMPL.

aliarum similiter glutinosarum succus, præ lentore nimio per se non potest exprimi, cū omphacio probè trita herba exprimitur: alij tritas igni lento calfaciunt: alij tritas loco frigido, vt cella vinaria, vimineo vasi impositas in catinum subiectum destillare permittunt. *χυλός* etiam id est, succus, sape cum humore aliquo extractus ex partibus plantarū, vt femine psyllij, cydoniorum, lini, scenigraci, lentorem, aut velut cremorem & muccorē significat: vnde dictum est emplastrum *διὰ χυλῶν*, id est, de glutinosis quibusdam succis: diuersum tamen ab eo, quod est de mucilaginitibus, vt in compositis leges.

*Li. 7. sim  
pli. & li.  
2. c. phar.  
gen.*

**O**leum propriissimo nomine appellatur, quod ex olluis exprimitur: maturis quidem dulcissimum, calidū, moderatè humidum, vel dum est recens, frigidum humidum, libr. i. comp. ph. gen. ex crudis autè & immaturis omotribes & omphacinum quantum astringit, tantum refrigerat: illud veteratum calidius fit, & potentius digerit: hoc autè si dulcescit vetustate, dulcis vires induit, quas sapore explorabis. Tenue est purum, translucentum, & cuti affusum eius modicum, latissimè per eam extenditur, continuum sibi manens, & citò à cute combibitur: idèmq; optimum æstimatur, quale in Ital



Italia Sabinum. Oleum lotū morſu omni  
caret. Lauandi modus in libr. de comp. ph.  
gen. Sicyonum autem, cicinum, raphani-  
num, ſeſaminum, amygdalinum, caryinū,  
ſinapium, lentiſcinum, laurinum, melanti-  
num, terebinthinum, maſtichinum, myrti-  
num, balaninum, hyoſcyaminum, & alia  
præter hæc plurima ex fructibus expreſſa,  
fructuum, ex quibus extrahuntur, naturam  
ſequuntur. De his in compoſitis medicamē-  
tis fuſius. Salſum autem oleum iam compo-  
ſitum eſt, tantūmq; caloris & ſiccitatis aſſu-  
mit, quantum ſalis. Oleum vim habet mi-  
igatoriam & laxantem, lib. 2. comp. ph. pa.

**V**inum protropum, id eſt, quod ab vuis *Lib. 8. cō.*  
deſluit, antequā calcantur, medium *ph. par.*  
inter calidum & frigidū, hepaticis ſaluber- *Li. 8. ſim.*  
riſimum, præſertim cum hepate lupi: quia  
proprietas ſubſtantiæ hæc nutriūt, nec cal-  
faciunt, nec refrigerant. Vinum muſteū ca-  
lidum primo ordine, vetuſ tertio, medium  
ſecundo, calori proportionē reſpōdet ſicci-  
tas. Ex muſto cocto ſit *ἰψυμα*, id eſt, ſapa,  
lib. 7. comp. ph. part. Nefcio quo modo ne-  
glectū eſt, quod à noſtris Aſiæ Græcis *ἰψυμα*  
dicitur, ab his qui Attico ſermone magis  
vtuntur *σίσιον*, id eſt, ſapa: quāuis etiā *σίσιον*  
dicitur, quod pinguib; ſicis in aqua coctis  
efficitur, quod magis digerit & terget.  
Muſt



Mustum verò coctum magis est emplasticum, non rodens, lib. 7. comp. ph. par. Ex sapia dissolutum castorium cum opio dolorem aurium inflammatarum magis sedat, quàm vinum dulce, initio libri 2. eiusdē. Facultatum vini differentiæ sunt permultæ: à substantia tenui, crassa: colore, albo, fuluo, rubro, nigro: odore imbecillo, valenti, sapore vario, sumendæ: de quibus Gale. libr. de vinis, lib. 4. & magis 5. sanit. tuendæ: Apho. 17. 18. 21. lib. 2. lib. methodi 7. maximè 12. libro 1. antid. lib. 3. aliment. Vinum medicamentis stomachicis, coeliacis, hepaticis, feliciter miscetur, si absit phlegmone, erisypelas, abscessus, intemperies calida. Nam totius substantiæ similitudine alit, coquit, roborat, putredinibus resistit, intemperiem frigidā vel humidam, si qua adsit, tutò persanat, libro 8. comp. phar. par.

Omphacium sic à vino differt, ut oleum omphacinum à dulci: siccato interdum utimur, ut Heraclides apud Gal. libr. 6. comp. ph. part. id quia repellit, incipientibus phlegmonis est salubre.

**A**Cetum crassis partibus, & facibus, seu facii proportionē respondentibus calidum videtur, nō tamen causticum: tenuibus verò partibus frigidū, idq; magis quàm calidum, aut fortè frigidum per se, calidum per

*Libr. 1.  
simpl.*



per accidens. Nam spongia aceto madida, plebeio cuidā admota, is principio & post horam vnam, duas, tres, frigus percipit: ablata deinde spongia, sensim nascentis in parte caloris phantasiā & opinionem habet, acrimoniæ mordētis ratione. In œdematis verò calorem non inducit: omnino autem siccatur. idem purum, idem aquæ non mistum, & perlucidum maximè est partium tenuiū, lib. 1. com. ph. gen. Acetum incidit, tenuat, *Lib. 1. &* digerit, refrigerat, reprimit, ac repellit influ *2. c. ph. p.* xum. Nam substantia modicè calidum est, plurima parte frigidum, tenuium est partium, si est acre admodū, & nihil vini qualitatis representās. Idem solum ob suæ virtutis vehementiam capitis affectibus non adhibetur, sed mistum alteri: album magis est tenuium partium, libro 6. comp. ph. par.

Acetum atram bilem parit, & in massam attollit, biliosis salubre, Hipp. lib. 3. rat. vict. acut. & ibidem Galenus, tamen quartanis datur ad incidendum & tenuandum.

**M**El in succorum censum referri potest: quod autem est calidum siccum *Libr. 7. simplic.* ordine secundo, vt medicamentum: vt alimentum verò, & dum actu nutrit, calidum humidū lib. 2. temp. terget, alit, coquit, putredini resistit, vt vinum, non cogendo substantiam



*Libr. 8. c.  
phar. p.*

stantiam corporū quibus exhibetur, vti sal  
sed siccando, tergendo, ora aperiendo, tran-  
situs purgando. Vrinās mouet, stomachum  
subuertit, ob id non miscendum remediis  
vomentium: intemperies frigidas humidas  
tutò sanat, calidis siccis seu biliosis est aduer-  
sissimum, sinuosa vlcera glutinat. Coctum  
& despumatum minus acre, & tergens red-  
ditur, sed magis nutriens. Mel medicamen-  
tis miscetur vel crudum, vel coctum, vel  
solum despumatum, vel cum his coquen-  
dum, aut solum despumandū, aut vt crudū  
maneat. Cū autem despumandum est, co-  
quitur super prunas aut flammam ligno-  
rum aridorum, & sine fumo.

*Libr. 6. c.  
phar. p.*

*Lib. 4. sa-  
nit. & li.  
7. meth.*

Mel optimum sit purum adeò, vt totum  
perluceat, odorum, flauum, acerrimum, dul-  
cissimum, gustanti iucundissimum, consi-  
stentia nec crassa, nec liquida: sed tam sibi  
cohaerens, vt continuitatem suam quasi li-  
nea longissima non intercisum seruet, si di-  
gito attollitur. Idem coquēdo paucam spu-  
mam remittit, nec thymum improbè olet.  
Album etiam ex Gallia Narbonensi prae-  
stantissimum affertur, & pallidum magis  
est primo apum nouellarum mellificio.

**S**acchar autem, vt vocant, & ipsum mel-  
lis species, ex India, & felici Arabia adue-  
nit.



Etum, in calamis (vt aiunt) cōcrefcit, minus dulce quàm noſtras: ſimiliter tamen terget, ſiccat, digerit, nec inimicum ſtomacho eſt, nec ſitim affert, vt noſtras: quæ res ipſum à melle ſubſtãtia differre oſtendit. Idẽ ſal In-  
 dus quibuſdam dictus videtur, vi ſolis gutta extra cannas extracta & denſata. Idem Zuchara Arabum re ipſa eſſe apparet, ſolo dif-  
 ferens compoſitionis modo per coctionẽ & expreſſionem: noto quidẽ Varroni & Stra-  
 boni, ignorato autem Dioſcoridi, Galeno, Plinio. Nec tibi difficile fuerit rationes e-  
 luere eorũ, qui Saccharũ Græcorũ à Zucha-  
 ra Arabum diuerſum contendũt. Actuarius Sacchar vbiq; ſcribit pro Arabũ Zuchara,  
 voce ab his ſuo more ex Græcis deprauata, aut fortasſe contrà cùm res ea fuerit Arabi-  
 ca, Græci ex his nomen mutuati ſunt. Sac-  
 charum rubrũ eſt ipſa velut ſpuma ſacchari, ſpurcitiam coctione deponentis, calidius &  
 acrius ſaccharo, vt ſpuma mellis, melle.

**A** Eromeli, id mel aërium Galeni eſt, *Μάννα*  
 Manna Arabum, liquida & granulo- *Perſicam*  
 ſa. Cuius & mellis eadem parte bona vide- *laudat*  
 tur eſſe materia, quod cœli ſereni rorẽ à fri- *Actua*  
 gido concretum in floribus (qualem in ma-  
 turis vnis, batinis, prunis videmus) apes col-  
 ligũt, licet etiam floribus quibuſdam mel-  
 lea inſit dulcedo apibus appetita.

Man



Manna hæc subalba fit, & recens, ex plā-  
tis odoratis, & homini salubribus collecta.  
Laricea hodie probatur, anno seruatur, bile  
leniendo purgat sanguinem data ab fescū-  
cia ad vncias tres: calida ordine secundo.

Libr. I. c.  
ph. part.

**C**era calidi, frigidi, humidi, sicci quodā-  
modò media, crassæ essentia, emplasti-  
ca, debiliter coquit admota, habet paulum  
quiddam digerentis calidæq; potentie, quæ  
melli plurimum inerat. Materia ob id est  
aliorum medicamentorum calfacientiū &  
refrigerantium. Ea aut lutea est, aut fusca,  
aut alba: & hæc aut natura, vt Pōtica aper-  
tè acris: aut ablutione, vt Tyrrhenica, & no-  
stras acrimoniæ expers. Cæteri colores sunt  
ascititij, vt viridis ab ærugine, ruber ab an-  
chusa vel cinabrio vulgari, niger ab atra-  
mento, vel charta vsta, à quibus mistis vires  
mutat. Optima subfulua, subpinguis, pura,  
odorata, sapore melleo.

Κηρός γὰρ ἔστιν ὡς ἔοικεν ὁ ἄνθρωπος, id est,  
cera stacte & stillatitia, initio lib. 2. compo-  
sition. ph. gener. legitur.

Oxyacanthæ succus Actuar. Scillæ succus  
cum melle coctus tribus cochlearibus ante  
& post cibū datur ægrè spirantibus, Actuar.  
Succus Brassicæ cum melle coctus linctus  
est



est arteriacæ Asclepiadis & Antonij Musæ,  
ibr. 7. co mp. ph. part. Galeni.

Succus pomorum mandragoræ vigen-  
tium optimus, ex Creta Romā fictilibus po-  
culis seculo Galeni afferebatur: & hyoscy-  
ami succus æstate collectus, libr. 1. c. ph. g.

Χυλὸς ῥὺ Pōticæ lib. 7. comp. ph. part.  
in diacodio Damocratis. Succus alterci &  
mandragoræ Andromachus lib. 7. Chylus  
seu succus eryngij in aqua cocti. Succus fi-  
cium in aqua coctarum, lib. 7. cōp. ph. part.  
Succus scillæ, libr. 7. Succus ari masculi lib.  
8. Succus plantaginis aridus, refrigerato-  
rius, initio lib. 8. Succus radicis mādragoræ:  
succus pomorū lib. 9. Succus ex acinis ma-  
lorum punīcorū tritis expressus. Succu plan-  
tarum sole vel igne vel temporis diuturni-  
tate ficcari, qui tamen humentes vsurpari  
possunt, in vsu medicorū frequentiore sunt.

**A** Cacia succus est ex fructu seu semine, *Dioscor.*  
interdū & foliis spinæ Aegyptiæ ex- *Li. 6. sim-*  
pressus, in vmbra ficcatus, ficcatur ordine ter- *pli.*  
tio, refrigerat primo: secūdo autē, si lotionē  
leuē suā acrimoniā depōsuerit. Acacia *λί-  
ρα*, lib. 7. compo. ph. part. in diacodio Heræ.  
Hæc tamen humidior vsurpari potest, vt in  
theriace leges. Eligenda modicè rufa & o-  
dorata, quatenus illi datum est. Eius loco



*Diosc.* ex bacculis prunorū agreſtium coctis ſuc-  
cum expreſſum teſſellatim conſectum inſo-  
latūq; uſurpamus minimo errore, quia re-  
frigerat, ſiccāt, aſtringit ut veterum acacia.

*Perro-  
quet vul-  
go.*

**A**Loë herba ſemper virens, nunc in mul-  
tis Gallia occidua domibus ad oſten-  
tationem appendi ſolita, & eius herbae ſuc-  
cus calidus in fine ordinis primi, aut initio  
ſecundi, ſiccans ordine tertio, valenter ama-  
ra eſt, aſtringit modicè, idque ſine morſu,  
eccoprotica eſt, id eſt, ſtercus deducens, &  
euſtomachos præcipuè lota: repellit, dige-  
rit, terget parum, quantum ſcilicet vlceri-  
bus puris non ſit moleſtum, ſinus glutinat,  
vlcera dyſepulotica, præſertim ſedis, pu-  
dendi, oris, glutinat: & phlegmonas harum  
partium ſanat aqua ſubacta.

Sumpta ſæpe hæmorrhoides venas ape-  
rit, vel à tota ſubſtātia, vel quia calida: craſ-  
ſe eſſentia, & pro modo terſionis mordax,  
*lib. 5. ſimpl. cap. 13. & Aphor. 47. lib. 6. quan-*  
*uis anæſtomorica ſint acria, terrea: admota*  
*autem ſanguinis fluorem cohibet, quia a-*  
*ſtringit, & emplaſtica eſt, ob id emphracti-*  
*ca, id eſt, obſtruens dicitur, cap. 11. libro 5.*  
*ſimpli. Nihil enim ſumptum & admotū vi-*  
*res habet eaſdem, libr. 3. temp. de ſinapi, &*  
*ph. part. libr. 8. methodi de muſſa. Aloë, ut roſa,*  
*miſtæ*



mixta est faculatis: nam amara substantia  
tergunt, astringente vlcera contrahunt, & *Dioscor.*  
cicatrices tergunt. Optima est pinguis, li-  
bro 9. comp. ph. part. glutinosa, ex rubro ru-  
fa, hepatis modo coacta, & intus foueata,  
proinde minus grauis, bono odore myr-  
ram emulante, syncera, nitida, transpa-  
rens, arenarum & calculorum expers, fria-  
bilis digitis, facile liquefcens, eximia ama-  
ritudinis, non adulterata acacia, vel misto  
gummi, quod illam minus amaram, vali-  
dioris odoris, non friabilem digitis ad mi-  
nima vsque frusta reddit. Indica est optima.

Valet etiam ex Cœlosyria, & Arabia. Ex *Gal. li. 6.*  
magna Syria humidior. Arabicam tamen, *simpliciu,*  
tanquam omnium vilissimam & solis mu- *et libr. 8.*  
lomedicis vsurpandam, damnauit Mesues: *c. ph. part.*  
& inde caballinam vocant, nigram, obscu-  
ram, fœci simillimam, amarissimam odore  
tetro, arenosam, vt optimæ sedimentum vi-  
deatur. Primam succotrinam, secundam  
hepaticam seu Persicam, tertiam Armenia-  
cam, quartam bonitate Arabicam statuunt  
Mesues & alij. Aloë lota minus aluum *Li. 7. me-*  
ducit, multum enim virtutis medicamēto- *thod.*  
se lauando deponit, magis tamen ventrem *Libr. 8. c.*  
roborat. Aloë etiam lota his maximè ad- *phar. p.*  
uersa est, qui citra prauos humores intem- *Ibidem.*  
perie calida sicca laborant.



*Dioscor.*

**E**laterium, succus ex fructu cucumeris agrestis, à bimatu ad decennium bilem ac pituitam vtriusque parte vacuat, à semio bolo ad obolum sumptus. Extrahitur variè Dioscoridi.

*Diosc.**Gal. Lib.**6. simp.**Memi-**the.*

**G**laucium, succus herbæ ad Hierapolin Syriæ urbem nascentis, foliis ferè papaveris corniculati: à quo tamen quantum differat, docet Dioscorides, & succum extrahendi rationem: Græcis in usu multo & Arabibus, nunc ignoratur: valenter astringit, & insigniter refrigerat.

**G**lycyrrhizæ succum ex Creta delatum præfert Gal. lib. 7. comp. ph. p. in sua antidoto diacodio. Cætera de hac dicta in radicibus.

*Diosc.*

**H**ypocisthis iuxta cisthi radices nascitur flore punici similis, siccat & astringit magis quàm acacia: prodest disentericis, coeliacis, sanguinem screantibus, foeminarum profluuiis sumpta & indita. Hypocisthis succus, & Hypocisthidis succus passim dicitur in lib. com. ph. p. Hypocisthidis succo addita γλυκίως, id est, passi parte, macerat. gummi, tragacantham, myrrham, thus, lib. 7. comp. ph. part.


*Lib. 7. simplic.*

**L**ycium à Lycia regione dictum, & delatum, succus est Pyxiacanthæ Dioscoridi &



& Galeno liquidus, quo vtebatur ad sugillata. Phlegmonas oris & sedis, herpetas, putredines, vlcera contumacia, aures purulentas ficit, & digerit ordine secundo, astringit, terget. Calore symmetris est proximū. Copiosum etiam est in Cappadocia: Indicum autem est ad omnia valentius. Hamorhagiam à naribus Lycium sistit, linamēto impositum lib. 2. comp. ph. part. Lyciū coquit, digerit, vt castoriū. Indicum autem dico, nō quod apud nostras gentes nascitur, lib. 4. comp. ph. par. Lycium etiā Aphrum dicitur, lib. 3. comp. ph. part. Spumam Lycij appellat ex Solone, libro eodem. Succo ex baccis Periclymeni id mētīmur. Modus aliusest in lib. de dynamibus, qui Galeno adscribitur.

## DE LIQVORIBVS.



PLANTIS partes præter cōpositas insunt etiā similes ac simplices: sua quædam caro, os, nervus, vena: su<sup>9</sup> velut sanguis & humor in omnes partes nutriendas dispersus: suæ etiam lacrymæ ex planta sponte sua defluentes, vt gummi: suus *χυλός*, id est, succus, de quo prius: suus item *ὀπός*, id est, liquor, qui est crassum illud & lentum, quod ex vulnere effluit, quanuis radice incisa, qui

*Theophr.*  
*lib. 1. et 9.*  
*hist. plant.*



inde *ῥιζία* dicitur: vel caule etiam vsque ad medullā secto, terebrato, castrato, qui *λαυ- λίας* dicitur, dilutior, altero puriore, & per- lucidiore.

*Assa a-  
romaticā  
et odora-  
ta & ben-  
ioun.*

**S**pecialiūſ tamen & per excellētiam *ἰπὲς*, Cyrenaicus & Medicus, & Syriacus in- telligitur, quia omnes caliditate, & tenui- tate exuperat, ob id omnium maximè dige- rit per halitum: quanquā reliqui liquores ſint multum calidi, & ſpirituofi, & plurima horum pars eſſentiæ aëriæ & igneæ. *χυλὶς* tamen, *δακρυον*, *ἰπὲς* Græcis ſape confun- duntur, & Latinis Succus, Lachryma, Li- quor. Præſtantiſſimus autem ex Aphrica eſt Cyrenaicus Galeno, Indicus & Arme- nus Meſuæ: imbecillior Medicus & Syria- cus: vterque etiam virus & putrilaginem reſpiens, vt & Parthicus, & Perſicus, Dioſ- corid. Eſt autem Laſeris ſeu Laſerpitiij ſeu Silphij herbæ liquor, caule ipſius ſerula- ceo, aut radice ſcarificata deſluens, acer, mordax, digerens, optimus modicè rufus, non porraceus colore, tranſlucens, myrrhæ æmulus, odoratus, ſuaui guſtu, dilutus citò albescit. E Taprobana maris Indici inſula omnium maxima conuehi hodie præſtan- tiſſimum, Belzoë vulgò dictum, ſcribit Lu- douicus Romanus Patritius. Opus Cy- renaic

*Assa ſæ-  
rida.  
Libro. 6.  
c. ph. p.*



tenaicus est saluberrimus phlegmonæ gargareonis, & aliarum partium, non incipienti, sed veteratæ, & in scirrhum durescenti. Est enim acerrimum & maxime calfaciens medicamentum.

*Libr. 6. c.  
ph. p*

**M**ΗΛΩΝΙΟΝ & ΜΗΝΩΝΟΣ ὁ πρὸς libro. 1. phar. gen. succus ex foliis & calice papaveris tufis expressus, pro Opio à multis supponitur, alia eius adulteria, Dioscorides. ΜΗΝΩΝΟΣ ὁ πρὸς, & ΜΗΝΩΝΙΟΝ diuersa facit Asclepiades apud Gal. libr. 2. Antid.

**O**pium est lachryma ex inciso papauere nigro defluens, hodie etiam ex albo destillat. Ex Apulia affertur: refrigerat, siccatur, inspissatur, Dioscor. Incidendi & colligendi modum docet idem. Præfertur Thebaicum. Hispanum opium usurpatur libr. 7. c. ph. part. Opium calidis dispositionibus medetur, ut altercum, & similia: medicamentis additur ad sedandum dolorem, somnum conciliandum, siccandum, Gal. libr. 8. comp. ph. part.

*Gal. li. 8.  
simplic.*

Opium etiā stomachicis miscetur ad sensum stomachi hebetandū, & somnū conciliandum. Vehemens autē refrigeratio ex opio, corrigitur castorio, pipere, & similibus, libr. eodem octauo. Opij 3. duas arteriacæ 14. miscet Andromachus, libr. 7. eiusdem.



Cum multi sint *ὀπιοί*, id est, liquores, solius papaveris *ὀπός*, neutro genere *ὀπιόν* à medicis propriè nominari solet, lib. 9. cō. ph. p.

Opium omnium quæ sensum stupefaciunt, & somnum torpidum inducunt, valentissimum est lib. eodem.

Opobalsamum, in Carpobalsamo dictum.

*Li. 8. simplic.*

Opopanax liquor è panacis Heraclij radice incisa emanans, cum caulis primum erumpit, aut vulnerato caule messibus: calidus ordine tertio, siccus secundo, emollit, digerit, modicè terget. ob hoc ossa nuda vestit carne, vlcera maligna & cōtumacia sanat. Recens est candidus, ubi aruit, colore foris est croceo, aut subflauo, intus candido, odore graui, amarissimus, lævis, pinguis, friabilis, tener, facilè in aqua liquefcens. Damnatur maximè niger, & mollis.

**C**Edrinus liquor impensè calidus, & siccus, frigida & humida cerebri temperaturæ, ob id saluberrimus: capillum sistit, & auget, odore non ingrato consuetis, ingrato delicatis: lib. 1. comp. ph. part.

*Dioscor.* **E**Vphorbiū & Euphorbia arbor spinosa in Athlante Libyco ad Mauritaniā mōte, ferulaceāq; & ex ea conto eminus incisa



cisa liquor emanās lacteus, facult. est caustica ac vrentis, tenuiū partiū, vt alij liquores: *Li. 6. simplic.*  
 vnū orōbi magnitudine, sarcocollæ modo emicat: alterū in ouillis vel hēdinis ventriculis quib⁹ excipitur, cōcrefcit, vitreūq; spectatur. Elige trās lucēs, acre, recēs, albissimū, si calore multo & igneo egetur: si modico: *Li. 3. cōp. ph. g.*  
 vetus & luteū. Nā recēs albius est ac valentius calfacit, citō autē virtus eius exoluitur, calorē enim habet caducū & statim euanidū: & fit vetustate cineritiū, pallidius, aut flauius, modicē calidū. Id autē si recēs sit feruidissimū, vt linguā vrat, & leui gustu os accēsum detineat diutius, & quicquid gustatur, Euphorbiū planē respiciat. Bimū aut trimū mediocre viribus adhuc est (talīq; vtitur Gale. li. 1. cōp. ph. p. in alopecia) interdū & quadrimū. Quinto autē vel sexto anno iā exoluitur, deinde procedēte tēpore in totū elanguescit. Gal. ne putes cū vulgo annis decem posse seruari: etiā cū milio, lētib. fabis adulteratur lacte hēdino, sarcocolla, glutino, id igni iniectū odorē edit fastidiendū. *Li. 9. cōp. ph. p.*  
 Euphorbiū siue liquor est, siue aliud ex occiduis regionibus affertur, vt Sagapenum ex orientalibus, lib. 3. comp. ph. gen. Euphorbium liquor est stirpis cuiusdam spinosæ in Maurisiorum terra prouenientis, facultate calidissimus, in vētre ouīū reponitur, quo-



niam hunc solum non erodit.

*Gal.li.8.  
simplic.*

**G** Albanum liquor ferulæ Syriacæ, seu plantæ ferulacæ in Syria frequentis, calidus in fine ordinis secūdi, aut principio tertij, siccus initio secundi: molliat, digerit, addit Dioscorides, trahit, vrit. De hoc pauca leges mox in Sagapeno.

Laudatur purum ligno, aliquid tamen seminis mistum habens, odore graui sapore abominabili, humidæ & sicci medium, pingue, & in hammoniæ aut thuris similitudinem cartilaginofum. Eius obolos tres miscet Andromachus arteriacæ 12. alteri drach. sex lib. 7. comp. ph. part. Purgandi eius sordibus ratio Dioscoridi traditur.

*Hammo  
niaci gut  
ta.*

*Diosco.*

*Li.6.simplic.*

*Dioscor.*

Vitiatur resina, faba fricta, hammoniaco.

**H** Ammoniacum seu Hammoniacum thymiam, liquor est resinæ aut gummi modo stillas ex ferula quadâ Cyrenaica in Aphrica prope Iouis Hammonis oraculū vnde illi nomē: calfacit, discutit, & adeo valēter emollit, vt tophos articularū dissoluat, & lienes induratos sanet, ac chæradas per halitū digerat. Probatum purū ligno, arenis terra, sordibus, bene coloratū, odore castorei, sapore amaro, prædēsū, & in thuris masculi similitudinē, minutis glebis, cartilaginofum. Hāmoniacū eryngio & melli mistū, arteriace est valida, & diuturnis affectibus



bus vtilis Critoni apud Gal. li. 7. cōp. phar. part. Hammoniācū, Galbanum emolliunt, mitigāt, emplastica sunt, & opopanax, sed illis valentius, libro 10. eiusdem. Ligno, terra, arenis, & sordibus aliis viciatur.

**S**Agapenum est frutex ferulaceus, seu ferulae similis planta, lib. 8. simp. seu ferula quaedam panaci similis, lib. 1. anti. in Media regione, & abusuē ex ea succus: qui etiam ἰπὸς σαγᾶνως dicitur, lib. 1. antid. calidus, tenuium partium, vt alij opoi, seu liquores: modicē terget, oculorū cicatrices purgat & terget, suffusiones & oculorum hebetudines, à crasso humore leuat. Laudatur per lucidum, foris rufum, intus candidū, acre, odore porri, seu medio inter laseris liquorem & galbanum, quibus adulteratur. Opopanaci enim nihil est simile, sed galbano albiori. Nam spumosa, cohærens, albior, leuīsq; pars galbani in Sagapenum degenerat: pars altera densior & multò quàm aliud galbanum constrictior, fit galbanum optimum, sagapenum resipiens, eaq; tanquàm præstantissima vtendum, libro 1. antid. Si verum est, vino aut aqua statim dissoluitur: adulteratum non liquefcit, ibidem.

Scammonia, vel Scammoniū liquor emanans ex vulnerata radice crassa herbæ cuiusdā in Mysia Asiatica, vnde laudatissimū affert

*Dioscor.*




affertur: hoc est, nitidum, rarum, fistulis tenuibus, fungosum, leue, taurino glutini colore simillimum, linguam non vehemēter exurens, linguæ tactu albescens, quam notam misto cum erui farina tithymali lacte adulterarum etiam habet, ac linguam vrit, quale pessimum est, & graue, densum, Syria cum, Iudaicum. Bilem verò & pituitam purgat, à drach. vna ad obolos quatuor. Seruatur annis 20. Mesuræ: 40. Serapioni, cum malo cydonio, in quo ab interaneis purgato coctum fit clementius.

Scammonia etiam foris admouetur, bis in cephalalgia apud Gal. lib. 2. cōp. ph. part.

**Diosc.** **T**Hapsia liquor herbe ferulaceæ, valenter calidus, cum larga humiditate, ob quam citò corrumpitur: & cum violenter extrahat, & extractum digerat, plusculum ad ea tempus postulat. Eadem post annum est admodum imbecilla, bima prorsus expirauit, lib. 1. com. ph. gen. Primum in Thapso insula, inuenta est, vnde illi nomen.

## DE LACHRYMIS.



**Αρτυρον**, id est, lachryma seu humor ex planta spōte sua defluēs, siue in gummi aquea res cōcre-scat, siue in resinā lique-scat, olea



leagina eius substantia. Arborum partibus præsertim trūcis à germinatu incisis & scarificatis etiam resinas elicimus. Accensis autem arboribus resinosis, vt pinu, picea, larice, terebintho, teda, cedro, ex resinosa substantia igni parū ficcata fit pix liquida, cui quod supernatat pissanthum tenui consistencia & facultate est astringente, ob id caniciem sine vlla noxa tardat, vt pisselæum, id est, pix liquida cum oleo mista, Gal. li. 1. comp. ph. part. Pissasphaltus autem est Mumia Serapionis. Si pix iterum coctione ficcetur, Palimpissa dicitur, sicca adeò, vt puluerizari possit: qualis est Græca, etiā Colophonia, & Hispana, & Gallica dicta. *πίσσα βύττα*, lib. 8. comp. ph. part. & Dioscoridi probatur & Lycia. Est etiam Dioscoridi ex iisdem arboribus resina liquida & sicca. Resina omnis calfacit, ficcatur: tenuium est partium, magis minus.

**R**esinarum iure præstantissima est Lentiscina, id est, Mastiche, parum astringit, ficcatur sine morfu, calida & sicca ordine secundo, minimum est acris, tenuium maxime partium, stomachi, ventriculi, intestinorum, hepatis imbecillitati & phlegmonæ prodest: laudatissima & copiosissima est Chia insula (vnde Galeno Mastiche Chia passim dicitur) affertur, hoc est, fulgore quodam ignis

Li. 8. sim.

et lib. 1.

et 2. com.

ph. ge.



ignis splendida, candore ceræ Tyrrenicæ, adulta, retorrída, odorata, stridens friando.

**Dioscor.** Deterior est viridis, & nigra Aegyptia dicta, aut Pontica, bitumini nigredini similis. Mastiche apta stomacho, odoris grati, vim medicamentosam aloës & aliorum purgantium efficaciter frangit, initio libro 8. compo. ph. part. adulteratur mistura thuris & resinæ nucis pineæ.

**Li. 8. sim.** **Πήληκ τερεβινθή.** Terebinthina resinarum cæterarum præstantissima, astringit manifestè, sed minus quam mastiche: emol-

**Lib. 8. cõ.** lit autem magis, coquit, digerit, qualitate  
**ph. part.** subamara, & partium tenuitate terget angu-

**Li. 5. san.** stos meatus vasorum, & in eis osculorum  
**tuend.** obstructions liberat, ob id putredinẽ prohibet, aut finit: & hepaticis probè miscet: è profundo potentiùs trahit quam cæteræ re-

**Li. 1. ant.** sinæ. Hæc aluum citra noxam soluit, & viscera omnia, iecur, lienem, renes, pulmonẽ abstergit. Terebinthina resina omnis ex

Chio insula est præstantissima, & odore & gustu cæteris præcellit. Chia igitur semper vtenda, si haberi potest. Huius penuria Libyca, Põtica, & ex aliis regionibus optima

**Nunc Cy** est miscenda theriacæ & aliis medicamen-  
**pria Vene** tis: non autem Libyca, tanquam omnium  
**tis cõmẽ** præstantissima cum Andromacho. Præ-  
**datur.** stantior est alba, vel cærulea, vel colore vi-

tri,



tri, perlucida, odorata, & Terebinthum plus referens, qualis quæ ex insulis Cycladibus affertur: ob id Chiam quoque terebinthinam laudat Gal. Minus laudata Cypria, Syriaca, Iudaica, Arabica, Aphrica. Libyca tamen, ut dixi, laudat Andromachus. Quæ autem pro Terebintina resina venditur, aut Laricea est, aut Abietina.

Inferiores autem Terebintina in digere-  
rendo & attrahendo sunt, pinea, strobilina,  
picea, abietina, laricea, cyparissina, pityina,  
id est, pinea, propriè physema dicitur, lib. 2.  
comp. phar. gen.

Terebinthina mordax asperæ arteriæ &  
ori, initio libro 7. composit. phar. partic.  
ῥησιν φησιν lib. 2. comp. phar. gener. & lib.  
comp. phar. par. sepe.

Resinarum mitissimæ sunt Terebinthina *Lib. 1. c.*  
& Larix dicta: aliæ mordent modicè, quæ *phar. gen.*  
dam etiam insigniter. Resinæ Terebin-  
thinæ Larix propemodum similis est, ob id  
illius penuria hac utendum: illa autem per  
omnia est melior quam Colophonia, &  
quæ Phrygæ dicitur, ibidem. Resinæ siue  
Larix siue Terebinthina vocatæ aduersus  
vulnera maligniora magis valent, ibidem.  
κολοφονιακήν πίναν in emplastro epulorica  
ἀπὸ λαδμίας vocat, paulò post ῥησιν appel-  
lat, lib. 2. composit. ph. gen.

Strobi



Strobilina resinarum longè calidissima, & celerrimè siccans, omnium moderatissima est, vtraque qualitate terebinthina.

Pitynon, Physena priuatim dictum, genere etiam resina est, multò minùs calida & sicca quàm Strobilina, media harum calore Abietina, liquida tamen diu durat, vt Colophonia, thus redolens, odore suauis, calore, vt Abietina mediocri, quæ à nonnullis sola dicitur Colophonia, nascitur admodum modica, ob id est pretiosa.

Resinæ siccata pinguis expertes fiunt: ob id emplastra bene adhærentia cōficere non possunt, vt viscosæ & liquidæ.


Humidissima est Larix altera: est enim resina Larix dicta duplex, vna Terebinthinæ omnino similis: altera calidior, liquidior, odoratu grauior & ingrator, gustu amarior, acrior, mordacior. Quare satis est terebinthinam omnibus medicamentis vlcera rectè curaturis miscere, in quibus curandis præcipuus est scopus non mordere: in com.ph.gen. *τιγμαυθινην περιφυμινην* retorrida, lib. 8. comp.ph. part.

Terebinthinam veram è Cypro allatam Venetiis ad me dono misit Ioannes Baptista Opizo, Medicus longè omnium doctissimus, nostræ Laricinæ & Abietinæ affinē, sed infinitis partibus præstantiorem.

D E



## D E   G U M M I.



**G** U M M I est lachryma congelata *Li. 7. sim-  
concretâq; in truncis arborum  
ipsam producentium, veluti re-  
sina in multis visitur, quæ resi-  
nam proferre possunt. Est autem gummi  
aquea magis substantia, vt resina oleagina: in bede-  
proinde illud aqueis promptius miscetur, ra.  
oleaginis ægerrimè, hoc contrà. Eadem  
flammam concipit, gummi verò in igni  
crepitat.*

**E** X Acacia quadam Aegypti spina (ex  
cuius semine Acaciam succum expri- *Diosc.  
Gummi  
Arabi-  
cum.*  
mi antè diximus) manat gummi in vermi-  
culorum speciem contractum, vitri modo  
perlucidum, purum, refrigerat, densat. Hu-  
ius non meminit Galenus in Acacia lib. 6.  
simpl. vt nec Acaciæ mentionem facit pau-  
lò post in Acantha Aegyptia seu Arabica  
(quo nomine solo Dioscoridi vocatur) vn-  
de colligas licet, Acaciam & Acātham Ae-  
gyptiam seu Arabicam diuersas esse in Ae-  
gypto spinas arbores. Tamen in lib. comp.  
phar. part. frequenter leges *λέμμι* absolutè,  
tragacanthæ coniunctum pro gummi Ara-  
bico, quod *λέμμι δαβαίνιν* vocat lib. 7. com.  
phar. part. à Thebis opinor Aegypti centi-  
foribus, vt etiam Babylonicum quibus-  
dam dicitur, à Babylone Aegypti Arabiam

k



attingentis. *λομπίδιον ἀραβινόν* perſape Actuarius vocat.

Dioscor.

**A** Mygdalæ amarae gummi calfacit, astringit, ſanguinem reiicientibus prodeſt, impetigines cum aceto illitum tollit, tuſſi antiquæ medetur, calculoſis prodeſt. Micius multò eſt, quod ex Amygdala dulci profluit.

Gummi

Lacca

Diosco.

**C** Ancamū lachryma eſt Arabicæ arboris, Myrrhæ quodammodò ſimilis, viroſi guſtus, ad ſuffimenta uſurpatur, emaciat: lienofos, epilepticos, aſthmaticos iuuat, ad dolores dentium efficaciffimum, menſes ciet. Lachan ſæpe Actuario dicitur paſſim, præcipuè in duplici deſcriptione dia lachan, ubi ſcribit, *λάχαν λιπάδαριον* purgatum.

**C** Aphura poſt Dioſcoridis, Plinii, Gale-  
ni, Pauli, ſeculum inuenta, Aërio & Actuario, & Simeoni, & Arabibus celebrata eſt, lachryma Indiæ arboris ferulaceæ quidem: ſed maximè frequentibus fulgetris, tonitribus, terræmoribus copioſior proueniens. Quæ igni vel ſole ex rubro albescit, perlucet, friabilis eſt, melior, tenuior, durior, quàm craſſa, fuſca, nigra, aſſulis ligni fui implicata. Pani calido impoſita ſi maderat, ſyncera eſt: ſi areſcit, ſpuria: frigida ſicca.



ea gradu tertio Arabibus dicitur: tamen mistam habet calidam substantiam, acrem, odoram, flammæ ciendæ aptissimam morbos acutos, cephalalgias à calore, phlegmonas præsertim iecoris iuuare refrigerando dicit Simeon ordine non expresso. *λαφρὰ* Aët. & Simeoni, & Aëtio, & inde *ῥαπτιον λαφρὰτεν* Aët. dicitur.

**C**erafo resudans gummi rursi vetustæ medetur, arterias exasperatas lenit, suo lentore morsus experte, colorem commendat, visum acuit, apperentiam inuitat, calculosis ex vino potum prodest. Quæ facultas essentia tenuitatem inesse significat.

Dioscor.

Galen.

Li. 7. sim.

**E**X Elra, id est, olea Aethiopica & nostrate inquit Dioscorides, & Italica Plinius, & oleastro lachryma funditur scammonio similis, fulua, stillis exilibus constas, mordax. Similis autem hammoniaco, vel gummi, colore nigricans, morsus expers, inutilis. Explora an verum sit officinis.

Gumi e-

lemmi ab

elra, vel

corruptè

pro enha-

mū Her.

**H**Ederæ lachryma est velut aqueus quidam liquor, sicut alia omnes lachrymae. Hæc admodum calidæ est facultatis, ut obscure adurat, lendes & pediculos interimit, pilis caput nudat: illitu enim est psilothrō. odoratissima est.

Li. 7. sim.

Dioscor.



Diosc.

Libr. 7.

Simpl.

**G**ummi Pruni agglutinat, potum in vino calculos frangit, ex aceto quoque illitum lichenas infantium sanat. Quæ si præstat, clarum est extenuandi ac incidendi facultatem illi inesse.

**I**Uniperi gummi nec Dioscor. nec Galenus memorant, fortè quòd ad nihil sit utile, ut Actuarius, Plinius. Subit verò mirari, cur medicis hodie Arabas secutis, Sandaracha vocetur, & suffitibus propè omnibus misceât, fluxiones à capite prohibentibus: cum sit calidum, & planta ipsa etiam umbra, non solo vapore sit grauis. Vernigo dicitur Hermolao, Vernix vulgò, quòd rore vernò magis concreseat. Scriptoribus in usu est multo, & pictoribus.

Libr. 8.  
Simpl.

Lib. 1.

6. c. ph. p.

et 1. com.

ph. g.

Li. 8. eius

dem.

**M**Yrrha est arboris Arabicæ lacryma, calida sicca ordine secundo, tenuis essentia, multa amaritudine, terget potenter, tamen sine exasperatione, imò lenit, digerit non ignauiter, sed citra rosionem: siccat valde, tamè sine astringitione: coquit modicè etiam prauos humores, & præter naturam habentes: qua ratione stomachicis in id malum compositis miscetur, sed pauca, & cuius qualitatis medicamentosæ absurditas odoriferis superetur, tamen ea tutius auferri potest. Myrrha rubra Actuarius, *σμύρνα ἀλβινὴ*, Myrrha verax eidem. Eligend



genda recens squalore & situ obducta, le-  
uis, tota concolor, & quæ confracta candi-  
das vnguium modo venas, & læues osten-  
dat, glebis minutis, amara, acris, odorata.  
Quapropter colicæ Paccij Antiochi pauca  
myrrha miscetur, quæ odorem tantummo-  
dò præstet. Omnibus antefertur Troglody-  
tica, viridis, perlucida, mordax: ab hac se-  
cunda est, tenuis, bdellij modo facilè sub di-  
gito mollescens, odore grauiuscula, apricis  
nascens. Mala nigra, aut colore piceo gra-  
uis, retorrída, præter modum maturitate  
exoleta: omnium pessima pingui carens,  
cano situ obducta, acris, ad gummis imagi-  
nem vergens, & viribus eius proxima. Im-  
probatur ἀμυνία nomine Dioscoridi: Gale-  
no autem eligitur Troglodytis, quæ & Mi-  
nea dicitur à regione, vbi præstantissimam  
gigni affirmant. Ea gratissimi sit odoris, &  
nullo vitata liquore. (Vbi Minea, vel vt  
bis lib. 9. comp. ph. part. legitur μυνία, vi-  
detur eadem, quæ Dioscoridi Aminea im-  
probatur) adulteratur enim gummi mace-  
rato aqua, in qua myrrha maduerit. Vera  
enim est rara inuentu, præcipuè syncera:  
nam in optima myrrha opocalpason inue-  
nitur, ab optima myrrha diuersum, vt in  
galbano sagapenum, in casia cinnamomū,  
& horum aliquid medium quæ à se inuicem

Lib. 9. c.  
ph. part.  
Dioscor.

Lib. 6. c.  
ph. pa. &  
li 1. aut.



discernere is solus potest qui saepe ea obser-  
uarit, adeo ut ex vna sola nota saepe inter-  
noscat. Nam Sapapenum ex Galbano odo-  
ris hircini speciem retinet: non habet autem  
proprietaem odoris cuiusdam, ut proprie di-  
ctum Sagapenum. Tamen in hoc sagapeno  
& congeneri galbano parua est differentia  
ad medicamenti compositionem. Ambo enim  
conueniunt, quia aduersantur virulentis &  
deleteris: sed galbanum minus sagapeno. At  
opocalpason lethale est intra corpus sum-  
ptum: ob id sua etate multos perisse scribit  
Galenus usu myrrhae, quae opocalpason ha-  
bebat, a nonnullis de industria mistum myr-  
rae, ut eam redderet laudatissimam. Nam sic

*Haeslen<sup>9</sup>  
Gal. li. i.  
antid.*

mista, collyriisq; indita, pus. citra rosionem  
discutit, ac interdum suffusionem incipien-  
tem substantia tenuem, siue ceratum, siue em-  
plastrum, siue aliud medicamentum myrrham  
opocalpaso mistam recipiens oculo iniicias.  
Myrrha igitur officinarum omnino adul-  
terata parum tutus est usus in sumendis.

*Syrax li  
quidus.  
Dioscor.*

Myrrha stacta, id est, stillatitia ex myr-  
rha recente, pingui, & solo lactiore nata, lar-  
gior exudat cum aqua pauca tunditur, post ma-  
china exprimitur, colore pallido, amaritudi-  
ne praecipua, odoratissima, & pretiosissima  
res, minima portione efficacissima: eadem  
praestat quae myrrha, sed efficacius. Huius  
f. x



lex Styra rubra dicitur Arabum familia.

**B**ellium est *Αλινυον*, id est, lachryma *Dioscor.*  
 Arboris Sarracenicę, calfacit, mollit, co-  
 quit, discutit mediocriter, hepaticis misce-  
 tur, calculos renum potu frāgit, hernias sa-  
 nat. Scythicū est atrius, resinofius, ad emol-  
 liendum efficacius. Arabicum autem ē Pe- *Li. 6. sim*  
 tra delatum resinofum, liuescēs, dilucidius, *ph. & li.*  
 magis siccans quā in emollientia, nisi recēs *8. c. p. pa.*  
 & humidum sit, & quod tundendo facile  
 mollescat. Id enim idē pollet quod Scythi-  
 cū. Tertiū Indicū addit Dioscor. sordidum,  
 nigrum, grandioribus glebis in ossas con-  
 volutum. Opūmum est cortice, ligno, sordi-  
 bus carens, vt taurinum gluten translucens, *Dioscor.*  
 ob id bdellium clarum dicitur, lib. 8. comp.  
 phar. part. odore est marini vnguis incen-  
 sum, gustu amaro, intus pingue, & si tactu  
 subigatur, mollescit: adulteratur gummi,  
 sed id minus est amarum & suffitu odoratū.

**S**tyrax lachryma est arboris Syriacę, cal *Li. 8. sm.*  
 facit, mollit, coquit, tusses, catarrhos, co-  
 ryzas, brācos: mēses autē mouet sumptus &  
 ad motus. Syracis drac. vnā miscet Andro- *Dioscor.*  
 machus atteriace 13. lib. 7. cōp. ph. p. Proba-  
 tur flauus, pinguis, resinofus, sordescēs, albi-  
 cantibus grumis, acer admodum & amarus  
 quā plurimū in sua odoris fragrātia perma-



*Libr. 1.  
antid.*

*Styrax  
calami-  
tes.*

*Lib. 7 sim  
pl. ca. 18.*

*Libro 8.  
simpl.*

*Charabe  
Persis, id*

nēs, & qui subactus melleum reddit liquorem. Deterior niger, surculosus, friabilis, cano situ obductus. Adulteratur multis modis Dioscoridi: sed dictis notis dolusprehenditur. Styrax iniciendus theriacæ, qui ex Pamphilia in arundinibus affertur: hic autem paucissimus est, & tanto discrimine à copioso hoc Styrace variat, quantum Falernum vinum ab eo, quod in tabernis venditur. Tamen illius penuria, huius accipe quod calidissimum, & odore & gustu valentissimum est. Styrax, ut crocus, myrrha, quantitate sunt deleteria: nam largius posita quædam dementat, quædam mortem inferunt, sed mensura apta aliis mista iuuant. *Σύραξ σπώνιον*, id est Hispanum cognominatur Actuar. in trochisco Neapolitæ.

**S** Arcocolla arboris Perficæ lacryma polilini thuris similis, rufa, emplastica, subamara, citra morsum, proinde siccat, & ulcera glutinat, unde & nomen commeruit, oculorum fluxiones inhibet, coquit, digerit, sed minus quam galbanum, lib. 4. comp. ph. part. Adulteratur gummi misto, puluerizata est suspecta adulterij: vera enim est rara: lacte identidem mutato correctæ collyriis miscetur.

**S** Vccinum seu Succina gutta à succo dicta, Græcis *ῥαυνίον* esse lacryma populi



li albæ, vel etiam nigræ quibusdam vide-  
 tur, ab eisdem arboris resina Dioscoridi  
 & Galeno dicta differens, & ἀμυγγοῦς, *est, paleas*  
 id est, paleas trahens, quoq; vocatur, quam *trahens,*  
 vim ei quoque Galenus tribuit lib. faculta. *ambra*  
 naturalium: qui tamen esse censuerit: non-  
 dum in eo legi. Plinius verò lib. 37. capit. 3. *vulgò in*  
 Succinum scribit à quibusdam pinei gene-  
 ris arboribus, vt gummi à cerasis exudare  
 autumnò, & largum mitti ex Germania  
 septentrionali, & insulis maris Germani-  
 ci. quod hodie nobis est compertissimum:  
 adhæc liquata igni valentiore, quia à frigi-  
 do intensiore concreuit, pineam apertè olet  
 calidum primo gradu, siccum secundo, sto-  
 machum roborat, vomitum, nausæam ar-  
 cet: cordis palpitatiōi prodest, prauorum  
 humorum generationem prohibet. *corollis p-*  
*carijs fre-*  
*quens.*

**A**μπαρ autem, seu ἀμπαρ, Ambarum seu *Ambra*  
 Ambra Arabū, & Actuarij ac Simeo- *grisea.*  
 nis recentiorum Græcorum, est odoramen-  
 ti genus, locis diuersis scaturiens, vt bitumē,  
 sulfur, nobis hodie larga & præstantissima  
 ex littore Aquitanico mittitur, cineritio co-  
 lore: Indica rufa, pinguis, odorata, quod Suc-  
 cinum oriētale vocat Hermolaus. Est Ara-  
 bibus & Simeoni prælata Arabicæ subalbæ,  
 & tertiæ præter has nigræ, quod à piscibus



fontes. Ambaris gustantibus delectata sit, omniū pessimæ. Calfacit, humores incidit, ob id stomachicis à quibusdā additur, cor item & caput roborat. Tamen si ante potum odoretur, ebrietatem accelerat, multo magis si vino imponatur.

*Li. 7 sim  
plic.*

**T**Hus est lachryma Arabicæ arboris, calidum ordine secundo, siccum primo, modicè astringit, terget inbecilliter, coquit phlegmonas, anodynū est & sarcoticū, cicatricem remoratur, emplastrū temperatū iuuat, acerbis mistum vehementiam illorū obtundit, pus mouet, quia calidum emplastricū, nullam euidentem astringendi vim sortitum, præcipuè pinguius & albius. Nam flauius siccatur magis. Adulteratur resina picæ, & gummi quod non inflammatur, illa autem in fumum abit, thus ardet.

*Libr. 13.  
method.*

Cortex Thuris insigniter astringit, siccatur ordine secundo, crassiorū est partium, quàm Thus, miuimū habet acrimoniā, ardet igni cū odoris fragrantia. Cortex, verò nucis & pini quo adulteratur, fumat tantū, & sine odore.

*Lib. 4. cō.  
ph. par.*

Mannam, seu Mannam thuris (vt libr. 9. comp. ph. par. bis leges) propriè vocant micæ Thuris ex magnis fasciculis cōcussu elisas, à Thure læuigato diuersas. Nā fragmenta quædam exigua corticis thuris ei manne inharēt, à quibus exiguum quiddam astringit

tion




ctionis assumptis, qua differt à Thure quippe quò magis astringit, tamē etiam coquit, lib. 1. comp. ph. part. Manna est thuris purgamētum, leui astrictione præditum, quòd ei corticis thuris paululum sit admistum, lib. 13. meth. Thus enim puris tantum mouendi facultatem habet, nullam astringendi vim obtinens præsertim pinguius & albius. Primatū tenet in Thuris genere masculinum, quod *λίβανον ἀσπέρην* Actuatio dicitur, suapte natura rotundum, induriduum, candidum, cū frangitur intus pingue, in suffitu statim ardens.

**T**RAGACANTHOS, Tragacantha, vel Tragacanthon, lachryma radicibus incis Di. 8. simpli.  
Dioscoridi, sponte Theophrasto profluens: Li. 7. simpli. in can-  
vim habet similē gūmi emplasticā quādam cano Dio-  
siccantē, acrimoniā leuiorē, arteriæ asperi- scorid.  
tatē lenit cū vino macerata & leuigata, vt cācani radix, vel in aqua die vno, lib. 7. cōp. ph. p. Tragacanthæ fructus, li. 10. cōp. ph. pa.  
Tragacantha alba Actuatio sepe. Prestat perlucens gracilis, leuis, syncera, subdulcis.

Ex plantis quoq; , & aliis quibusdam viculis aquam per vaporem educere, neoteri-  
cū est, vnde Actuatio frequens *πόδις αἶμα*,  
id est, stillatitius rosarum liquor, & *ἰνύβος αἶμα*  
intyborum. De quibus pauca quædam  
generatim libro tertio dicenda putauit.

D E





METALLICA vim medicamentosam habent magna sui parte maximam, quædam etiam deleteriam, ut coniectura sit magna, ex his vapores caloris interni vi elatos platarum varietatem non parum iuuare. Ne putes massam tantam frustra à Deo maximo conditam, & otiosam, in quibus facultates naturales etiam omnes inesse soli chymistæ testantur, nec meo iudicio malè sentiunt, quod oculus in multis apertè videt: licet plumbo metallorum soli incrementum concedat Galenus.

A Vrum metallorum purissimum, pretiosissimum, temperatissimum, in foliola & velut bracteolas percussu multo inter chartas latefcit, eoque vtuntur medici ad naturæ robur, & affectus melancholicos, quauis in eo principiorum mistio sit firmitior, quàm vt à calore nostro possit dissolui. Aequius multò arte chymistica solutum & potabile exhiberent, medicinam latificantem, & in iuuentute corpus conseruantem, si Geboro in metallicis exercitatissimo credimus.

A Rgentum similiter foliatum est, quando auri loco vsurpant, solutum & potabile, vt aurum: felicius propinatur, nisi au-



ro esset multò imperfectius atq; impurius. Argentum à colore, viuum à motu Latinis dicitur, à consistentia verò Græcis *ἰργάριον*, sed hanc arte factam Gal. lib. 9. simp. illud minerale vult Hermolaüs: cum tam factitium ex minio, quàm minerale, seu in argenti fodinarum tectis stillatim concretum, siue per se in metallis inuentum, Dioscorides hydrargyron appellet. Cui congener ex aque fontibus vomica perpetua scaturit Plinio. Argentum viuum est metallorum omnium cum sulfure materia à calore tēperatissimo sic per minima vnitum, vt siccum humido, & humidum sicco æqualiter in eo temperentur, Geberus. Vnde opinor, chymistis calore & frigore temperatū quoq; dicitur, non quarto gradu cum quibusdam frigidum, cum aliis calidum. Neq; contra chymistarum placitum pugnare videtur, quod scribit Dioscorides, potum vim habere pernicipalem: suo enim pondere interna erodere addit, non qualitate aliqua caustica. Neque verba Galeni libr. 4. simpli. cap. 18. quòd scilicet calore nostro calidum actu redditum, per erosionem interimit, & lib. 5. cap. 18. quòd tota sua substantia nobis contrarium sit, & venenū si sumatur: neuter enim id aut calore immodico aut frigore deleterium dicit: sed ille pondere, hic tota sub



substantia, ut scilicet omnino nos ledat ne-  
 cessario, quantumvis paucū sit sumptum: cum  
 deleteria calore aut frigore sint sola quāti-  
 tate deleteria. Adhuc Galenus de sola hy-  
 drargyro factitia loquitur. cuius quod inte-  
 rimat sumpta vel admota, se periculum fe-  
 cisse negat, libr. 9. simplicium. Hodie verò  
 vel pueris maximè perspicuum est, maximo  
 mortalium incommodo, quas vires sum-  
 ptum vel admotum, vel suffitum in scabie  
 Hispana, & eius symptomatis & multorum  
 artificum vsu vario, habeat argentum hoc  
 seminiuum, & crudum quouis modo pa-  
 ratum & mistum. Quod verò in metalli-  
 lis perfectis coctum est maximè, id longè,  
 omnium est efficacissimum, uti & pretiosis-  
 simum, si quis secernere, & secreto nouerit  
 uti. Illud tamen essentiae esse omnium te-  
 nuissimae, indicant apertissimè celerrima  
 eius in vaporem prætenuem abicio, & in  
 corpus quoduis etiam densissimum pene-  
 tratio, ut etiam calculum iactilem affric-  
 tu non ita multo subeat, intusque dealbet, &  
 fragilem maximè reddat. Ob id non probo  
 insum enulato vnguento, & aliis quibus-  
 dam misceri. Argentum viuum sublima-  
 tum calore ignis erodente iam peditum,  
 fit eodem quoque deleterium, ut calx & vi-  
 ni fæx vsta. Sublimandi autem (ut chymi-  
 sta



ste loquuntur) modum docet Geberus, ex quo & aliis non contemnendæ leges, quæ ad cognoscendam plenius argenti vii naturam pertinent.

**L**ithargyros est purgantis se igni materia vitii, seu feruescentis spuma ut scoriam purgatæ fixa est, ex plumbæ molybditis seu molybdæna, ex argento *ἀργυρίτις*, ex auro *χρυσίτις* omnium optima, præcipuè quæ foliata est. Lithargyros moderatissimè omnium terreorum siccat sine manifesto calore aut frigore, modicè astringit & terget. Eius usus latissimè patet libris propè omnibus compositionis phar. generalium, maximè 2. & 3. Lithargyros manifestè nec calfacit, nec refrigerat, nec humectat, sed siccat primo abscessu à temperatis: nullam enim qualitatem manifestam gustatu exhibet: nec emplastica est, nec ecphractica, nec repellit quod influit, nec digerit quod parti inflammatae est infixum, nec vlcera terget, nec expurgat euidenter, nec rodit, nec carne implet, nec eam supercrescentem absomit, parum tamè à mediis ad partium crassitiem recessit (licet sit tenuioris essetis quàm molybdæna) quam & coctione diuturna deponit fusa vi ignis, & alterata. Ex his enim est medicamentis, quæ tota liquefiunt, ut resina, cera, sed nō mox ubi ignem

*Hermolaus.*

*Li. 9. simp. ph.*

*Lib. 1. cō. ph. gen.*

atti



attigerit: quæ res multis imponit, eam non fundi putantibus. Cum oxelæo autem cocta citius liquefcit, & cum ærugine quàm cū hydrelæo, vel œnelæo, & quo plus liquoris ad coquendum habuit, eo glutinantius fit, medicamentum. Melius enim fit ex Lithargyro medicamentum, quod magis coctum erit, quod ex liquidorum, quæ miscentur, copia contingit. Expers tamen pulchrum harum virium Lithargyros, medicamentis miscetur, vt phœnicino, dia calciteos viribus eius nec commodans, nec incommodans, sed materiæ ad emplasti pharmaci compositionem idoneæ rationem obtrinet. Cruda etiam per se femorum ex itinere attritus iuuat parum siccando.

Lithargyros absolutè, interdum tamen vt in melinis à colore cydonij emplastris Lithargyros χρυσός dicitur, li. 2. cōp. ph. gen.

*Libr. 4. c. phar. par.*

**A**Rrhenicon à vetustis Græcis ab huius ætatis hominibus Arsenicum, Latinis Auripigmentum: in iisdem metallis, vt auro, argento, quibus Sandaracha gignitur: ob id eadem gleba ambo sepe mista vidimus: optimum existimatur crustosum, χρυσός (sic Galeno 1. libr. & 9. composi. phar. part. & Dioscoridi dicitur) id est, aureo colore micans, nulli materiæ permistum, in squam

*Dioscor.*



Squammas tāquā bracteolas fissile: alterum globosum, pallidum, & colore Sandaracham imitans. Vrendo multū sulfur exhalat, in argenti speciem fufum concrefcit, sed intus rubet, causticū est, crustasq; cum vehementi vredine & violento morfu excitat, hyperfarcosin absūmit, astringit, & rodit, depilat tam non vstū quā vstū: quod tenuiorum est partium, miscetur digerentibus & tergentibus..

**S**andaracha Arsenico nō solis natalibus, sed etiā tota natura affinis, vt coctione sola naturæ videatur hæc Arsenicum vincere: id enim vstione Sandaracha fit, vt cerussa trita, mota, probè vsta, in Sandarachā pictoriā abit Vitru. lib. 7. Adhæc Sandaracha licet rubra sit, aqua tamen soluta luteū *Dioscor.* colorem intensum facit: floridum autē colorem luteum, reddit Arsenicum. . Probaturn rufa, saturatior, cinnabaris colore, sulfur viuum redolens, friabilis, aliena materia vacans: Auripigmentū rubrū dicitur Serapioni. Eadem chymistis Arsenicum rubrū dicitur, vt Arsenicū croceū est Auripigmentū. Arsenicum autem absolutè his est albū naturale & fossitium. *Lib. 4. cō.* Risagalū autem (quod *ph. part.* vocant) in genere est Arsenici in iisdem *Lib. 2. c.* fo *ph. gen.* dinis inuētum. Exedunt Arsenicum sanda-



rachæ, Petræ Asiæ flos. Arsenicum & Sandaracha & chalcitis vsta emplastos reddūt flauas vel rufas.

Sandarachæ drach. semissem, & alumen scissile & rotundum miscet Andromachus stomachicis, lib. 6. comp. ph. part. & misyos Cyprij drach. 8. apud quosdam legi scribit, ibidem. Vide necum Arabibus Sandaracham voces gummi iuniperi, néve vires illius huic attribuas.

*Li. 9. sim.  
plic.*

*Diosc.*

**A**Es vstum astringit, reprimit, acre est: ob id tenuat, trahit, vlcera purgat, siccatur, cicatricem inducit carni duræ, in molli lauandum probatur rubrum, contritu cinnabarin colore imitans: nigrum verò plusquàm decet exustum est.

*Diosc.*

*Li. 9. sim.  
plic.*

Squāma aris vi & ictibus ex clauis & panibus æreis excussa, astringit, reprimit, tenuat, rodit, mordet carnē, detrahit, & liquat. Probatur crassa, rufa, præferim aruginosa.

*Diosc.*

Flos æris fit, cū es in fornace fusum in receptacula delabitur per canales, ministris aquam clarissimā vt refrigeretur affundentibus: quādo flos subitò exilit, milij effigie, brevis, grauis, splēdens: cū teritur, rufus, friabilis, multū astringit & mordet, tenuioris essentia, & magis tergentis quàm æs

*Li. 9. sim.* vstum, & squamma aris. Adulteratur aris  
squama



Squamma aur limatura.

**D**iphryges, quasi bis tostum, est perfecti aris velut fax subsidens & coherens inæfornacum parti, tanquam vstorum in foco lignorum cinis, ablato ere visitur. Duobus aliis modis fit Dioscoridi & Plinio: modicè & astringit, & acre est, ut æ vstum, vehementer siccatur, vlcera rebellia sanat, ochra vsta adulteratur. *Gal.li.9. simpl.*

**S**coria est omnium metallorum spurcitia, recrementumq; & velut stercus: siccatur, sed omnium maximè Scoria ferri læuissimè trita.

**A**erugo est aris velut rubigo in æreis vasis, laminis, squammis, scobibus lapidibus cōcreta decem diebus aceti acerrimi vapore, aut acescentium vinaceorū contactu, post decussā vel derastrā. Est acris, mordet, detrahit, liquat carnem, etiam durā, digerit, vehementer siccatur. Adulterandi & adulteratam noscendi rationem à Dioscoride traditam sciens omitto, quod larga eius synceræ conia toti Gallig à mulieribus Mō pessulānis suppedietur. Aerugo vsta (& lora) nervo vulnerato prodest, non vsta autem iusto est mordacior. *Viride aris. Verd'ris vulgò, vel Verdet. Li.9. simpl. & lib. 6. cōph p. Li.3. cōph. ph. gea.*



*Lib. 4. cō.**ph. part.**Lib. 9. sim  
plic.**Lib. 6. cō.**ph. part.**Lib. 3. cō.**ph. part.*

**C**halcanthus, hic aut hæc, vel hoc Chalcanthum, essentia est eiusdem & naturæ cum Chalciti: hæc autē nativa est, illud ex hac factitium, & in hanc tandem per se rediens: vehementissimè astringit, & calfacit non instrenuè, putridis vlceribus congruit, gargareonem etiam scirrhotentatum irritat. <sup>A</sup> hæc quum medicamentum id est vehementissimum, validis vtrisque viribus astringendi & calfaciendi præditum, vitanda eius per se vehementia, sed mitioribus mistis obtundenda. Vstum verò & lotum multò moderatius redditur, lib. 4. comp. phar. part.

*Li. 9. sim-  
plic.**Lib. 9. sim  
plic.*

**S**ori, Chalcitis, Misy, acria, vrēdo escharas excitant, & nonnihil astringunt, essentia consistentia, & situ differunt. Nam Sori in fodina infimum ac crassissimū: & quia lapidosius ac vehementius cōpaetum, in humore nō liquefcit, friādo nigrius ceu melanteria apparet, ac scintillat vt Misy, in multa foramina dehiscit, olfactu & gustatu virus olet, subpingue est Diosco. Misy grumosum & frustulosum magis est durum, auro simile, quod friando auri colorem imitatur, & stellæ modo splēdet. Dioscor. summum & tenuissimum, & à calore ingenito magis elaboratū, & siccus. Proinde agrius liquefcit, & corporibus duris admo.



admotum ob tenuitatem minùs ea mor-  
det, quàm Chalcitis, tametsi æquè calidū.  
Eadem ratione Chalcitis vsta minùs mor-  
dicat, & minùs astringit, non minùs tamen  
ficcatur. Chalcitis situ & essentia est me- *Dios.*  
dia, ari similis, friabilis, nō lapidosa, prom *Gal.*  
ptissimè liquefcit. ea vsta melior est quàm  
non vsta: quia tenuiore est substantia, vt  
alia omnia vsta, non tamen acriore, quod  
aliis multis vstis accidit. Vsta autē omnia  
lauando mitiora & minùs mordacia eua-  
dunt. Soreos pars extima & summa in  
chalcitin, & chalciteos partes extimæ in  
Misy tandem transeunt: in metallica fodi-  
na, & quo loco seruatur, quomodo ari. in-  
nascitur ærugo. Hæc Sori, Chalcitis, Misy  
valenter tergent, Misy etiam modicè par-  
ticeps est facultatis exedentis. Chalci- *Lib. 4. cō.*  
tis cruda mordax est, vim autem eius vren *ph. part.*  
do minuimus, idonea est columellæ in-  
flammatæ, quando vehementer inuetera- *Lib. 6. cō.*  
uit, & curatu contumax est. Chalcitis vsta *ph. part.*  
est eligenda, quæ vrēdo cineritia euaserit, *Lib. 1. cō.*  
non ὡς ποξάυ]Ⓢ, qualis vstione fit à multis, *ph. gen. &*  
Modus vrendi in Diosc. Chalcitis vsta *in Theria*  
non minùs efficax, sed minus mordax. *ce.*

**C**Admia est corpus racematim & densè *Diosc.*  
concretū in rudibus ferreis, ex fuligi-  
ne aris in fornacibus candentis egesta fla-



tu, & lateribus camerisq; fornacum ferraris inharrente: est colore spodij, fractaq; cinerulenta, & aruginosa, quæ optima est. Fit etiam ex argenti terra, & cocto lapide Pyrite. Siccat vt terrena omnia, mediocriter terget, igneæ facultatis & mordētis aliquid habet, quam lauatio adimit, vlcera carne implet in carne molli. Melior & tēnuior botrytis, id est, racemosa in summo collecta, quam placitis, id est, crustacia in imo & lateribus. Cadmia etiam lapis est in montibus & riuis Cypri repertus, alia omni cadmia multo efficacior, inuentu rarus. Lapidē calaminari dicto hoc lē æs tingunt ex rubido in albidum, quo lebetes ferè fiunt.

*Diosc.* **D**Um æs perficitur detrita cadmia cumulatius inspersa fauilla in cameram integrā effertur tenuissima, quæ in Pompholygē ceu bullas quasdam coit: fit & fine ære ex solis cadmiæ fragmentis in ignē coniectis & perflatis. Ea dum fit, quæ excrementi portio in pavimentum reperiussa recidit, Spodos est, seu spodium, grauius, & impurius, & minùs efficax Pompholyge.

*Li 9. simplic.* Pompholyx lota omniū propè citra morsum siccantium præstantissima, ad vlcera ob id cancrofa, & alia maligna, & oculorum fluxiones efficacissima.

Plum



**P**lumbum frigidum humidum, ob id li-  
 quor quiuis frigidus (vt oleum ompha-  
 cinum, rosaceum, mælinum, myrtinū, sem-  
 peruiui, coryledonis, intybi, lactucae suc-  
 cus) in mortario plumbeo, pistillo plum-  
 beo ductus dum crassescat, seipso frigidior  
 euadit, optimumq; sit remedium phlegmo-  
 narum incipiētium, & fluxionum aliarum  
 in inguina, pedes, articulos alios, & vlce-  
 rum rebellium, & cancrorū. Lamina plum-  
 bi lumbis instrata veneris infomnia sedat,  
 ganglia diffecat illigata. Plumbum vstum  
 & lotum vlcera rebellia, chæronia cancro-  
 sa carne implet, ac cicatrice tegit.

**M**olybdena substantiæ est crassioris  
 & frigidioris, quàm Lithargyros, nō  
 terget tamē, cætera vsum habet propè eum  
 dem in emplastris, licet varium colorem  
 afferat. Ambo liquantur tardius cum hy-  
 drelæo, celerrimè oxelæo.

Li. 1. cōp.  
 ph. g.  
 Li. 9. sim-  
 plic.

**C**erusa aceti acris vi ex plumbo soluta  
 refrigerat, ficit, astringit, emplasti-  
 ca est, candefacit, hæc lota plumbo vsto  
 loto viribus proxima: vsta transit in San-  
 dyca, fitque tenuior, nondum calfaciens,  
 Phycos cerussæ frigiditate seruata tenui-  
 tatem assumpsit, qua vis eius adiuta in  
 profundum corporis penetrat. Cerus-  
 sa Rhodiaca, vel illi similis ex ciuitate Di-

Li. 9. sim-  
 plic.  
 Lib. 1. cō.  
 ph. p.  
 Galib. 1.  
 c. ph. gen.



*Lib. 4. cō. ph. part.* cæarchia olim dicta, nunc Puteolis: præfer-  
tur si emplastrum vis eximiè candidum fie-  
ri, quia albidior, leuior, tenuiorum partium  
his, quæ alibi nascuntur. Sāl ex Cerussa ad  
multa efficacissimus, & oleum ex Cerussa.

*Li. 9. sim-  
plic.* Sulfur omne calidum, tenuis essentia, tra-  
hit, terget: salua, vel lotio, vel oleo vete-  
ri, vel melle, vel terebinthina exceptum, ve-  
nenatis ictibus impositum sanat Psoras, le-  
pras, lichenas cum terebinthina tergēdo &  
dissipādo persanat. Nobilissimum est ἀπυ-  
ρον, id est, viuum, & ignem non expertum:  
ignem expertum quo virentius, oleosius,  
pinguius, eo melius. Ex Sulfure oleū chy-  
mistis efficacissimum trahitur, fumo eius  
ardentis in campanam vitream recepto, in  
oleum concreto, & in catinum subiectum  
destillante: sed quia ex multo sulfure pau-  
cum ascendit, pretiosum est: fit & aliter.

Sulfur idem sublimando (vt illi appel-  
lant) purgatissimum & clementissimum ef-  
ficiūt, etiam pretiosum eadē de causa. Cu-  
ius vsum non est quòd vereare quorundam  
imperitorum exemplo: cum Galenus viuū  
Sulfur impurissimum diamoro stomatico  
medicamento ad digerendū misceat, bis li.

*Lib. 1. cō. ph. part.* 6. comp. ph. p. Nocet Sulfur achoribus: quia  
plus quàm par est, eos calfacit, & digerit.

Alum



**A**lumen ab astrictione vehementissi-  
ma Græcis *συνήγία* dicitur, crassatū  
est partium, maxime liquidum, & Placites  
& Plinthites dictum à crustæ & lateris for-  
ma: minus strongylon & astragalotes, id  
est, rotondum in astragali modum: mini-  
mum schistum, id est, scissile non in fila sed  
digitis friabile. Omne alumen in aqua sol-  
uitur, & igni liquefcit, tardius scissile, quod  
sine bullis tandem mollescit, idem aquæ in-  
natat, linguæ & cuti integræ est mordacissi-  
mum, adulteratur segmentis lapidis amiā-  
thi: sed hæc acrimonia carent, & ex pingui  
aliquo ardent rediuiuo corpore, aqua mer-  
guntur, & integra manent, in filiâq; dissi-  
liunt. Alumen scissile colore candidum &  
præstâtissimum, idem tenuius & vtilius, lib. *Lib. I. cō.  
ph. gen.*  
6. comp. ph. part. Et quia rarum inuentu,  
carius: liquidum contrâ, crassum & vilissi-  
mi pretij, quia in omnibus regionibus in-  
uentu est facillimum, lib. eodem sexto.

**S**puma nitri, aphronitrum, nitrum, poten-  
ter tergēt cuti affricta: sit autem nitrum  
ex tenuibus partibus constans: quod autem  
lapidosum est, vrendum ac diligenter leui-  
gandum. ἀφρὸς λίτρον, seu νίτρον, id est, Spu-  
ma nitri ab Aphronitro differt, (sic χαλκοῦ  
ἔνθ' à χαλκάνθῳ, & ἀκάνθη λιναὶ à λινα-



*νάυρη*, & multa alia similiter) illa enim alba est farinae triticeae similis, eiusdem cum nitro facultatis & naturae, sed essentiae tenuioris: haec autem in glebas coactum & congelatum, amarum, in balneis sordes terget, & ichoras pruritus excitantes digerit. Nitrum praesertim bernicium, seu beroniceum potius. libr. 8. Meth. siccatur, digerit: sumptum autem in corpus incidit, tenuat crassos & lentos humores multo potentius quam sal: amarum enim est, cap. 3. lib. 4. simpl. vsum vero tenuitatem substantiae adeptum spumae nitri proximum est.

*Ca. in dio  
spolitico.  
Lib. 4. fa-  
nit. tuen.*

Nitrum rubrum libr. 9. comp. ph. part. Aphronitrum magis quam haec incidit, stomacho inimicum est, ob id non deuoratur, nisi grauis urgeat necessitas. Nitrum vero sumitur, & aluum subducit. Omnia haec hodie desiderantur, quorum loco supponunt officinae salem petrae purgatum, in panes coactum. Id mentiri satius esset cineribus betae, brassicae, & aliorum nitroforum.

*Li. 9. sim-  
plic.*

**S**al, tam fossitius, vulgo sal gemme, quam marinus, terget, astringit modice, valide siccatur, digerit, libr. 6. composit. ph. part.

*Lib. 6. cō  
ph. part.*

Per se, & cum galla laui attractu iuuat gargareonem inflammatum iam durescetem in scirrhum: non autem initio, neque dum augefcit



angescit, aut cum multo calore viget: quod si corpus sit plethoricum, aut saltem caput plenum, si initio adhibetur inflammato gargarioni, extrema laboranti noxa infertur.

Sal astringit magis quam tergeat, siccatur *Lib. 2. c. 8.*  
autem non minus quam nitrum, aut nitri *ph. gene.*  
spuma: sed hæc non astringunt, ob id ceratis mixta ulcerum sordes tergent: Sal ob  
astrictionem id non præstat. Sal Arme- *Li. 9. sim.*  
niacus terget, subacer est, leuissimè astringit, humores acres in superciliis inspersus consumit, à quibus pili malè nutriti excidunt.

Hammoniaco fali similem forma schistum lapilem docet Discorides. Sal Hammoniæ valenter digerit, libr. 6. compositi. phar. part. noster tam nigricans quam albicans facticius est.

**S**timni, id est, Stibium siccatur, astringit, *Antimonium.*  
oculorum collyriis liquidis & siccis miscetur, illotum valenter astringit, lotum soluitur, & naturam essequitur propè rofionis expertem, fossitium melius. Quod enim estendunt, igni coctum est, idque purius, vel faculentius & scoriosum. Oleum ex Stibio pretiosissimum. Mulieres oculis gratiam *Lib. 6. fab. nit. tuend.*  
Stibio conciliant, ipsum palpebris specillo inducentes quotidie, sic ne oculi membranam intus contingant.

Chry



*Li. 9. simplic.*

**C**hrysocolle tam metallica quàm factitia, valenter digerit, & siccatur, carnem liquat sine valenti morfu. Chrysocolle, Spodium, Pompholyx, Psoricum, metallica sunt admodum tenuis essentiae citra calorem. Nostra omnis est factitia, aurique ferrumini fundendo celeritatem addit, unde illi nomen.

*Li. 9. simplic.*

**G**ypsum siccatur, ut cætera terrea, emplasticum est: cogitur enim ac lapidescit liquore aliquo ut albumine maceratum, sanguinis eruptionem cohibet, cum tenui farina pilis leporum vel similiter mollibus exceptum:ustum minus est emplasticum, tenuium partium, siccus est, ex oxycrato repellit. Nostrum verò Gypsum, uti calx, vrendo emplasticum magis euadit.

*Ibidem.*

**P**vmex sarcoticis miscetur, dentes politur, facultate deterforia, & asperitate, ut smiris, testæ, cornua animalium vsta:ustus tenuiorum fit partium, & acrimoniam sumit, quam lotionem deponit. Nunc scriptoribus propè solis ad papyrus exoliendam cum gummi iuniperi est vsui.

*Ibidem.*

**C**yanus hic aut hæc, acer est, catharticus, id est detrahens, digerit potentius quàm Cinnabari, & subastringit. Vim purgantem melancholiâ suprâ & infrâ, ac melancholico



lancholicum succū ipsi illoto præbet Mesues communem cū lapide Armeno, ob id ambos valere cēset aduersus omnes melancholicos affectus, maniam, melancholiam, epilepsiam alteram, elephantiam, caneros, alphas nigros, quartanas, hæmorrhoidas. Sed & alias ei vires miras tribuit, vocatq; lapidē lazuli & stellatum, quod velut stellæ quædam aureæ in eius fracturis cernantur. Is vrendo caruleus magis euadit, si verus est: malus verò nigricat vstione. Tam hic quàm sequens nostratibus medicis in usu hodie sunt rarissimo.

**A**Rmenius lapis illotus supra & infra atram bilē vacuat datus à drach. vna ad scrup. quatuor: lotus autē etiam quinquagies tutior est, ac tantū infra vacuat à scrup. quinque ad scrup. sex. Alexander Trallianus in melancholia, & post eum Mesues in simplicibus.

**D**entalem lapidem addunt, qui dēs piscis alicuius videtur forma & interna cavitare. Antalem addunt nescio quem, & vnde dictum.

**C**Alx vina vehemēter vrit, adeo vt crustas efficiat, & mox vbi est extincta. Iam diu extincta non est caustica amplius, sed calida sicca: carnem tamen liquat: lota ter quater sine morſu strēuē siccatur.



## DE LAPIDIBVS.

*Galen.*  
*Li. 9. sim.*  
*& lib. 10*  
*cō. ph. par*



**L**APIDES in spōgiis reperti, tri-  
ti, ex vino poti, lapides renum  
rūpunt, non autē vesicæ, quia te-  
nuioris sunt essentię sine insigni  
calore. Vesicę autem calculos rumpere scri-  
bit Dioscorides, si ex vino bibantur.

*Li. 9. sim.* **I**Aspis virens stomachum & ventriculum  
atta tu suo iuuat. Omnes Iaspidum spe-  
cies femoribus appensę partum accelerare  
traduntur Dioscor.

*Li. 9. sim.* **S**Apphyrus potus ictos à scorpione iuuare  
s creditur intestinas vlcerationes potu e-  
mendat, Dioscor.

*Lib. 9.* **L**Apis Iudaicus, qui in Iudæa nascitur le-  
uissimè tritus potus renum lapides frā-  
git, ad lunt quidam & vesicæ. Pueris datus  
cū lacte, vrinalia & intestina purgat. Est no-  
bis multus Dios. elegātem picturā explens.

*Li. 9. sim.*  
*Geet Gal*  
*in.* **G**Agates lapis colore atro, odore dū v-  
ritur bituminis. siccatur, glutinat, dige-  
ritur ad motus, in corollis precariis & salinis  
frequens.

*Li. 9. sim.* **M**Agnes siccatur hēmatitæ modo, & a-  
stringit, ad enterocelen vtiliter sumi-  
tur, & adinouetur. Magni est miraculi in  
eo tanquā in mundo aliquo polorum cœli  
rationem inesse.

**Hama.**



**H**æmatites à sanguinis colore dict<sup>9</sup> frigidus, astringēs, excrescētia reprimi, oculorū vulnera per sanat, sanguinis expulsiōi valet: siccāt humores, sed minūs quā m cadmia. Nam ex humida substantia non restri constat, & super cotem medicā cum liquore tritus, in succū soluitur: per se verò in corpus simile minuitur, vt schistus lapis, non in fragmenta terrestria, vt cadmia.

*Li. 9. sim.*

**S**chistus lapis hæmatitæ vim habet persimilem, sed infirmiore.

*Lib. 4. cē.*

*ph. part.*

**S**miris terget, dentes puros in dentifricio efficit, & eo annularij scalptores expurgāt lapides: ad erodēdū & vrēdū utilis. Nūc in vsu est vitrariis laminas vitreas diuisuris.

**P**yrites lapis de quo asperficitur, aris aspectu scitillas leui percussu edēs: crudus & coctus calfacit, terget, digerit. Valide autem est facultatis, Gal. lib. 9. simpl. Marcasita aris quibusdam dicta putatur.

**E**cote Naxia quod exacuendo ferro dēteritur, illitum alopecias ad pilum redit Dioscorides.

**P**ropus lapillus, id est, Rubinus, plurimus est in insula maris Indici dicta Zaylon, Ludouicus Romanus Patritius.

**E**ranus lapillus in Euphrate inuentus, Turchica vulgō, Ludouicus Romanus Patritius.

Corall



**C**Orallus lapis Actu. dicitur, *λίθος ὀρνίθου*.  
 Aliqui vocarunt, fruticis forma cinnamomi amulus, crescit ad promontoria in mari, astringit & refrigerat, contra sanguinis reiectiones magnopere efficax. Rubrum & nigrum tatum facit Dioscorides, albus tamen etiam visitur citra usionem.

*Lapis.*  
*Aquila.* **A**Etites lapis veluti pragnas, cum quitur alio in vtero sonante, gravidis continet partus, Diosc. Id usu quotidiano probatum Gallis est sursum alligantibus: cum vero partum iuvare voluit, foeminibus adhibet, tanquam foetum ad se trahat, ubi ubi fuerit.

**A**Mianthus lapis est Cypro alumini scissili similis, quique pro eo proprie solus venditur. Ex hoc telae contextae flammis iniectae ardent, sed flammis inuictae splendiores exeunt. Ellychnij loco hodie ad ostentationem lychnis adhibent, & ob id Ellychnium immortale vocant. *Menche sans fin.*

**S**igillum Lemnium efficacius sanguinis ex quavis parte eruptiones cohibet, quam Samius Aster: hic contra tenax & viscosior, quam Lemnia terra: ambo moderate tergent. Lemniae etiam adstrictio quaedam inest. *μίλητος & λίμνια*, lib. 7. comp. phar. part. in arteriace 14. Andromachi. Ea nobis est venia Constantinopoli delata.

*Cimolia*



**C**imolia terra digerit, siccatur sine morfu, maximè si elota sit. Eius loco utimur hodie ferri & molæ retrimētis in subditam aquam congestis, quod à Cimolo insula è Cycladibus una non afferatur.

**C**retica terra admodum imbecilla est, multum aëriæ habet substantiæ, terget sine morfu, ob id vasa argentea etiam polit. Creta nobis hodie dicitur.

**A**rmenia terra colore pallido vel luteo, *Li. 9. sim.* promptissimè in summum leuorem calcis modo soluitur pistillo, aut quouis liquore mista, arenosa substantia caret, summe siccatur: ob id est optima sâguinis expuitioni, dysenteriae, vëtris fluori, catarrhis & fluxionibus à capite in thoracem, & inde nascenti asthmati, & phthoræ, quia vlc<sup>o</sup> in ea siccatur, & tussim sedat: vlceribus etiâ putribus oris, fistulis ani remedio est. Et in pestilentia Romæ maxima, quotquot bolum hanc Armeniam biberunt, celeriter curati sunt. Quibus autem, utpote incurabilibus, non profuit, omnes interiere, à nullo alio adiuti. Bibenda ex vino albo consistentia tenui, modicè diluto, si aut planè febri careant, aut ea levis sit: si grauis sit, multum diluto: quam pestilens parum calet. βάλανος ἀρμενίου & πύλον, id est lutum, ἀρμενικόν Actuario saepe.




*Libr. 1. cō.  
ph. gen.  
l. 11. sim.*

**A**spaltos hic aut hæc, lib. 1. antidoto-  
rum, id est, bitumen, verū est nigrum  
& splendescens: dum aquis innatat, molle:  
cūm siccatum est, pice sicca durius efficitur:  
calfacit, siccatur ordine secūdo. Optimum est,  
ex mari mortuo, stagno salso in Cœlosyria.

Ioannem Baptistam Montanum Vero-  
nensem medicum egregiam nauare operā  
in medicamentis metallicis etiam arte chy-  
mistica parandis, Simon Thomas medicus  
longè doctissimus Georgij de Selue Vau-  
rensis Episcopi vnde quaque absolutissimi  
affirmavit.

## DE ANIMALIBVS, ET EORVM PARTIBVS.



**S**ANGVIS hirci quadriimi, bene  
habiti, aliquandiu nutriti vino  
albo, fœniculo, seseli, lauro, &  
cæteris calculum frangentibus  
Augusto mense iugulati, medius effluens  
(nā primus tenuior, postremus crassior pu-  
tatur) vase vitreo receptus, tectus linteo ia-  
ro, sole siccat, etiam cum myrrha, foliis  
lauri, & similibus, calculum potenter fran-  
gere dicitur Tralliano, Auicennæ, & cæteris  
practicis. Huic quandiu ab animali calet,  
coquēdi abscessus vim tantū tribuit, Gal-  
lib.



lib. 10. simplic. qualem caprino, taurino, & cæteris calidis humidis modicè. Quòd si hircinus sanguis adamantem frangit, sed calidus tantum ab animali: sic lapidem calidus tantum epotus fregerit. Quod & sanguinem vulpinum ex vena secta potum præstare audio. Ne autem coaguletur, Xenocratis exemplo, miscere possis acetum feruefactum aut coagulum. Hirci quoque, capri, cerui, leporis, sanguinem sartagine frixum, dysenterias & cæliacorum profluvium sistere tantum docet Dioscorides, nō addit calculum frangere, quæ vis tenuibus conuenit, cum dictorum animalium sanguis substantia crassa & terrea, & cum calore siccatoria dysenterias sanat. Sanguis ex secta vena sinistra profluens lieni affecto infricatur Archigæni, lib. 9. comp. ph. part.

Gale. lib. 10. in sã. vespertilionis.

Sanguis Draconis veterum, & Cinnabaris vera, hodie ignorantur: qui verò sanguis draconis ostenditur, factitius est ex sanguine hirci, bolo Armenia, & succo sorborum, vel aliis. Quo tamen rectius uti possis, quàm cinnabrio neotericorum, ex sulfure viuo, & argento viuo simul vstis, loco cinnabaris Græcorum, quæ vires habebat easdē cum hæmatite lapide, & tam rara erat etiam ætate Dioscoridis, ut versicoloribus pictorum lineis vix satisfaceret.

δράκοντος  
aut δρακόντιον  
λούμενον  
αἷμα.  
Act.



*Lib. 10. si.* **L**ac lauat, terget serò, emplasticum est  
*Lib. 7. cõ.* butyro & caseo: ob hæc acres & mor-  
*ph. part.* daces fluxiones obtundit, recens vtendum.  
*Lib. 5. cõ.* Butyrum, & Caseus etiã veterata vsurpan-  
*ph. part.* tur. Butyrum etiam minimũ terget, vt deco-  
*et lib. 11.* ctum glycyrrhizæ: coquit item & digerit,  
*simpl. de le* bubonas, parotidas, oris phlegmonas in  
*poris cere-* pueris & mulieribus, gingiuas puerorum  
*bro.* cum dolore dentientium crebro illitu te-  
 nuat, quantum mel: idem lacti canino, & le-  
 poris cerebello tribuit Archigenes. Expui-  
 tionem Butyrum promouet (maximè cum  
 melle aut saccharo) in pleuritide & peri-  
 pneumonia, quos affectus etiam coquit.

Caseus recens refrigerat, repellit, siccatur,  
 vulnera etiam magna glutinat. Ex vetusta-  
 te verò acer, cum pernæ decocto subactus  
 tophos eliquat & aperit.

Coagulum omne ex lactis in ventriculo  
 primo corruptione acre, digerit, siccatur. Lac  
 aut sanguinem in ventriculo coagularũ dis-  
 soluit: leporinũ omniũ est prastatissimum.

*Aph. 19.* Qui igitur menses immodicos cum Pra-  
*libr. 5.* cticis & Medicorum vulgò queat sistere,  
 cum calidum sit vitadum, vbi sanguis fluit,  
 aut fluxurus est?

*Gal. li. 11.* **A**deps seu Pinguedo omnis calfacit, hu-  
*simpl.* mectat magis vel minùs pro varia ani-  
 maliũ natura. Leoninus calidissimus siccissi-  
 mus,



mus, id est: minimum humidus: potētissimè  
 omniū digerit ob acrem multāque calidi-  
 tatem, & partium tenuitatem, ob id scirrhis  
 & inueteratis tumoribus tantum aptus. Par  
 dinus ei proximus, pardino vrsinus, tauri-  
 nus vrsino vicinus, sed tanto quā suillus  
 calidior siccior, quanto. minùs leonino est  
 calidus siccus: ab utroque enim ex æquo di-  
 stat in amborum medio cōstitutus. Suillus  
 autem omnium propè humidissimus. Capri-  
 nus, præcipuè hircinus, crassior taurino, ob  
 id celerrimè concrefcit. Inter taurinum &  
 suillum fuerint vulpinus alopecias sanans,  
 caninus, melinus, felinus, cuniculinus, came-  
 linus, equinus, vaccinus, vitulinus. Anseri-  
 nus maximè tenuium partium, ob id in vo-  
 luum genere præstat ad scirrhū curationē:  
 gallinaceus illi proximus. Adeps humanus  
 omnium est temperatissimus. Idem vetu-  
 state calidiores & sicciores euadunt, vt ole-  
 um, mel, vinū. Reponitur aut incuratus, lo-  
 tus, siccatus in vmbra, vel exemptis pellicu-  
 lis fusus sole vel igni in vase duplici. Adeps  
 cerui nullo medicamentorum mollienti-  
 um est inferior, lib. i. comp. phar. gen.

*L. b. 1. ad  
 Glauco-  
 nem.*

**M** Edulla calfacit, rarefacit, emollit, *Gal. libr.*  
 scirrhos quarumvis partium, præci- *ii. simpl.*  
 puè ceruina, & post hanc vitulina. Taurina,  
 hircina acrior & siccior est. Recens utili-



or est, sed etiā reponitur, vt adeps. Vtraque fumatur hyeme, vel æstatis exitu, cū appetit autumnus, Dioscor. Loco sicco & edito, & septentrionem spectanti reponitur, cum foliis lauri ficcis, ne putrescant, aut situm ducant: quæ iniuria in locis humidis meridiem spectantibus eis accidit: sunt qui reponant bifariam adipum modo.

**C**erebella Passerum vere vel autumnocaptorum, prolificis remediis miscentur, vel recentia, vel cum vitello oui & melle, siccata sole vel cinere calido.

li. ii. sim.

**O**ssa præcipuè humana vsta admodū digerūt & siccant. Eadē nescientibus ne auerferentur, pota epilepticos & arthriticos multos sanarūt. Sed epileptico os bregmaticis, arthritico articularū ossa exhibendum cēsent practici, sexu etiā obseruato. Os cranii humani donec albescat vstum potum epilepticis succurrere hodie est certissimum.

Ari. ca.

4. lib. 3. de

par. ani.

Ga. li. 6.

vsus par-

tium.

Os à corde cerui humanū cor totius substantiæ similitudine roborare Actuarius cū Arabibus consentit: sed ab aliorum animalium maiorum corde potius fuerint, quæ tam multa proferūt pharmacopolæ, quàm à corde cerui. An verò cartilaginosa hæc substantia magis præstare id queat, quàm cordis aut arteriarum corpus, ipsi viderint.

Os sepiæ dentifriciis aptissimum.

Ebur



**E** Bur tota substantia cor roborare, & conceptum iuuare, practicis scribitur, frigidum siccum primo gradu.

**C** Ornibus cerui & capre vltis, & (si opus est) lotis vtimur ad dentium candore, gingiuas mollitie fluidas, dysenteriam, fluxiones in oculos, oculorum vlcera, quia tergent sine rosione: tamen nec dolorem leniunt, nec coquunt quia frigida sicca. *Zi. II. sim pli. Libr. 4. c. phar. par.*

**C** Ornu Rhinocerotis hodie frequenter vtimur contra diuitum affectus pestilentes, aut venenosos, aut dysentericos, & pueroru nobiliu lumbricos, magno enim ob raritatem emitur. Quin & aqua, in qua huius cornu portio aliquandiu maduertit, pota idem prestare probatissimum est.

**M** Vmia nome & res barbara, hominu scilicet liquame aloë, myrrha, balsamo in sepulchris conditoru, calida sicca tertio gradu, astringit. Serapionis autē Mumia est Pissasphaltus, id est, pix cum birumine Iudaico, quia hæc duo redolet Dioscoridi.

**T** Vnicam interiorē ventriculi secundi gallinarum miro quodā modo lotā & siccātī & potam stomachicis augere coquendi facultatem: & ventrē mergi, vel recentē elixum vel siccātū & sumptū, falsum



*Li. II. sim  
plic.* esse expertus est Galenus. Vnde subit admirari in ea heresi falsa medicos omnes etiam hodie permanere. Putant, opinor, eam vim illi esse, quod ea similis sit tunicae internae ventriculi nostri, sed vi tanta coquendi praedita, ut lapillos conficiat: sed æquius fuerit, *Pli. ca. I.  
lib. 10.* eam tunicam ex struthiocamelo sumere, quippe cui mira sit natura coquendi, quæ sine delectu deuorant, ut ferrum & ossa veruecum integra. Vnde & pelles eorum cum plumis mollioribus concinnatas stomachicis applicant. An non vident harum pellicularum temperamentum vitari ficatione, & vim illam coquendi viuis inesse, non superesse mortuis: nec fortasse pellibus illis insitum, sed potius à carne multa crassa, densa, pelliculam hanc vndique ambiente.

*Libro II.  
simpl.* I Ecur lupi in medicamentum ex eupatorio hepaticum saepe indidi, nec multò efficacius ob id comperi. Hepaticos tamen ipsum tota substantia iuuare sufficientem se habere experientiam scribit lib. 8. comp. phar. part. Puluerem quoque ex eo in hydropo cum vino albo in dies aliquot mane potum, inter secreta quædam remedia reponunt nonnulli.

Hepar tamen vulpis aridum ex oxymelite potum splenicis imperat Archigenes  
apud



apud Galenum, lib. 9. comp. phar. part.

Splen onagri, aut equi sylvestris tostus & tritus idem ibidem pollicetur. Hepati calido sicco salubre existimo hepar raia, cithari, id est, rouseta, & hepati, id est, aquile maris, & si qua sunt alia in piscibus similia.

**P**lmonem vulpis siccatum potumque *Ga. li. II. simpl.*  
 asthmaticis Galenus, phthysicis verò ob eandem totius substantia familiaritatem saluberimum omnes propè practici inculcant. Plura de his in libro sequente de ratione medicamentorum componendi leges initio, ubi facultates composituro noscendas declaramus.

**R**enes scincorum, crocodilorum terrestrium, tanquam pudendum ad veni- *Ga. li. II. simpl.*  
 rem intendentes quidam bibunt: alij summen quoque & caudam assumunt: unde compositio est Actuatio diafscinu.

**C**astorium, seu testes castoris calfaciunt, *Lib. II. simpl.*  
 siccant, sunt tenuium valde partiū, con- *Lib. 3. c. 6. ph. part.*  
 quunt dispositiones cōtumaces & scirrhus. Eligendi qui ex vno principio commi- *Dioscor. Li. II. sim- plic.*  
 tūtur, & quibus est intus liquor cerosus, friabilis, odore grauis & virus olēte, gustu acris & mordaci. Ex quibus duobus suspicari possis, substantia esse nobis aduersissimos: nulli



*Bieure, fi* autem vel admotū vel sumptum est perni-  
*ber meta-* ciosum castorium. Lutræ animalis fibro si-  
*thesi di-* milistestes idē pōllere addit Herm. Pontici  
*etus Pli.* castores sunt præstantissimi, quod & Virgi-  
*c. 30. li. 8.* lius innuit li. 1. Geor. vbi virosa Pōtus casto-  
*cap. 2.* rea mittere dicitur. Nec inepti qui ad Ma-  
*lib. 32.* tronā Gallix fluiū crebrō capiūtur, mirabi-

*Ludoui-*  
*cus Ro-*  
*ma. Pat.*  
*Lib. To-*  
*bia.*

li spectaculo animalia, cauda piscosa; soleæ æmula, pilo supernē canino: alibi Lutræ pedibus anterioribus anseris, sed vngatis, simiæ posterioribus, auribus minimis, rotundis, dente validissimo, adunco; prelōgo, seta oris cornea, architectura in fossa sua mirabili. Castorium nigrum fœtidū, rancidū, die vno necare affirmat Auic. Castoriū è Perside fermē adulteratū ad nos defertur: syncerū enim tanta vi odoris est præditū vt olfacienti vesicā castorij, sanguinē è naribus eliciat. Persæ autem adulterandis rebus sunt exercitatissimi. Seruatur annis decem.

**F**elle animalium ob acrimoniam & calorem solo vix vtimur, præterquā ad aperiendas hæmorrhoidas, sed collyriis, trochiscis, alijsq; remediis miscemus. Fella piscium oculis sunt tutiora, vt eorundem hepata sicco hepati salubriora.

**S**ordes gymnasiōrū & balneorū colligi defierunt, his tamen multō efficacior ad digerendum est auriū sordes planē biliosa.

Oesy



**O**esypus est succidarum lanarum pinguitudo, calfacit, explet vlcera praeserim sedis & vuluae, ac emollit. *ὄσῑπος* & *ἄσῑπος* *ὄσῑπος* apud Paulum aliquoties legitur, vnde opinor practicis consuetudo appellandi hyssopum humidum, pro oesypum, volentibus ab hyssopo herba separare: *ὄσῑπος* autem Galeno cum Dioscor. semper licitur. Lana succida & sordida confusa Lib. I. r. fertilis ob oesypum: lota verò est vice lini simpl. menti carpti, vsta autem acris calida sicca, tenuium partium.

**S**tercus canum & luporū, ossibus, ac puerorum pane, & lupinis triduo educatorum. Galenus ceu certissima multorum affe-ctuum remedia praedicat: ob id sicca sunt seruanda in vsus medicorum.

**M**oschus Aëtio, Paulo, Actuário, Arabibus animalis Gazellæ dicti, dorcadis similis, est pus in vmbilico maturū, Dioscoridi & Gale. incognitus. Cætera aperte declarat Ruellius, calfacit, siccatur ordine tertio Simeoni: tenuiū est partium, odore aromatico, spiritus instaurat, imbecillas partes confirmat, lipothymiam & vires resolutas sanat, ob id cōpositionibus multis analeptici miscetur: quibus scilicet mulieribus vteri praefocationem affert, aliis in pessa cōtra hanc mirè prodest, vtero valde gratus, vt cū oleo cici



*Serapio.* cicino inunctus pudendo, venerem excitet. Melior est subflauus, quàm nigricans, & qui pelui humectatæ immixtus leuior euadit, quàm qui grauior. Indicus est melior Aphro. Ex Catay tamen niger præstantissimus hodie affertur. Citrinū Auicenna præfert hodie incognitum, nam ferrugineus est. Quibusdam malè olet, aliis caput frigidum iuuat, calidum ferit, & in eo epilepsiā excitat, pallore corpus inficit, odore in humido crasso perennante viuacissimus. Serapio contra scribit, cerebrum calfacere, siccare, roborare.

**V**lpes tota in oleo percocta oleum facit vulpinum.

**C**ancrorum fluuiarium vstorum cineris drachmæ duæ cum drachma vna gentianæ ad morsum canis rabidi datur Actuario, in diacarcino antidoto. Idē Gale. lib. ii. simplic. vbi partibus decē cineris cācrorum addit partes quinque gentianæ, & thuris partem vnā. Cancrorum caro ex lacte, vel lacte ebutyrato cocta, hecticis analectica est.

*Gal. li. 7.  
c. ph. pa.*

**A**Selli sub aquariis vasis delitescētes in vase fictili super prunas tosti donec albescant, triti melle cocto excepti dātur mistri mensura (trium cochlearium Aet.) ante cibum in spirandi difficultate ab Asclepiade,



tanquam extenuandi & digerendi facultate præditi. Qua verò notione ad ipsorum nomen venerit, explicatu difficile est.

Oleum decoctionis eorundem capiti per-  
fusum dolorem eius diuturnum à frigore cōpha. p.  
at crassis humoribus sanat.

Antharides probatur in frumento in-  
cunctæ, versicolores, & quæ luteas in alis  
transuersas habent lineas, corpore promif-  
so, crasso, blattarum modo prapingues, in-  
ertes, ac imbecillæ: quæ vnius sunt coloris.  
necantur vapore aceti per lineum vasis, in  
quo sunt, operimentum. Toris vitur Gale-  
us ad psoras, lepras. Hippocrates caput &  
edes aufert, libro de foeminarum morbis.  
Hæ vesicam vlcérant sole, vreticis autem  
salubriter miscentur.

*Libr. II.  
simpl.  
Gale. in  
theriace  
ad Pison.*

**M**εαξα ὤμυ Aët. id est, Sericum crudum,  
minutim concisum, tritum, spiritum  
& sanguinem purgare, virtutem vitale ro-  
porare creditur Serapioni & aliis: eius infusi  
expressum idem præstat, ut ostendit diacoc-  
con compositio. Sericum propriè quod ar-  
borum foliis Seres Scythiæ populi depexe-  
bant ad vestes, Greci recetiores etiam ad serum,  
id est, bomicum vermium fila transtulerunt:  
quæ etiam Setæ à setarum equinarum forma dici  
possunt. Gosopium autem est coto dictus  
Bomba

*Cōfectio  
alkermes*



Bombasa Italica. Sericum putat Musa frigidum, ut folia mori, quibus vermes nascuntur, nec roborare cor cum Serapione & Aui-cenna, quia inodorum est. Chermes idem ex herbae funilis bipinnellae radice excauata capi in Polonia saepe, rem a cocco baphico diuersam, quo chermesinus color flori-dustingitur, non autem cocco: tingitur au-tem cum alumine, galla, & aliis, ob id pan-nus ille non capiendus, sed potius coccus, quae Arabes Chermes vocant. Coccus astringit, abortum prohibet.

*Lib. 6. cō.*

*ph. p.*

*Gal. 4. 6.*

*ph. p.*

**C**inis recens hirundinum in diabesasa recipitur. Pulli hirundinum cum pen-nis in fistili super prunas vsti diachelidoniū stomachicum ad anginas Andromacho faciunt apud Galenum. Hirundinum ster-cus acris & digerēs, ut aliorum animalium, magis, minus.

**Βλάττιον & βλάττιον βύχρον** appellatur Actuario in aurea Alexandria diamargarito cali. 10. Vnguis odoratus vel aromaticus, lib. 1. comp. ph. p. conchylij tegumen-tum odore in castorium quadantenus incli-nante suffitus gratia adhibetur, Dios.

**V**Niones seu Margaritae velluntur ex quodam concharum genere, leui, mi-nimos ex myculorum conchis extrahi. Cor-roborare, & putredini circa ipsum resistere cred.



credūtur, frigidi ficci. Ob hæc remediis imbecillorū febricitantiū, pestilentiū, miscentur integri poriores his, quos ars pertrudit.

**V**iperarum caro ficit, valenter digerit, *Lib. II. simpl.* mediocriter calfacit. Vis ei<sup>9</sup> ad cutim properat, & ad eā expellit corporis excrementa, à quibus in multum cacochymis ingens numerus pelliculorū prouenit, & à cute velut squāma abscedit, & decidit epidermis, ad quā protrusi sistantur craffi & terroffi humores, à quibus psoræ, lepræ, elephantes nascuntur. De his plura in theriace dicemus.

Ex prædictis aromata sunt, amomū, cinnamomum, calia, calamus odoratus, nardus Gallica & Indica: partes balsami, crocus foliū, foliū malabathri, ladanū, aspalathū, id est, xylaloë, macer. Ad sunt recentiores tanquā pretiosissima, ambrā, vngue odoratum, caphurā, cubebas, doronicū, galāgam, caryophylla, moschum, macis, nucem moschatam, santalū triplex, cornu monocerotis, zedoariam. In his quæ odorata magis sint, in suo genere præstantiora censentur, vt Galenus in antidotis. Sapore autem si explorabis, ne multa continenter gusta, sed vel os interea ablue, vel papyrū mande, vel tēpus interpone, donec prioris aromatis sapor exoleuerit, vt nō prioris reliquæ indicium tibi falsum afferat posterioris aromatis.

Hæc



Hæc cum sint essentia tenuis, celerius exanimantur, præsertim aëre calido, parum fideliter operculata & inuoluta, aut etiã iam comminuta. Ob id vtenda cum vegetissima sunt, nondum verò cariosa, foraminulenta, exoluta, & emortua.

Ex his item purgatoria sunt, Agaricus, colocynthis, cucumer agrestis, elleborus vterque, tithymalli, & alia multa lactaria, daphnoides, opopanax, polypodium, sagapenum, sarcocolla, dracunculus scammonium: & quæ Arabes ac neoterici addiderunt, euphorbium (huic enim nec Dioscorides, nec Galenus vim purgatricem tribuunt) cassia fistula myrobalanus quintuplex, hermodactyli, lapis Armenus Alexandro Tralliano, & cyaneus, manna, rhabarbarum, tamar Indi, turbith, senna & alia quædam Mesuræ tradita.

Hæc autem purgatoria quàm prædicta omnia maiore cura & studio deligenda, reponenda, nec ita diu seruanda, vt deteriora euaserint. Ad hæc quæ in horum quibusdã vis est malefica & vehementior, est mitiganda.

Ablutione, in Aloë & cæteris.

Formatione in Trochiscos, in Agarico, colocynthide, Sagapeno.

Infusione, in Myrobalanis omnibus.

Colt



Cottione, in Malo cydonio & maza in Scammonio: in malo citreo & maza in Euphorbio.

Mistis aromatibus, ut spica nardi cum Rhabbaro, quam si omiseris cum Medicis Parisiis, nihil peccaueris, quod satis sit mihi Rhabbarum, nec Spicæ viribus magnoperè egeat. Turbith, zinzibere, vel spica, vel mastiche: hæc enim malefica omnia corrigunt.

Assatione, aut ficatione in sole, in squilla. Iure Capi vel Galli veteris, vel vino musteo, in Senna, Polypodio.

Sorbitione aliqua medicamenti, præsertim valentioris, reliquias detergente & extrudente, ut iusculo carniū, pisorum, aqua hordei mellita vel saccharata, vino, oleo, in cucumere agresti, & scammoniatis.

Alia in his mitiora domari non postulant, nisi si quando morbum aliquem corporis auctura videntur: ob id cassiæ fistulæ in fluore alui miscetur mastiche, vel aliud stomachicum.

Tamar Indis in vetriculi intemperie frigida miscemus calida stomachica. De his omnibus plura toto propè lib. 2.

Cætera ad purgantium medicamentorum naturam pertinentia fusius hic eram declaraturus, nisi Ioānes Tagaultius Parisiis Do-



Ator Medicus longè doctissimus, eam ipsam operam ex Mesue, & aliis eius rei peritioribus nobis diligenter contulisset.

Simplicia alia Dioscoridis, Galeni, & aliorum plurima, hodie parum cognita, fecissem notiora & certiora, nisi hac gloria merita Gulielmum Pelisserium Episcopum Monpessulanensem, doctissimum, diligentissimum, integerrimum, fraudare non

luissem. Adde quòd ea hoc loco potissimum tractanda

censui, quæ in describendas postea

compo-

sitiones frequentius recipiuntur,

ut ex cognitis simplicium

viribus, totius facul-


tatem lector

intelli-

gat.

F I N I S.





METHODVS MEDICAMENTA COM-  
PONENDI,

*et ab alijs composita expendendi ac  
iudicandi, quibus affectibus me-  
deantur, et an quod titu-  
lu pollicentur, præ-  
stare possint.*

LIBER I I.



OMINES cum simus, errare non est difficile. Hinc Archigenes priorum errata quædam coarguit, & Galenus Archigenis. De Galeno autem dicere ausim, quod is de Hippocrat. passim inculcat, scriptum scilicet esse ab eo nihil perperam. Nos verò Galeni umbram vixdum assequutos, medicorum propè reliquorum conditionem subire non fuerit mirum: sed lectorem rogamus, ut quicquid laude dignum in his laboribus nostris commendarit, Galeno præcipuè tribuat, vitia autem nostro assuat capiti. Quanquam si quid iudico, aut nulla sint, aut perpauca, & quæ nos fugerunt: nisi nasutus aliquis calumniatur, multa sæpe hîc exempla cõgeri, nulla vel utilitate, vel necessitate: interdum



ea desiderari. Præter hæc illa passim nõ magis coherere, quàm sine calce arenas. Sed id vitio non verterit, si institutum nostrũ intellexerit fuisse, vt hæc tanquàm idonea rei propositæ testimonia etiam vt in manũ venirent scriberemus: aliquando tamen ordine certo digessimus, vbi ordini erat locus. Neq; enim Hippocratis Epidemia, tãquàm scopas dissolutas, sparsa & interhiantia exēpla quisquam damnarit, ex quibus tamē ille tam diuinos excerpfit aphorismos, & prognostica medico maximè necessaria. Quomodò ex his exemplis nostris vniuersalia illa theoremata ad componendi rationē maximè necessaria colligere possis, aut hæc per illa inducendi methodo cōprobare. Quòd si non videantur ad plenum absoluta, quæ ad medicamenta componendi methodum pertinet, cum anni posteriores docta & elaborata magis afferre consueuerint, tum virorum doctorum animaduersionibus admoniti, tum iudicio lectione Galeni plurima firmando, meliora aliquãdo reddemus.

Methodus verò medicamenta cōponendi hunc habet scopum, vt si quando librum consuetorum nobis medicamentorũ compositiones scriptas cōtinentē perdiderimus, perditis similia possimus cōponere, ex formula quadã mutationis ad propositi inuentionem




tionem nobis cognita, quam multis particularibus compositionibus exercuerimus. Non modò autem rectè pharmaca componere docet hæc methodus, sed etiã præstat, ut quæ à veteribus medicis sunt scripta composita medicamenta, promptè expēdamus, & his omnibus etiam citra limitationē pronuntiatis, commodè utamur. Melius enim est, maiorum experimentis probata medicamenta à nobis sumi rationē his utēdi scientibus. Empirici verò cū ignorent, qua ratione composita sint pharmaca singula, perditis descriptionibus, alia componere non possunt. Quòd si naturam scirēt affectuum curandorum & eorum magnitudinem, & methodū cognoscerēt inueniendi vires simplicium medicamentorū, & curationis scopum, nō desiderarent modum curationis & compositionis. Hunc autē laborem eo nomine sumpsimus, ut Galenū à calumnia liberaremus, quem falsò insimulant siues quidam stolidi, quòd operibus de cōpositione medicamentorū κατὰ τὸ πρῶτον, καὶ κατὰ γένος, catalogū tantū compositorū à se & aliis medicamentorū recenscat, sed cōponēdi rationē nusquàm libris prædictis tradat. Probamus enim hanc methodum ceu animam quandā locis probè omnibus interspersam. Quam rē ut tibi verissimā esse magis per-



suadeas, loca indidē signauimus hīc quā  
plurima: addidimusq; libros illos Galeni, si  
quis identidē relegerit, esse dignissimos, qui  
a medicis in vsu frequentiore habeātur. Ex  
his item & aliis non paucis probauimus ali  
quando, neq; Galenum fuisse, neq; Galeni  
studiosos esse operū Medicorum, seu, vt cū  
illis loquar, praxis imperitos: quod vitium  
Arabistæ quidā impostores Medici nomine  
indignissimi, & Galeno, & Galeni familiæ  
impingunt: idq; imperitis quibusdam phar  
macopœis persuadent eò facilius, quòd illi  
Galenicas schedas ferè auersentur: quia ve  
terū more scribantur, hoc est, purius, & bre  
uius, & quantū fieri potest, paucissimis sim  
plicibus constantes. Illi verò lucri helluones  
nihil de ægrorum salute solliciti, ea tantū  
laudant Medicorū rescripta, quæ sumptuo  
sa sunt ac pretiosa: ob id quòd magna simpli  
cium idem pollentiū turba sunt coagmen  
tata: quod Arabistarum istorum publicum  
est vitium, ægris sæpe noxium, semper sum  
ptuosum, nota certè Censoria, aut paulò se  
neriore alia castigandum: ea etiam ratione,  
quòd Auicennæ sui principis dogma dese  
runt, imperantis parsimoniam medicamen  
torum potiùs quā multitudinem, vbi vni  
cus est nobis scopus, nec multi affectus com  
plicati.

Medica





**M**EDICAMENTVM est, qđ cor- *Initio sim*  
poris nostri naturā alterare po- *plic.*  
test ac immutare prima, secunda, *In lib. sa-*  
tertia, quarta facultate, seu rota *mi. tuend.*  
sua substantia, idq; ad sanitatem faciendam  
(nam ad tutandam medicamentis opus ne-  
quaquam est) siue ipsum sumatur, siue ad-  
moueat. Medicamenti verò significa- *Li. 3. tem*  
tionē hoc loco minùs latè fundimus, quàm *peramet.*  
Galenus, pharmaci etiam deleteria comple-  
ctentis, quæ nemo rectè medicamēta voca-  
rit, nisi si quando illorum quædam castiga-  
ta & aliis mista vim ipsorum obtundenti-  
bus corpori admoueantur, & quædam ho-  
rum etiam in corpus recipiantur: quod in  
compositis medicamentis audies. Simplex  
medicamentum, cui nulla alia substantia  
opera nostra accessit: compositum verò, cui  
accessit.

Compositio medicamentorum est ipso- *Li. 1. phy.*  
rum viribus variorum cum ratione à Me- *lib. 1. ali-*  
dico facta mistio. Qualis naturæ in re ea- *ment.*  
dem per frequens cernitur, cū pauca liceat *Lib. 2. sim.*  
inuenire non medicamenta solū, sed etiā *c. 13.*  
alimenta, quæ substantiis pluribus, sed fin-  
gulis elementa quatuor sortitis non con-  
stent, iisq; natura diuersis, & plerunq; etiam  
contrariis: vt in aloë substantia est vna ter-  
rea, crassa, cruda, frigida, astringens: altera



*Lib. 4. fa-  
nit. tuen.*

terrea quidē, sed calore interno multū tenuata, amara, calida, cholagoga: sic in Rhabbaro, Alumine, Chalcātho, Chalciti substantiæ insunt duæ cōtrariæ. In Rosa, Agarico, & aliis permultis etiā tres: sunt & quibus quatuor naturæ insunt. Caterū hæc omnia Medici vocare simplicia consueverunt, quemadmodū & quædam verè composita, sed quæ paucioribus constant simplicibus, quā alia eiusdem generis cōposita. Hac ratione dia trion pipereon simplex Galeno dicitur, quanvis cōstet trium pipereonana drachmis quinquaginta, & anisi, thymi ana drachmis octo. Minus idem fuerit simplex, si zinziberis etiā drach. octo recipiat. Compositius quoq; fuerit, si horum trium pondus duplum, hoc est, drachm. sexdecim recipit. Præter quæ omnia quod cōpositum dicitur, etiā recipit ami, seseli, libysticū, enulam, spicam nardi, casia, & alia id genus, quæ ipsum vehemēter medicamētosum reddūt. Sic Actuarius & practicus Oxymeli simplex & cōpositum, Oxosacchar simplex & compositū, & alia permulta eadē ratione dicuntur. Quomodo opinor, vena, arteria, musculus, Gale. lib. de differentiis morborū partes vocātur simplices & primæ, cū reuera sint cōpositæ vena & arteria ex fibris & membranis, Gal. lib. de inæquali intemperie: musculus



sculus ex carne simplici, fibris neruorum & ligamētorum, venis, arteriis, tunica, Gal. de motu musculorum, & in anatomicis passim. Sed ex paucissimis cōpositæ partes dictæ, simplices videri queant, maximè cōpositis organis collatæ. Simplicia igitur medicamenta propriè vocamus, quibus mistio nulla à nobis accessit, etiam si sint ex substantiis natura diuersis cōposita. Quæ verò minus à nobis cōposita sunt, catachresticos etiam simplicia vocamus. Cōposita enim medicamenta nobis hoc loco vocantur, quæ minister naturæ Medicus, ac imitator ex variis simplicibus diuersa pol- lentibus commiscuit: non quidem tota per tota (id enim naturæ solius, ac Dei munus est) sed per partium minimarum viciniam, & contactum nonnunquàm tam exactum, præsertim cōctione longa, sed blanda, & veluti totius fermentatione, vt à vera mistione parum absit: mirum ni etiam à nobis mista quædam ægrius separētur, quàm aliqua vi naturæ confusa, vt in lacte, & ha barbaro. Aloë, & plerisq; aliis videre licet. Nec abs re addidimus, miscēda esse viribus diuersa, nō autem quæ idem possunt. Quod etiam hodie celebribus medicis in consuetudine est, quum id ad sumptuum magnitudinem magis sit, & remediorum multitudinis osten-



tationem, quàm agrorum salutē, aut compositionis vsum. Sed id vitij non recipiendum esse, post abur. De docebimus: simulq; excusabimus celebres illos ac priscos Medicos, si quando in eum errorem incidisse videbuntur.

Dicamus iam quę maioribus nostris fuit medicamenta componendi non dico vtilitas, sed necessitas. Deinde quę medicamenta tam sumenda quàm ad mouenda methodo certa, composituro sint necessaria. Post hæc, in quibus medicamenta componendi ratio consistat. Præterea exemplis aliquot celebribus vniuersalem hanc methodum exercebimus. Postremo, qua ratione quis rectè compositis vti queat, perstringemus.

**M**edicamenta cōponere Medici sunt coacti multis de causis, quas singulatim percensere visum est, vt lector diligēs nihil hanc in rē commodū desiderare possit.

Vt remedia inueniēdi prima indicatio ab affectu ipso præter naturam sumitur, sic ab eodē prima componendi medicamēta ratio est profecta. Si enim solis simplicibus medicamētis omnes affect<sup>9</sup> præter naturā curare liceret, nullus vnquam vsus foret cōposito-  
rū. Simplex verò affectus simplicē exhibet  
indi

*Libr. I. c.  
ph. g.*



indicationem, cōplexus compositam. Quòd si vno simplici remedio præsente affectum simplicem curare possumus, id adhibemus compositione neglecta. Si vero id simplex quod nobis ad manum est, valentius aut inuolius, quàm affectui cōuenit, aut colore, odore, sapore, consistentia, vel aliis post dicendis, à scopo nobis proposito est alienū: mitionis iam insurgit necessitas eorū, quæ vires minuant, vel augeāt, vel coloris, odoris, saporis, cōsistentiæ absurditatē corrigāt.

Dux igitur primæ & principales causæ compositionis videntur, affectuum naturæ contrariorum complicatio, & simplicium tam simplicem quàm complexum affectum expugnatorum penuria, & præter has temperatura, partis figura, situs, sensus, aëris natura. Vt si affectus sit intēperies totius vel partis vno gradu calidior, vno gradu frigidiora, vt profligaretur, postularet: haberet autem fortè ad manum Medicus tantū duo simplicia, vnum temperatum, & ob id imbecillius: alterum secundo gradu frigidum, idemq; valentius, quàm proposito affectui conueniret: vtriusque æqua portione mista medicamentum fecit frigidum primo ordine, malo præsenti idoneum. Quomodo vinum per se sitim non extinguat, quia calidum: nec acetum, quia siccum: nec aqua

*Exemplū  
necessaria  
compositio  
nis morbo  
similari.*

*Li. I. simp-  
plic. c. 3.*



*In organi  
coli. 2. ad  
Glaucōnē  
in com-  
muni.*

aqua per se, quia tardiùs permeat & distri-  
buitur: mista autem aqua alterutri horum  
certa proportione, sitim probè extinguit.  
Nam hæc vini caliditatem, & aceti siccita-  
tem sua frigidityte & humiditate corrigit.  
Tam vinum autem quàm acetum essentię  
suæ tenuitate ipsi aquæ celeritatem & per-  
meandi promptitudinem impertit. In œde-  
mate pituitam, quæ in partem affluxit oxy-  
cratum ex spongia admotum vacuat, quo-  
rum nullum per se id præstiterit.

Cùm vlcus cauū curaturus habet solum  
ceram siue ceratum, & æruginem, non etiā  
thus, irim, aristolochiam, farinam erui, radi-  
cē panacis, & alia vlceri cauo idonea. Cera  
autem & per se, & magis etiam cum oleo  
Rhodino in ceratum liquidius effusa, vlcus  
facit sordidū, quia nec terget, nec siccat, quæ  
duo carni gignēdæ ad vlceris cavitatē im-  
plendā sunt necessaria. Aerugo autem sola  
erodendo & exedēdo, vlcus magis cauat, &  
phlegmonem excitat: vtrūq; ergo per se vi-  
tandum est, ac ex ambobus misturam cera  
valētiorē, ærugine imbecilliorē facimus.

*Libro 1. c  
phar. gen.  
et lib. 3.  
meth.*

Sed quoniā ceratum paulò est inferius ido-  
neo sarcotico, ærugo autem multo valen-  
tior, multo illi cerato, vt libię vni, liquidiori  
modicam æruginem, vt partem decimam  
vel duodecimam, hoc est, vnciam, pro cor-  
poris



poris differentiis miscebimus. Nam cuiusq;  
 quantitas ante exprientiam à nemine inue-  
 niri potest, coniectura tamen iudicari po-  
 test, vt primam experientiam nullus valde  
 infauftus fequatur euentus. Pars verò ærugi-  
 nis decima acrius medicamentum facit, ob  
 id est idoneum carni gignendæ in corpori-  
 bus validioribus, duris, siccis temperamēto,  
 vt agricolarum, nautarum, venatorū. Duo-  
 decima imbecillioribus & mollibus vel na-  
 tura, vel victus consuetudine, & humidis, &  
 candidis corporibus, qualia sunt mulierum,  
 eunuchorum, puerorum conuenit.

In quo exemplo simplicia vtraq; & inter  
 se sunt maximè contraria, & affectui per se  
 sunt nocētissima: mista tamen quo dixi mo-  
 do, sarcoticum, colleticum, & epuloticum  
 efficiunt præstantissimum, quale etiam est  
 dia chalciticos Galeni: cū cera per se, mul-  
 tō magis adep̃s, atq; adeò oleū ipsum ob hu-  
 miditatem multam & lentorem in vlcere  
 sordem cumulet, & chalcitis siccior, acrior,  
 erodentior cavitatem augeat. Optima verò  
 medicamenta maiores ex contrariis miscue-  
 runt ratione ipsa monstrante viam, & com-  
 positionem inueniente: de cuius virtute ex-  
 perientia posterior decernit. In hoc autem  
 & aliis propè omnibus medium est paran-  
 dum potius, ceu ad mediam temperaturam  
 apta



aptatum: ad temperaturas verò vtrunque à media recedentes, si vires medicamenti sint imbecilliores, augenda est ærugo vel chalcitis, & si vis, mel addendum: si validiores, ærugo chalcitisque minuenda magis & minus pro effecti eius portione, vel augendum ceratum, adeps, & cætera. Coniecturam etiam tuam vsus & experientia docebunt. Si enim carne impletur, bonum: si sorde, est infirmius: si cauum magis sit, & erosionis sensum æger sentit, ac pars calidior, rubetior, tumentior apparet, est valentius: & in aliis eadem ratione compositis idem faciendum, vt post fusius audies.

Est etiam cùm affectus emplaston medicamentum exigit, qualem consistentiam cùm nullum simplex medicamentum per se facere possit (non enim bitumen, non cera, non resina, non pix, non propolis, non ladanum talem vsu præbent, multò minùs ærugo, cerussa, litha. zyros, molybdena, vel aliud metallicum, nec herbae etiã solæ emplaston medicamentum faciunt) mistura opus fuit, vt simplicia in vsu hoc esse possent, alioqui ob conditionem suam & naturã in id inepta. Propterea primi emplastro rum autores ratione optima, ex oleo quoque metallica coxerunt, & liquabilia liquefecerunt,



runt, & herbas contusas, & cretas adiecerunt.

Quædã prætereà cõponimus affectui præ-  
senti contraria ex naturæ imitatione, cuius  
ritè agentis Medicus perpetuò est minister,  
vt clysterem in aluo astricta ex hydromeli-  
te & oleo, interdum ex oleo solo cum sa-  
le componimus, in quibus durum siccita-  
te stercus emolliendi, id est humectandi, est  
facultas: deinde viæ ipsius per intestina oleo  
lubricandæ ad liberiores descensum: po-  
stremò aut mel aut sal mordendo: expultri-  
cem ad opus suum excitat, vt bilis flaua in  
sanis corporibus stercore mista. Tales sunt  
crebri clysteres Gal. in libro sanit. tuendæ, &  
therapeuticis: horumq; ratio ea redditur A-  
phrodiseo in problematis. Huc pertinet,  
quòd multis simplicibus etiam curãdo affe-  
ctui simplici vel cõposito idoneis, sæpe fa-  
cultates aliæ insunt affectui noxiæ: cùm ra-  
rum sit simplex medicamentum, quod ex  
variis substantiis, & sæpe contrariis non sit  
temperatum. Quo casu eas mistione alio-  
rum inducimus: sic scāmōnio, cholagogo  
alia miscemus frigida, crassa, astringentia,  
partes principes roborantia, vt calori, tenui-  
tati, dissolutioni, partium principum noxiæ  
à scammonio imminenti occurramus.

Sic opium castorio, hyoscyamum allio,  
cepa, semine raphani, madragoræ corti-  
cem



cem absinthio, sinapi, frigida scilicet calidis obtundimus: & in theriace, mithridatio, aliisque multis similiter.

Secundo loco medicamentorum compositionis usus est maximus, in affectibus complexis diuersas simul facultates interdum contrarias desiderantibus, ut repellendi simul & digerendi, incrassandi & tenuandi, incidendi, tenuandi, tergend, qualia sunt multa composita polychresta, ut theriace, mithridatios, & alia non pauca.

Si est igitur hydrops frigidus humidus affectus cum febre calido sicco morbo implexus, vtriusque per sibi contraria remedia est habenda ratio, si æquè pollent, si alterutrum magis vrgeat, illi attentiùs prospiciendum, altero tamen affectu interea non neglecto. Sic vbi vlcus est cum phlegmone quæ hanc curant refrigerantia, vlcus mordent, & insuppurabile reddunt: quæ verò vlcus tergent siccantq; phlegmonem exacerbant. Componendum igitur fuit medicamentum, in quo vtriusq; talis habeatur ratio, ut neutri magnoperè incommodetur: sed tamen eo casu phlegmones maior est habenda ratio, quippe citra cuius curationem vlcus nunquam sanaueris. Idem statuendum est, vbi affectus causa adhuc præses in corpore, & ipse affectus, naturæ sunt diuersæ: ut in  
quot



quotidianis & quartanis febribus causa est materia frigida, morbus calidus: vtriusque enim habenda est ratio, sed maior vrgentioris. Composito etiam medicamento sepe opus, cum morbi eiusdem permultae sunt causae: vt si succus & multus, & crassus, & lentus faciat obstructionem: crasso tenuans, lento incidens & tergens, & fluxile reddens, multo vacuans contrarium debetur. Quae omnes facultates cum raro in vno sint medicamento, simplicibus multis simul mistis perficienda fuerunt. Sin cum venena calida simul & frigida sunt expellenda de corpore, vel aduersus haec corpus est muniendum. Qua etiam de causa theriace multum contrariis est commista.

Exercere sese potest quisque exēplis plurimis per omnes affectus naturae diuersae complicatos, vt intemperies partium magnarum, aut etiam principum inaequales, siue materia & cum humoribus, simplices & compositas: vt incommoderationum differentias sibi connexas, vt solutionis continui species secum compositas, ve etiam cum aliis praedictis morborum generibus.

Si vero naturae sint eiusdem affectus, vt causa & morbus calida (vt in tertianis) vt in temperies calida ventriculi, & hepatis, & partium vicinarum: minus est necesse compo-



sito uti, si ad manum est quod refrigerare quātum affectus ipse postulat & partis natura, ut ad iustam temperiem reducat.

Qui igitur primi composuerūt medica-  
*Lib. 2. cō.* mēta propria & familiaria aduersus impa-  
*ph. part.* ctam partis alicuius angustis meatibus ma-  
 teriam, ut humorem crassum & lentum, in-  
 terdum etiam spiritum flatulētum & vapo-  
 rosum ad curationem longius tēpus requi-  
 rentem, eguerunt varia medicamentorum  
 missione, quorum quādam impactam ma-  
 teriam tenuent, & meatus dilatent, per quos  
 materia illa excernatur: alia partem affe-  
 ctam robovent, ne talem materiam aut gi-  
 gnat, aut aliunde recipiat, & ut quod exte-  
 nuatum est excernat, impactum coquat &  
 tenuet: alia quæ substantiam affluentem re-  
 pellant: alia quæ receptam coquāt, alia dis-  
*Ap. 52.* cutiant. Quod si singulis eis effectis peculia-  
*libro 2.* re habes compositum medicamentum in  
 affectibus curatu difficilibus, secūdam Hip-  
 pocratis consilium inspice, in quōnam ho-  
 rum medicamentū simplex calidum sit co-  
 piosius, & in quo frigidum humidum sic-  
 cum, aut tenuium partium, aut crassarum:  
 deinde ex successu remedij loco affecto  
 prius admoti, cōiecta an in eodem perseue-  
 randum sit, vel ad aliud transeundum, etiam  
 eorum quæ idem pollicentur, vel ambo  
 miscen



miscenda, vt medium quodammodo facias.

Tertia causa componendi medicamenta fuit totius corporis natura, & partiũ ad quas ea ferri volumus, & per quas trāsitura sunt: vt si habeo medicamentum liberandæ obstructioni idoneum, ea autem est in liene, aut hepate, aut renibus, miscēda sunt liquida, tenuia, & totius substantiæ similitudine ipsi parti familiaria, quæ medicamentum, aut medicamenti facultatem ad partes deducant, easque robovent, si robore pars ipsa egebit, ob actionis præstantiam: vt eupatorium hepaticis, asplenium splenicis, nephriticis cestron aut cicer miscēdum: de quibus postea: si stœchas agarico mista pituitæ ex cerebro purgationem iuuat, hyssopus verò ex thorace. Præterea naturarum quædam proprietas hac vel illa compositione recreata, ab alia abhorrens, composito nos vti sæpe coëgit: & item coloris, odoris, ac potissimum saporis gratia, & studium seruandæ diu missionis.

Tres hæ causæ necessitatis componendorum medicamentorum sufficere possunt, sumptæ ex natura & affectus, & corporis affecti, & medicamenti affectũ illum in hoc corpore sanaturi. Quæ verò minores sunt compositionis vtilitates, plurimæ ex aliis indicationum differentiis sumen-



- Lib. 2. cō.* *ph. gen.* dæ, in ratione componendi dicentur. Præter quas omnes vna hæc maxima est, vt compositis tibi cōsuetis, amissis similia reponas: vtq; compositionis rationem in compositis veterum agnoscas, & quorundā ipsorū facultates ab illis non definitas inuenias, aut etiā falso adscriptas refellas. Cognitis enim simplicium facultatibus & qualitatibus, poteris
- Lib. 1. cō.* *ph. part.* virtutem compositorum à veteribus medicamentorum inuenire, & similia cōponere. Hinc etiam cognosces affectus corpori ex medicamento successuros, & prænosces: & his iam factis atq; facile cognitis, remedia idonea inuenies ratione compositionis inuentrice, cuius facultas experiētia probāda est, quamuis ante hanc coniectura quoq; artificiosa colligatur: vt si corpora sicca sunt & valida, valētius medicamentum posse sustinere confidis: si imbecilliora & molliora vel natura vel victus ratione sint, ea nō ferent. Sic cū à pulmonibus & thorace materiā crassam lentam expectorare oportet, potu largiore opus est, atque liquidioribus eclegmaris vtendis inter medicamenta arteriaca, siue illa sint acria & mordacia vehemēter ex aro, pipere, casia, cinnamomo, galbano, resina terebinthina, & aliis eius generis incidentibus, & tenuantibus, & tergentibus: siue tantū moderatē tergentibus consistent



stent cremore prissanæ, amygdalis. Nā quæ emplastica sunt exactè, & morsus expertia, ex passo Cretico, gummi, tragacantho, glycyrrhiza, arteriæ asperitates tantùm lauigant, non etiam expectorant.

**N**Vnc mihi dicenda sunt quæ composi-  
turo certa methodo medicamēta sint  
cognoscēda, illa nimirū tria: affect⁹ omnes  
corporis præter naturam, in quos medica-  
mēta componimus corporis ipsius natura,  
sine qua nec affectus illos ad vnguem nos-  
se, nec probè & tutò vti medicamēto queas:  
tertio simplicium omniū medicamentorū  
facultates pernoscendæ sunt, primæ, secūde,  
tertiæ, quartæ, id est, causæ medicamento-  
rum effectrices, seu naturales quædam eo-  
rum potentia corpus nostrum immutātes.  
Nam cū primus & præcipuus cōponendi  
medicamēti scopus sit affectus præter natu-  
ram, nullo simplici remedio curabilis, illius  
tota natura tanquā vngues & digiti cogni-  
tissima esse debet: si calidus scilicet, aut fri-  
gidus, humidus aut siccus, vel horum cōiu-  
gatione intemperatus, & quoto ordine est  
vnusquisq; talis. Item si cū materia vel sine  
materia, si causam habet desitam vel adhuc  
præsentem, & eam vel hecticam vel scheti-  
cam: adhuc si profundus est morbus vel

*Libr. i. c.  
ph. g. &  
initio. lib.  
6. c. ph. p.*



sublimis, propè partem momētaneā vel lō-  
gè ab ea, & alia propè innumerabilia, par-  
tim pōst dicenda in ratione cōponendi, par-  
tim ex curandi indicationibus sumenda.

Quòd si natura affectus incognita vel ne-  
glecta aduersus ipsū medicamēta cōponis,  
cū scopo certo cōpositionis careas, illi es  
similis, qui oculis clausis telum, quò fortuna  
feret, emittit. Is enim vt scopū vel nūquam  
vel rarissimè, idq; fortuito, attinget: sic me-  
dicamentum in hunc affectum exactè non  
cognitum si componis, illum vix vnquā sa-  
naueris: mirum ni etiam plurimum auxeris,  
cū medicamēta sint rara, quæ nec prosint,  
nec ob sint, sed ferè salubria sint, aut in salu-  
bria: paucissima, & rarò neutra. Se igitur q̄s-  
quis est medicinæ studiosus, diligēter exer-  
ceat in morborū, causarum, symptomatum  
cognitione, vt perspecta horū cuiusq; natu-  
ra, statim concipiat ex theoremate illo Hip-  
pocratico contraria contrariorum remedia,  
quo genere remediorum sit opus, calidōne  
an frigido, humido vel sicco, tenuante aut  
incrassante, molliente vel durante, vel alio  
reliquorum similiū. Deinde in ipsis simpli-  
cibus tanquā promptuario longè vberri-  
mo & copię cornu plenissimo, summa cura, præ-  
cipuòq; studio vestiget, quæ quibus affecti-  
bus sunt, quantū opus est, cōtraria. Id quod  
si in

*Lib. de fla-  
tibus.*



si in vno aliquo nō inest, duobus aut pluribus simul mistis efficiat. In quo studio nemo se vnquā feliciter geret, cui simplicium omniū natura (vt idē de reliquis salubribus causis tibi persuadeas) nō sit tanquā sua domus cognita. Nam præterquam quod illis simplicibus vti rectē nequeat, neq; etiā possit ex his probē aliquid cōponere, aut aliorū compositis rectē vti: nemo enim cōposito vnquam rectē vtetur, viribus simplicium id componentīū ignoratis: cū illius vires ex horum viribus propē solis sint æstimandæ: quomodo partes in nobis organicę seu cōpositæ, vt rectē vel malē habeāt, id ex similitarium seu simplicīū magnitudine, numero, figura, situ, & cōnexionē accipiūt. Quis igitur pœna non sola ignominia nota dignos non putet, multos huius ætatis Medicos, etiā hominū opinione celebres, qui neglecta simplicīū exquisita obseruatione, cōtenti sunt facultate cōpositi vtcunq; cognita. Illis enim fatis est scire catholicū humores omnes purgare, diaphœnicon bilē flauā, diacnicum pituitam, diasennam succū melancholicum, cocticia catapotia cerebrū, optica oculos: neq; sunt solliciti quibus horum quodq; simplicibus constet, & quanta singulorum mensura: neque curant hi, si vires habeant composita, quas titulo pollicen-



tur. Cùm tamen simplicia sint & natura & tempore priora compositis, & ab illis hæc omnem propemodū habeant facultatē: nisi si qua ex contrariis composita (quorum maxima turba est) facultatem componēdo acquirant non modò diuersam, sed etiam sepe contrariā simplicibus per se vsurpatis, quod in sarcotico ex arugine & oleo, & dia chalciteos emplastro ostēdimus. Adde quòd vis quædam diuersa, sed ferè exigua ex ipsa cōpositionis & nostræ coctionis ratione nonnūquā proficiscitur: magna verò quibusdam ex coctione à mistorum calore nativitatē perfecta, vt in theriace & mithridatio audies. Quæ medicantium consuetudo si recipitur, quid miramur medicinam paucis admodum mensibus percipi? quid miri est, idiotas ad medicinam faciendam conuolare, cū physiologiæ totius, præterea vtriq; sint ignari, vt reliquam quorundam ignorantiam taceam.

Iam patēre cuius arbitror, medicamēta composituro cognitissimū esse affectus curandi, & remedij curantis naturā oportere. Qui enim morbum, ac morbi causam, & vtriq; naturā pernouerit, deinde simplicium medicamentorum omnium, aut saltē plurimorum & vsurpationum vires omnes, in singulis morborum speciebus rectē compon



ponat, & salubriter vtatur, tum simplicibus tum compositis medicamentis, si simul naturas corporū & aëris inspexerit. Mollibus enim & humidis, vt pueris, eunuchis, mulieribus, mitiora debentur medicamēta: duris autem & siccis, vt venatoribus, messoribus, nautis, agricolis, validiora: mediis horum mediocria: & in carne siccavlcus, sicciora: in molli, minus sicca, tam sarcotica quā colletica & epulotica requirit. Et in cognatis cuiq; intemperaturis mitiora, in contrariis valentiora requirūtur, quoto scilicet ordine quisque per morbum à sua natura recessit: & aëre calido minùs calida, & frigido minùs frigida, quā affectus requirit, medicamenta sunt adhibenda, & in reliqua oppositione ad portionem.

Quæ verò ad affectuū præter naturā cognitionem pertinet, hīc audire ne expecta, sed ex lib. de differentiis, & causis morborū & symptomatum, & de signis partiū internarum affectarū, & aliis Hippocratis & Galeni libris huc pertinentibus require. Vti quæ ad cognoscēdam cuiusq; naturā sunt necessaria, ex libris physiologicis repetenda tibi sunt, quorum omnium catalogus in ordine librorum Hipp. & Gal. tibi abundè suppediatur. Quæ autem ad simplicium medicamentorum cognitionē sunt necessaria pau-



lò fusiùs explicabo, ne quid cupido lectori  
desit ad compositionis peritiàm etiã si mul-  
ta satis attigisse tibi Galenus videri possit  
libris quinq; primis simplicium. Ex quibus,  
& aliis aliquot eius locis ad hanc rem ido-  
nea paucis perstringere tibi constituimus.

Noscēda est medicamēti simplicis facul-  
tas quadruplex, prima, secūda, tertia, quarta,  
(à quarum singulis sua prodit actio) & quæ  
medicamēta quibus locis abūdāt, & quibus  
itē locis, atq; cōditionib<sup>9</sup> aliis sūt meliora.

Facultas medicamenti prima reliquarū  
communis est tanquam basis (præterquàm  
quòd quartā iuare nō videatur) ex ipsis ele-  
mentis nullius interuentu prodiens, ipsiq;  
omniū maximè tributa: generatim quidem  
est calfaciendi, refrigerandi, humectādi, sic-  
candi, & per horum coniugationem calfa-  
ciendi, humectandi, calfaciēdi siccādi, refri-  
gerandi humectandi, refrigerandi siccandi.  
Particulatim verò efficiēdi id ipsum in prin-  
cipio, medio, sine ordinis primi, secūdi, ter-  
tij, quarti. Ea verò qua ratione sit tactu &  
gustatu tanquàm tactu quodam exploran-  
da & iudicanda, abundè docet Galenus lib.  
simplicium. Etiam sepe secundas facultates,  
nonnunquàm & tertias: est quādo & quar-  
tas in quibusdam simplicibus profecutus.  
Omnes enim eas recēdere in omnibus ope-  
ros



rosū fuerit: cū etiā permulta sint, quorum facultas tertia parū cognita est, plurimorum quarta adhuc omnino incognita, cognoscenda quibus, quando, quantū Deus voluerit, vt Auēzoar pulchrè dicebat. Satis fuerit (quod ad primas facultates attinet) cognoscere calidū frigidū humidū siccū ordine primo, obscurè: secūdo, manifestè: tertio, vehemēter: quarto summè tactum nostrum & gustatum afficere, idque in horum singulorum ordinū principio medio, fine, sic vt ordines sint 12. medicamentorum tum calidorum, tū frigidorū, tū humidorū, tum siccorum, id est, calidiorū, frigidiorū humidiorum, sicciorū temperato. Noscat etiam Medicus, quæ medicamenta celeriter etiam vbi admota corpori nostro sunt, vel in ipsū recepta, virtutem statim amittant, quæ diu eandē seruant. Vt euphorbiū caducā & statim euandā admotum parti caliditatē habet: aris & alia quæ caliditatē humiditate multa & lēta mersam habēt, tardius eā exerunt, sed diutiū excitatam seruāt. Item euphorbium recens linguā vrit: trimū & quadrimū adhuc vegetū est, annis sequētibus exoluitur: sic Thapsia post annū est admodū imbecilla, bima prorsus exoluitur. Quæ omnia multis Galeni locis tibi clariora simul & credēda magis reddere visū est.

Nisi

*Cap. vlt.*

*Libr. 5.*

*simpl.*

*Libr. 3. c.*

*ph. g.*



*Libr. 7. c.* Nisi quis exactè & distinctè simplicium vi-  
*phar. p.* res noscat, non cognoscit compositum, nec  
 in quali ordine sit efîcax, vtrum scilicet ve-  
 hementissimum vel clementissimum, vel  
 medium, vel inter hæc constitutum, vel si  
 ex contrariis constet.

*Initio li.* Nullus cû ratione & methodo medica-  
*8. c. ph. p.* menta componere, aut compositis vti po-  
 test, nisi simplicium medicamentorum vi-  
 res memoria teneat, & omnium quæ in me-  
 thodo medendi docentur, meminerit.

*Libr. 1. cõ.* Medicus prudēs & peritus noscat naturã  
*ph. 3. et p.* affectuum qui curantur, agri naturã, & me-  
 dicamentorum facultates nō generatim so-  
 lum, sed secundum quantitatem, id est, quã-  
 to recessu calidum, frigidum, humidum, sic-  
 cum, tergens, & cætera: vt quotidie conil-  
 ciat, quali remedio opus est, vt præcedens  
 medicamentũ intendas vel dissolvas, quan-  
 tum affectus requirit: & sic curatio rectè ab-  
 soluitur. Neque enim sufficit nosse hoc cal-  
 faciendi aut refrigerãdi facultatem habere,

*Libr. 1. c.* sed quo recessu, siue quantam habeat eam  
*ph. 8.* facultatem diffinire oportet. Nam resinæ  
 omnes calfaciunt, idq; sibi habent commu-  
 ne: sed maioris & minoris rationem non  
 exiguum sortiuntur, vti & liquores nō pau-  
 ci calfaciūt: sed ὁπὲρ panacis collatione ὁπὲρ  
 Cyrenaïci aut Medici parum calfacit. Ane-  
 thum



thum etiam, ruta, cepa, omnia sunt calida  
 medicamenta, magno tamen inter se variā-  
 tia discrimine. Ob id curandæ parti admo-  
 dum refrigeratæ, multum calida admoue-  
 mus: parum refrigeratæ, modicè calida: infi-  
 guiter refrigeratæ, vehementissimè calida.  
 Proinde quatuor calfacientium, vt refrige-  
 rantium, & humectantium, & siccantium or-  
 dines statuimus, & in his singulis principiū,  
 medium, finem. Itaque sunt ex his quæ ob  
 caloris vim vrunt, vel exulcerant, alia septi-  
 ca, id est, putrefacientia sunt, alia simulatq;  
 corpus attigerunt, suam potestatem osten-  
 dunt: alia horis duabus, tribus, quatuor: alia  
 die vno, alia etiam nocte, vel maiori etiam  
 spatio post applicationem agūt. Hæc quo-  
 que in refrigerantibus, humectantibus, sic-  
 cantibus similiter noscenda ei sunt, qui me-  
 dicamentum probè confecturus est. Quod  
 ob id etiā scitu maximè est vtile, vt si quan-  
 do valentiore medicamēto egebis, ad quod  
 digrediare, cognoscas. Qui autem particulū  
 simpliciter calfaciendam iubet, non magis  
 piper, aut sinapi, quàm thus capiet, eodem  
 modo & in secundis facultatibus, si tergen-  
 dam solum iubet, non magis mel, quàm  
 glycyrrhizam vel aloēn capiet.

Qui medicamenti vim, qua operando  
 iuuat, ignorat, eo rectè vti non potest,

Omni

*Lib. 2. c.*

*ph. g.*

*Initio lib.*

*6. c. § h. p.*



*Initio lib.*  
*7.c.ph.p.* Omnium simplicium medicamentorum facultatis notas habere oportet eū, qui compositum aliquod volet efficere. Idem illis rectè vtetur, quæ alij composuerunt, & indistinctè scripserunt: distinctè autem scriptis melius quàm alij vtetur.

Rationalis enim Medicus pro varia affectuum natura medicamentū mutat. Quam rem is solus præstabit, qui omnium simplicium medicamentorum facultates cognoscit. Solus enim qui omnium simplicium vires nouit, sciet quando hoc vel illo medicamento certo ordine vtendum erit, & quantum id à medio recedere debeat.

*Libr.1.c.*  
*ph.p.* Simplicium facultatibus & qualitatibus cognitis, quisque potest inuenire, qua sint virtute prædita, quæ à veteribus sunt composita, & talia ipse componere, & inde affectus qui medicamentis superueniunt, potest prænosse, & præsentibus succurrere.

Poterit idem solus distinguere, quibus affectionum differentiis remedia sine distinctione scripta conueniunt.

Non satis igitur est nouisse medicamentorum facultatem simpliciter & in genere, vt hoc calfacere, illud refrigerare (quod solum Dioscorides docuit) sed quoto quodque ordine id præstare possit, quod Galenus in plurimis definiuit.

Veter



Veterum quoque Medicorum præstantissimi ipso usu edocti, optimas medicamentorum compositiones effecerunt ex singulorum natura, compositionis artē inueniētes: quæq; intensa qualitatibus ipsis sunt, aliorū mistura remittentes: similiter acria hebetātes, & vt summatim dicam, pro reliqua cuiusq; vitij differentia, & hominum temperie medicamentis artificiosè vtentes.

*Galen. in  
theriaca  
ad Piso.*

Comperta enim morbi cuiusq; natura & differentia temperamenti tum ægri, tum simplicium medicamentorū cognita, sic cōposita præparamus singulis hominibus pro corporis ipsorū statu congrua, & vnicuique morbo contraria. Quandoquidē semper meminēris oportet, omnē qui præter naturam incidit, excessum contrario excessu esse corrigendum: hūcq; omne curationis consilium dirige. Quod si prætereā corporum curandorum naturam noueris, & singulorum remediorum facultates, vniuersæ iam artis peritus es, & valetudinem sanis probè tueberis, & ægrotis pristinū statū restitues.

*Ibidem.*

*Lib. 5. sanit. tuenda.*

Facultas secūda est, quæ primas simplices facultates vel cōiugatas nullius alterius interuētū sequitur, vt facultas molliēdi humectationē primò sequitur: durādi, siccationē: rarefaciēdi, attrahēdi, aperiēdi, tenuādi, calfactionem: densandi, repellendi, claudendi, crass



crassandi, refrigerationem. Vires & qualitates secundas in acerbis, austeris, acidis, dulcibus, salis, amaris, acris, digerentibus, astringentibus, contrahentibus, repellentibus, ex alto trahentibus, referantibus, tergentibus, sensum stupefacientibus, scribit Gal. lib. 3. compo. phar. part.

1. A calfactione igitur procedit actio propinqua, tenuatio crassorum, quæ si liquida sunt, in vaporem tenuando versa, exhalant: interdum intra corpus, & fiunt pituitæ, aquosa, flatus, inflationes, palpitationes, & ceteri affectus similes: interdum foras, vacuaturque halitu vel insensibili vel sensibili, cum sudore. Si verò sicca fuerant crassa, illa quæ tenuantur, aut etiam humida, sed minus exhalantia, tenuioris substantiæ euadunt. Sic ex austeris acida iam tenuia, ex acidis dulcia tenuiora, ex dulcibus salia tenuiora, ex salis amara adhuc tenuiora: omnium post hæc si saporem caloris indicem spectes, tenuissima sunt acria. Sic quæ veterascunt, à suo calore tenuata magis euadunt: sic ex vino acetum, ex lacte coagulum, ex maza fermentum, calore externo corrumpente, tenuiora ut calidiora euadunt: & pſoricū in fine libr. 2. simpl. putrefactione 40. dierum sub fimo fit tenuius: & vnguentum ex nucibus viridibus sub terra putrefactis tribus mensibus, Heras apud



apud Gal. libr. i. comp. ph. part. tenuius efficit. Sic cocta omnia & vsta euadunt tenuiora; sic humores in nobis. crassos caloricis causis salubribus, vt labore, cibo, potu, medicamento calido, aëre calido tenuamus. Tamen si quædā frigida tenuibus partibus prædita, vt acetum, cortex nucum viridium Galeno in diacaryo, caphura recentioribus, & alia quædam vim quandam tenuandi à tota substantia etiam habeant, nisi malis in his frigidis substantiam quandam calidam eandemq; tenuem inesse. Sed crassam aceti partem calidam, tenuē potius frigidam innuit Galen. libr. i. simpl.

2. Calidum deinde fundit & liquat à frigido concreta: paucos quidem, vt niuē, grandinem, glaciem, pituitam in nobis crudam, adipem, resinas, gummi, levis calor fundit: multo autem & diuturno frigore cōcreta, vt succinū, crystallum, metalla multus calor: in metallis tamē magna maioris, minorisq; ratio versatur. Nā plumbū & stannum *Cap. 8.* citissimē, aurum & ferrum tardissimē, æs, & *Li. 5. simplic.* argentum medio inter hæc tempore igni liquantur. Sic scirrhus à frigido cōcretus calidum fundendō velut sub sole emollit.

Idē fundēdo mollit prædicta omnia concretionē à frigido dura, & nostrū corpus: ob id motus leues pulmōni, aut aliis partibus

P



*Lib. 2. fa-  
ut. tuend.* corporis, aut etiã toto corpori ante iustam  
exercitationem ad has partes præmolliẽdas  
imperantur, vt mollitæ, tensioni per motus  
violentos vehementi citra noxã obediant:  
alioqui enim non præmolliat, citoq; ac ve-  
hementer tensæ rumperentur.

Idem fundendo & liquidiora ad motũq;  
promptiora red dendo excrementa, obstru-  
cta liberat, nisi præ copia aut lentore in via  
hæreant. Fluxiones etiã aut excitat, aut ge-  
minat: ob id æstate catarrhi Aph. 21. lib. 3. &  
in diaria ab æstu cap. ultimo lib. 1. feb. & hy-  
pochondriis, calorifica admoueri, & balneũ  
in febris non probè vacuato corpore, &  
viscere aliquo imbecillo prohibet in fine li.

*Aphor. 24  
lib. 1.* 11. Methodi. Ob id etiam in magnis flu-  
xionibus corpore multũ pleno purgatio-  
*Lib. 8. me  
thodi.* nes veremur, ne purgantium medicamento-  
rum (quæ omnia sunt potestate calida) calo-  
*Aphor. 14  
lib. 5. li. 2.  
loc. affect.* re liquatum tenuatumq; excrementum, lar-  
gius in partem affluat, & in diaria à frigore  
cum catarrho vel coryza, interdicitur bal-  
neum ante horum coctionem.

Idem fundendo semen, ac tumefaciendo  
venerem excitat, fundendo sanguinem &  
meatus dilatando sudores, vrinas, menses, hæ-  
morrhoidas ciet. Eadem ratione laxat ten-  
sa & rigida concretione, & quia vacuat, la-  
xat etiam tensa plenitudine. Mobiles enim  
magis



magis non spiritus solos, sed reliquas quoque materias faciat calidum, hinc calido sicco cerebro & spiritu animali natura aut temperamento acquisitio, aut febribus homines sunt vigiles, insomnes, deliri, precipites.

Eadem vi foras ex aqua tepida nervis noxius lib. 6. methodi. quia eorum substantiam, ut aliarum partium nervosarum à frigido concretam dissolvit. Venter item ratione eadem tepida evertit, vomitumque ciet, & usu multo calidum facit nervorum incontinentiam, seu tremorem, & mentis torporem, & carniū effæminationem. Apho. 16. lib. 5.

Idem calor fusa tenuataque; si diutius exercet, digerendo aut aliter vacuando, tandem siccatur: quod ostendunt liquores, succi, gummi, & resina omnis aut vetusta, aut vsta. Eadem ratione medicamenta omnia purgantia, & causæ reliquæ caloricæ emaciant, tum quia vacuant, tum quia calorem nostrum vel augment, vel intendunt: qui maiorem substantiæ nostræ facit dissipationem. Ob id biliosi sunt graciles, & quos calor emaciat, pallidos facit aut nigros, si verò corpus vteuque succulentum est, coloratos sanguine & spiritu cum calore per corpus sparso. Aph. 6. li. 4. & lib. 8. Metho.

Idem præproperè siccando una est causa nostri & senij & interitus acerbi, aut etiā naturalis, quando paulatim læta morte



nostrum consumit humidum substantificum: sed calidi effectum hoc per accidens non primo, pòst dicetur.

3. Calidum rarefecit densa, & poros ac meatus omnes, & capacitates, & ora ipsa tā vasorum quàm aliarum cavitatū aperit, fistulat spiritu calido, & dilatat in prima formatione, & quoties corpus incalescit. Qua ex re fit, vt viris nempe calidioribus omnia hæc sint maiora & latiora quàm fœminis: et quò viri aut fœminæ sunt calidiores, eò sunt meatibus capacioribus: quò minùs calent, astrictioribus. Hinc arteriarū latitudo cordis caliditatem, venarum, hepatis sequitur. Hinc viam facturi calculo vel fœtui calorigica damus sumenda, & apponimus. Hinc sudores æstiuī quamplurimi & balnearum, & calida sunt quæ vrinas, sudores, & menses mouent, & quæ digerunt per rarefacta corpora inter humorem vacuandum & medicamentū digerens constituta. Hæc quidem præstat calor temperatus, aut non ita vehemens. Ardēs verò ac igneus, vt à balneo feruente, cuti incidēs eā claudit & dēfat, quod ille occurſu blādo naturæ est iucundus, eāque ad se suscipiendum inuitat: contrā verò hic acrior, & naturæ grauis est, ob id ab eo fugiens intrò, poros contrahit, ne se hostilis ille calor sequatur: quomodò tātū per accidens

*Gal. in arte medica.*

*Li. 3. sanitæ tuend. & libr. 7. meth.*



cidens densat, vti calore multo ficcatur, vt paulò antè dixi, etiā densum redditur. Hinc clibanus calidior panē vndiq; adurit, intus non coquit, initio alimentorum, & ouum aquæ feruenti immissum vix duratur.

4 Calidum trahit & foras si admotum est, intrò si sumptum est euocat materiam à se tenuatā per meatus à se apertos. Quapropter admotū resoluit ac digerit, sumptum obstructa referat, vacuat, purgat humorem omnem, sed primū sequi paratiorem, deinde alium: nisi etiam substantiæ totius similitudine ac proprietate sibi familiarē non calore solo trahat, qua sola quēdā etiā frigida trahunt ex corpore spicula. Dolores eadem ratione sedat à materiæ qualitate vel quantitate factos. hac materia dolorifica per resolutionē vacuata, ac proinde tumores dissipat. Apophlegmatismis & errhinis eadem vi tractrice calidum est aptum, & quia concreta in cerebro, excrementa liquat. Sic suffitus aromatū muliebria ducit: sic radix cyclamini, & alia nō pauca, vmbilico admota aluum subducunt: ventriculo autē ad vomitum trahunt. Sic trahendo calor immoderatio fluxionis vna est causa: sic partes corporis omnes alimentum sibi familiare trahunt, calore scilicet, sed etiā substantiæ totius similitudine. Sic succinū attritu calfa-

Lib. 2. feb.

cap. 15. &amp;

lib. meth.

11. &amp; 13.



Li. II. me-  
tho. & A-  
pb. 33. li. 6

Etum citius & potentiùs trahit paleã, papy-  
rum, & alia leuia & minuta. Sic sol, & alia  
corpora cœlestia in mediam regionem aë-  
ris trahunt halitus, vapores, & alia quẽdam  
corpora. Sic partes nostrę nimis testę ob  
calorem inde collectum immodice replen-  
tur, & caput in æstu cucurbitulę ritu attra-  
hit: unde coryzæ, & catarrhi, & fomenta  
oculorum, & viscerum partes replent. Quid  
quod sumpta calida non tantum trahunt, sed  
etiam prorsus propellunt, vt quę flatus dissi-  
pant per ructus aut crepitus: quę sudores, vri-  
nas, menses, hemorrhoidas promouent: quę  
fœtus mortuos & secundas depellunt, quę  
partes adiuuant. Id autem præstant, quod  
meatibus interclusa dum magno imperu ad-  
dicta loca feruntur, vnã secum propellunt,  
aut si vis, rapiunt dictas prius materias: aut  
quomodo fortasse ignis in bellicarum ma-  
chinarum meatu derepentẽ excitatus pulue-  
re ignipotente, ac loco carens idoneo & ca-  
paci, aut fistulam æream frangit ac dissipat,  
aut glandem metallicam longissimẽ iacula-  
tur, ne corpora duo locum vnum occupent.

Calore quoque cucurbitula corpori ad-  
mota cum flammis multa, si magna est: pau-  
ca, si parua, è profundo potenter attrahit fu-  
ga vacui multum adiuuante, quando si aër  
vel ore parum probẽ commissio, vel exiguo  
fora



foramine ( quod attracti vaporis emissarium quædam magnæ habent ) ingreditur, nihil aut minimum attrahunt. Et vitii fundam cucurbitulæ æmulum palmæ parum humectatæ paulatim & velut tranando, sed firmiter affixum sine flamma cucurbitulæ modo firmiter palmæ adhæret, & attrahit. Neque enim tam paucò tempore calor magnus à flammula excitatur: neque calor alius multò maior tam validè attrahit quàm cucurbitula.

5. Calor natiuus coquit alimenta & humores coqui habiles, partiq; nutriende perfectè assimilat: impactos autè nec diffusos vertit in pus, aut puri respondentē substantiam, quæ in febrium coctarum vrinis apparet, nisi tam sit praua, vt nullum à calore natiuo cultum recipere queat. Quò autem copiosior fuerit hic calor, eò valentiùs alimenta coquit: ob id pueri plurimo egēt alimento, quia plurimum habent calidi innati, Apho. 14. libr. 1. Eadem ratione adolescentes & pueri præsertim viuidiore*s* ieiunium non ferūt, Aphorif. eodem: & per hyemem pluribus alimētis opus est, quia ventres hyeme & vere natura calidissimi sunt, Aphorif. 13. libr. 1. Idem calor lac ex sanguine pituitoso coquit, & semen ex sanguine perficit, cap. 16. libr. 4. simplic. & cap. 20. 22. lib. 5.

*Lib. 5. sim  
pli. cap. 5.  
& 8.*

*Cap. 85.  
artis med.*



*Cap. 5. li. 5. simp.* simplic. Calor natiuus moderatus coquit quantum appetit: remissior autē plura appetit quā possit coquere, nisi manus palma  
*Li. 2. tēp. & initio* vētriculo admota, vel pueri carnosī non facile sudātis venter, aut catellus pinguis, calorem illum foueat & augeat: at vehemen-  
*libr. 1. aliment.* tior & acrior idem, & velut igneus ac febriculofus coctu facilia, vt pisces saxatiles, corrumpit: coctu difficilia, vt bubulam, chondrum coquit. Idem calor natiuus si moderatus est, primum ac principalissimum est naturæ instrumentum ad generandum, augendum, nutriendum. Idem calor dulcorat: nam sapor dulcis à calore fit moderato, vt in melle, chylo, sanguine, fructibus apparet, & lacte, quod coquendo quantum sibi de sapore dulci deest, assequitur.

6. Calor præter naturam & partī externus ac alienus corrūpit, vt victa partis natura à fluxione in magnis phlegmonis fit gāgrena, aut etiam sphacelos. Eius caloris externi causæ quinque docentur libro de causis morborum, & cap. 4. lib. 1. febrium. Hic corrumpit, minuit, emaciat, atrophiam inuehit, graueolentiam, substātiā alienam, odores, colores, sapes in nobis præter naturā excitat, malorū nobis omnium & mortis est autor: vt natiuus ille per se etiā vitalis est, ac quicquid in rebus subsistit, id auge-  
 tur,



tur, roboratur, sanum est, ac viuit dum proprio calore regitur, licet per accidens interitum tãdem quoq; afferat, summa scilicet in partibus siccitate excitata. Vterq; tam natiuus scilicet quàm externus simul mistus partim coquit, partim corrumpit olida putredine, vt in phlegmone suppurata, & febribus putridis salubribus, si æquè ambo pollet. Si verò inæqualiter, pro vincente calore fit alteratio, coctio quidem magis natiuo: putredo autem potius externo dominante. Idem vehementior tam internus quàm externus mordet, rodit, rubrificat, carnē deterrit, vrit, escharam inducit, quod declarant herpes exedentes, carbunculi, & caustica cuti & potius carni admota. His autē externis tam sumptis quàm admotis, si substantiæ cōtrarietas cum nostra accesserit, corpus nostrum eo modo mutant, quo à corpore mutatur alimentum: sunt enim deleteria nocentissima, præcipuè si sumantur.

li. II. method.

Lib. 3. temperamēt.

7. Calidum internum & externū moderatū partibus natura frigidis, vt cerebro, spinali, medullæ, ossibus, dentibus est amicū vsu moderato, Aph. 18. lib. 5. nō autē immoderato, Aph. 16. lib. 5. Nā pars omnis intēperata à similibus suæ intemperaturæ causis promptè offenditur: iuuatur autem modico contrariorum vsu. Moderatum autē cuique

Cap. 23. artis med.



intemperaturarum magnitudini suum est, ut si parum perfrigerata est, modice calido opus est: si plurimum, ipsum elementum ignem requirit. Idem rebus splendor inducit, ostendit color viuidus adolescentium, sanorum, potorum, iratorum, hilarium, & melancholia humor ob adustionem splendida, cum humor melancholicus nigredinem habeat obscuram, Aph. 21. lib. 4. ut sanguis exincto calore nativo nigricas. Externus autem calor nunc qui foris corpus tangit, intelligitur, interdum alienus ob vehementiam a nostro & insito, siue is ab aere sit ambiente, siue balneo, siue in corpore nostro non transpirante, vel alia de causa excitatus scuiat.

8. Calor homogenea cogit, heterogenea separat, parvus & parum diuturnus imperfecte, vehementes & diuturnus perfecte, ut Aristote. cap. 4. lib. 4. Meteor. Quod an sit propria & perfectissima caloris actio, ut frigoris, tam homogenea quam heterogenea cogere, an potius caloris calfactio, frigoris refrigeratio, abunde docuimus nostro commentario de tota quatuor elementorum natura.

9. Calor tam internus quam externus per accidens refrigerat, vacuata ex corpore vel parte, materia calida. Ob id Venus Hippocrati calfacit, humectat agitato corpore, & fusis a calore humoribus, refrigerat, siccatur

Gale



Galeno lib.3. sanit. tuend. non modo semine calida & humida, & spiritu vitali plena, re excreta, sed per cutim multo calore natiuo & spiritu cū humore & vapore excreto. Sudor item accessionibus superueniens, aut febribus cōtinuis & ardentibus, Aph. 58. li. 4. Aut etiam solum exhalatio putrium succorum aut vaporum per cutem insensilis, Gal. lib. 8. 9. meth. Sic medicamenta quamuis potestate calida materiā febriū putrem vacuando refrigerant, licet per se calfaciāt sic phlegmone fotu mitescit, quod calore tepido tenuata sanguinis eius parte, & per cutim ab eodē rarefactā vacuata tensio minuat, & aliquid calidæ materiæ foras trahatur, & sanguis minus iam impactus, liberius trāspiret. Sed si corpus est impurum, noua fluxione excitata dolor repetit vehemēti-  
or, Aph. 31. lib. 6. Sic balneum aquæ dulcis fuliginosa per cutem excrementa vacuās sine febre, & in accessionum declinatione refrigerat, & laconicū calidum refrigerat, & ignis modicus refrigerat calfactos, quibus intus calida sunt excrementa, & aer æstius sudites, aut saltem vaporoso halitu madidos refrigerat, & frictio mollis multa, & exercitatio, & cataplasmata, linimēta, emplastra, & calida alia admota. Que oīa vacuā-  
tia si immodica sint, etiam calore natiuo & nostr



nostra triplici substantia calere multum vacuata, frigida & sicca corpora nostra relinquunt: ut mox audies, & prius leuiter attigimus.

*Initio sa-  
uit. tuend.*

10 Calor per accidens siccatur resoluta, & in vaporem versa substantia vel excrementosa, ut in dictis exemplis, vel etiam partis propria, si diu perseveret foris, balneum, aer calidus, praesertim si paulo valentior sit calor: nam vehementissimus externus adusta superficie & desata humidum intro cogit, nec finit expirare, ut ante dictum est. Hinc animalibus omnibus, atque adeo plantis ipsis corruptele ac interitus est conata necessitas, immodice videlicet siccatis a suo calore nativo humidum substantificum depascente citius, si acrior & vehementior, & humiditas illa pauca, parum lenta & crassa: tardius, si contraria adsint. Idem ostendunt digerentia omnia, exercitatio vehemens & diuturna, frictio multa non dura, febres ardentes & acutae, venus immodica, intempestiva: haec enim & sudore, aut madore, & seminis vacuatione siccatur: refrigerat, ut prius diximus, longa in sole aestivo mora animalium, & rerum aliarum humidarum. Siccatur eadem ratione omnis immodica vacuatio, quacunque parte fiat, etiam si per accidens fiat, ut per inedia. Ob calorem etiam non solum siccitatem semen agni & rutae, & quae similiter immodice



ē calēt, virorum genituram absumunt:  
ic & ignis ipse res genitas nō sola siccitate  
er se, sed etiam calore per accidens siccāt.

II Calor per accidēs humectat fūsis his  
uā à frigido concreuerūt: ostendūt id ca-  
rrhi per febres ac solis æstus, vti per frigus  
ōprimens. Sic scirrhus concretiōe durus  
alorificis mollescit & humescit, nix, gran-  
o, glacies, calore quouis humida & liquida  
iunt, & butyrum, oleum, adeps, resinæ, &  
quæ alia frigore concreuerunt, calore sol-  
ūtur: Sic venus calfacit & humectat Hippo-  
rati, vt antē diximus, dum feruet scilicet  
ic exercetur, vti labore alio corpus sudore  
nadescit. Galeno autē refrigerat, siccāt va-  
uata per virgam & poros calida & humida  
substantia. Sic panis durus modicē assatus te-  
nerescit, quod humiditas aquosa non modō  
farina absorpta ab igni extrahitur, sed à  
rigido etiam concreta calore colliquatur.

I Refrigerationē sequuntur contraria.  
Nam frigus crassat, & crassiorē reddit sub-  
stantiam, vt indicant sapor acerbus, & auste-  
us à frigido. crudo in substantia crassā & ter-  
rea: sic terrea omnia ob frigiditatē sunt sub-  
stantiæ crassioris: & quō frigiditas maior, &  
diuturnior adest, eō crassiorē reddit materi-  
um: quod ostēdūt lapides & metalla, pituita  
in nobis vitrea, humor melācholicus, ossa  
& pa



& partes aliæ in nobis multum terrenæ facis habentes. Sic medicamenta & alimenta crassæ essentia ægrè penetrantia, si liquida sint, ægrè comminabilia, si sicca sint.

2 Frigidum gelat & glaciât, ac durum cōcretionē facit, vt glaciem, niuem, grādinem, crySTALLUM, succinum, & gummi reliqua, ac resinas, butyrum, adipē, sanguinem extravasa præsertim (hinc à frigido liuores, Aph. 17. & 20. li. 5.) pituitam, metalla, & cætera id genus. Sic scirrhum tam per se natū ex affluxu aut cōgestionē pituitæ, crassæ aut humoris melancholici, quàm succedentem phlegmonis, & erysipelatibus immodicè refrigeratis coagulauit frigidum. Pigros facit spiritus, & tanquam congelat. Hinc senilibus & moribundis sensus omnis & motus imbecillus & tardus, & actiones reliquæ animales, vt vitales, naturales adiuuante tamen imbecillitatem hanc eorūdem spirituum inopia. Ob id etiam frigus somnolētos facit, stupefacit spiritus à frigido congelatos, & spiraculis in nervosa substantia contractis à frigido & densatis, per quæ spiritui via erat ad partes sentientes & motas: semen supprimit, & omnem hæmorrhagiam contractis etiam ab eodem meatibus. per quos & spiritus ferri & aliæ materiæ debent. Id ostendunt frigore torpētes partes ac stupefactæ aut



aut narcoticorum contactu, animalia hyeme latetia mortuis similia, hypnotica sumpta, & fronti ac temporibus admota, noctes hybernæ somnificæ, Aph. 15. lib. 1. Vfus frequens casei mollis, & lactucæ, & cæterorum somnificorum, quæ etiam semen gigni prohibent, & genitum supprimunt. Quod lami-  
 na plumbi lumbis admota etiam præstat, & radix nimphææ & alia omnia frigida. Pituita item multa toto in corpore præsertim capite redundas, quo largior & frigidior, eò somnolentos magis & propè stupidos reddit.

*Lib. 2. loc. affect.*

*Cap. 22.*

*Li. 5. sim.*

Frigus etiam glaciando impinguat: nam à frigiditate partium nervosarum ex aërea sanguinis substantia per vasorum tunicas exudante & exhalante fit adeps. Ostendunt mulieres & castrata animalia ob frigus obesiora. Tensa & rigida durat & glaciatur, maximè si erant humida, ut ligna madefacta, funes nautici sub gelu hyberno declarant. Quid quod vasa samia, ascia, dolabræ, & alia id genus ferramenta in gelu mox rumpuntur: illa si liquorem habent, hæc si ligno adigas non præcalfacta. Hinc à frigido distentiones & cõuulsiones, Aph. 17. & 20. lib. 5.

*Li. 2. tem.*

3 Frigidum densat poros cutis & meatus omnes corporis internos, tam occultos quam manifestos: ob id calfacti, si derepente refrigerentur siue potu largo frigida internis poris,



Xi.9.met

ris, siue relictis vestibis, aut aliis calorificis, externis densatis, omnino febricitant: ob id febricitantibus noxius est aëris frigidi ad cutim occursum, & frigida potus, nisi dicta ibi conditiones adsint. Mulieres item & spadodones, quia viris frigidiores, meatibus his omnibus sunt angustioribus. Adhuc hyberni aëris, & aliorum frigidorum cōtactu pori nobis contrahuntur: & venarum angustia, hepar: arteriarum, & saepe thoracis, cor frigidius declarant.

4. Frigidum repellit & intrò protrudit ad motum: foras, sumptum: ob in fluentibus materiis opponitur. In ventriculum enim fluente sanguine refrigerantia & astringentia damus, sed minùs, quàm si sanguinis in eo coagulationem non timeremus. Idem frigidum ad motum, aut foris incidens ex alto: tum cōtrahendo meatum, tum materiam velut glaciando, & sanguinis fervorem extinguendo fluxiones sistit. Hinc ferrum, ebur, frigida alia contusionibus recentibus applicamus, affluxurum sanguinem repulsuri: & eadem interscapulio è regione magnorum vasorum, vertici, fronti, naribus applicimus, fluente per eas sanguine immoderatiùs. Sic in artus fluxiones incipientes regerimus: si verò in partem penitiorem fluat materia, vt ischion, tunicā co-

stas.

Apho.  
23 lib. 5.



flas succingentem: aut si à parte principe  
 fluat materia, vt in parotidibus à cerebro  
 transmittente: aut si venenosa, pestilens,  
 crassior, impactior sit materia, nec frigida  
 nec astringentia adhibemus, sed digerentia  
 magis, minùs pro variis indicationibus  
 hanc in rem necessariis: fluxionem verò in  
 hepar, ventriculum, lienem etiam ad motis  
 repellimus, in thoracem & pulmonem sum-  
 ptis, libro II. methodi. Frigidum eadem *Cap. vlti.*  
 ratione catarrhos excitat compresso cere- *Lib. I. fe.*  
 bro, & contenta in eo materia ad partes sub *& libr. 8.*  
 iectas compulsas: flante etiam Aquilone fri- *metu*  
 gido & sicco vento, alui duræ Hippocrati  
 Aphorif. 5. lib. 2. Quòd autem vulgus vespe-  
 re nudis pedibus super frigidam aream ali-  
 quantisper ambulando aluum sibi cõcitatur,  
 sed etiam colicos dolores vehemētissimos,  
 vt in duobus vidi hoc mense Maiorid acci-  
 dit à frigido resoluta vi retentrice vētricu-  
 li, ac intestinorum. Facile enim penetrabile  
 frigus, vt calidum, per continētes sibi partes  
 permeat, vt etiam cerebrum tandem attin-  
 gat. Quod indicat torpor per calamum tre-  
 mentem, & lineam à torpedine pisce ad pi-  
 scatoris manus transiens, vt in libro loc. aff.  
 docet Galenus. Eadem vi succos biliosos  
 ventriculo innatātes absinthium, aloë, rha-  
 barbarum, tamar Indi, prima subacerba de-



orsum pellunt: quos tria prima etiā clemē-  
ter ex partibus vicinis attrahunt. Qui autē  
partibus affixi sunt humores, astringēti sua  
qualitate prædicta omnia tenaciū affigūt,  
nisi amaro sapore anteuertant tergere, vt li.  
11. method. de absinthio: sed vix passæ, præ-  
fertim nostrates, acidę magis, clibano sicca-  
tæ, bacculæ, oxyacāthes, & similia pituitam  
multā in os alliciunt ex cerebro, quod par-  
tes oris ab his fugentibus, siccantibus, con-  
trahentibus inanitæ attrahunt, iuuāte in id  
situ partis permittentis sublimi & liquidio  
ris pituitæ prompto ad inferiora decubitu.

§ Frigidum coctioni tum alimentorum  
tum humorum in tumoribus tam cum  
febris, quā sine febris, & in venis, ac  
totius corporis habitu aduersatur & resi-  
stir. Nam vlcera & tumores omnes reddit  
insuppurabiles, Aph. 20. libro 5.

Hinc frigidorum ventriculorum coctio  
tardissima, sed appetentia plurima. Hinc  
etiam hydrops omnis frustrata & abolita  
sanguificatione, hepatis actione, refrigera-  
ti per se aut consensu aliarum partium. Fri-  
gidum etiam rem coqui coeptam, vt sic di-  
cam, recrudat: ob id leguminibus coqui  
coeptis affusa, deinde frigida percoqui pro-  
hibet. Eadem ratione aqua puteana co-  
qui promptè nequeunt legumina, nisi hæc  
antè



antè cocta sit: nam ob crassitiem glaciata  
 intro permeare ad coquendum non potest,  
 vti calore aliquo iam tenuata: qualis est flu-  
 uialis, præsertim si lōgiusculè absit à fontibus,  
 hique orientē potius quàm septentrio-  
 nem spectent. Sic fructus omnes ac semi-  
 na autūni frigus intempestiuum & immo-  
 deratius percoqui prohibet. Quod verò  
 frigori tribuimus, idem calori imbecillo  
 (quem ferè frigus vocamus) tribuendum  
 est plantarum & animalium interno, atque  
 etiam externo.

6 Frigidum est inimicum cerebro, spi-  
 nali medullæ, neruis, atque adeò neruosis  
 omnibus, & natura frigidis partibus, quibus  
 calidum est amicum, Aphorif. 18. libro 5.  
 Nam pars omnis intemperata, sed adhuc  
 intra fines sanitatis, à similibus suæ intem-  
 peraturæ causis promptè offenditur, trans-  
 itque in morbosam intemperiem. Modi-  
 co autem contrariorum vsu ad mediocrita-  
 tem transmutatur. Frigidum eadem ra-  
 tione calidis partibus amicum ostendit in-  
 spiratio: & si febris est, aut citra febrem in-  
 temperies cordis calida, quò calor est ma-  
 ior, eò frigidiorē aërē expetit: sic & arte-  
 riarum diastole, expiratio quoque & systo-  
 le distas partes refrigerant, quanquam per-  
 accidens vacuantes calida & fuliginosa ex-



crementa, si tamen frigidior aër, nec antè fractus gargareone, & alios oris partibus in cor trahitur, lædit, vt docet Galen. in vsu gargareonis. Item in vulneribus thoracis aut capitis penetrantibus chirurgiam exercere oportet in aëre calido.

Sic frigidum, qualis est nix, glacies, thoraci nocet, tussēs mouet, à quarum violentia ruptis vasīs, screatū sāguinis excitat: cui nisi citò & tutò prospiciatur, phthisis, & hectica, & mors tandem superuenit. Cerebro item per refrigerantia compresso, destillationes, vt paulò antè dixi, fiunt, Aph. 24. lib. 5. & ipsum à sudore, pluuia, vel alio refrigeratum nec recalfactum, largam gignit pituitā tum ex suo alimento, tum ex susceptis à corpore toto vaporibus, quos trassando promptè, affatim vertit in aquā: vt nostra capitella terrea, plumbea, vel alia materia, si linteo aqua frigida merso circundētur, largiorem aquā per capitellæ nasum mox profundunt. Mulieres refrigerato capite ab oleo Heræ ex nucibus viridibus factō in raucitatem, grauedinem, destillationem inciderunt, lib. .i. cōp. ph. part. Multæ puellæ abluto sꝑe per lixiuium capillo, vt flauescat, nec siccato, in morbos à capite frigidos & graues sꝑe incidunt: præsertim quibus id erat frigidius vel natura, vel post natiuitatem.



7 Frigidum præter naturam & vehementius, tã internum quàm externum corrumpit, & enecat non animalia modò, sed plantas quoq; permultas, & (quod semel vidimus miserabili hominum calamitate) inter ipsas triticum ipsum. Vites enim frequenter penetrabile frigus adurit, sic vt quædam moriantur. Hinc multi iter agendo per niuosa loca mortui riguerunt, & quibusdam partes mortuæ deciderunt, extincto in his calore natiuo à frigore valentiore. Sic cor aut cerebrum frigere, mors est, vt paulò antè dicebamus. Cor enim caloris natiui fontem semper feruere oportet, cerebrũ frigere nunquam oportet, vt lib. de vsu pulsuum & partium. Ob id Hippocrati lib. 1. prognosticorum expiratio per morbos acutos frigida maximè est lethalis: minùs lethale est in eisdem morbis extremas partes frigere: magis genitalia, & nares, & aures, & partes alias capitis, quòd genitalia etiam inter principes partes referat Galenus cap. 9. artis medicæ hæ autem frigidum cerebrum declarant. Sic interna frigiditas eodem calore vel extincto (vt Aph. 21. lib. 5.) vel foras expulso (vt cap. 5. lib. 4. Meteororum Aristo.) corrumpit.

Idem frigidum denigrat & obscurat. Indicat sanguis refrigeratus in parte aliqua per ecchymomata, aut aliter effusus, vel ex-



tra corpus aperto vase emissus: ostendit idē sanguis melācholicus. Mortuis quoq; timidis, tristibus, vigilibus, lōgo carcere clausis, decolorationem quandam & pallorē inducit, colorēq; plumbeū, vt initio lib. 12. meth.

*Aph. 21* Frigidū per accidens calefacit, carnosum  
*li. 5. & li.* enim estate media, in meridie affusa frigida  
*3. temp.* calefacit calore, primū intrò cōpulso, deinde  
*Aph. 15.* de eiusdem intus aucti ad cutim reuocatio-  
*& 18. li.* ne. Quæ reuocatio si non fiat, sed paulatim  
*1.* calorem intrus colligat, coctionē iuuat: ob  
*Libro 9.* id ventres hyeme & vere natura calidissimi:  
*method.* si verò imbecillus est calor, eum extinguit. Ob id cuti febricitantium occurrens frigus eāque densans, calore febrili transpirare prohibito, & inde intus aucto, febres auget. Hinc diariæ, & interdum purridæ à cute per frigus densata, & prohibitis ob id excrementis diffari, vt in febribus, & 8. & 9. methodi, abundē docet Gale.

Frigidum etiam siccat non ex prima facultate, sed per accidens, humectante materia quæ fluit, & quadantenus quæ fluxit in vicinas partes per frigus ad motum expulsa. siccat quoque per accidēs, dum calorem expellit, quòd is multam simul humiditatem sibi pabulum educit, Galenus, lib. 5. simpli. cap. 4. & Arist. cap. 5. libr. 4. meteororum: & Gal. lib. 1. comp. ph. gener.

Fri



Frigidum per accidens humectat, compressam à se humiditatem in vicinas partes regerens: eandem à cerebro in partes subiectas depressam, ac in corpore defato humiditatem intus multam concludens. Quo fit, ut nobis hyeme interna non modo calidiora sint, sed etiam humidiora ob aeris nos ambientis frigus, effluuium nostrae substantiae largius prohibens. Frigidum etiam per accidens nos humectat, non consumpta ab eo humiditate superflua aut etiam naturali. Quae res quosdam impulit, ut negarent temperamentum frigidum simul & siccum posse consistere: quod tamen reuera aliquandiu consistit, semper non consistit, ut libro primo tempera. docet Galenus.

Has calidi & frigidi actiones fere auget essentiae tenuitas, moratur crassities: utriusque enim cum tenui essentia propius in profundum subit, citius mordet ac ulcerat, in minima friatur, nisi lentor aut durties iuncta repugnet, cum crassa contra: hinc caustica crassae essentiae sunt dolorifica magis.

Horum effectuum calidi & frigidi singulorum testimonia adscribere potui, sed non visum est, quod illa nimis multa essent, & quod sint testibus fidem facientibus, etiam puero perspicua. Ex problematis omnibus, & libris Hippocratis & Galeni



proferre nō fuerit difficile: cū in has qualitates primas & reliquas duas omniū propē effectorum causę reducantur vel primo vel secundo & aliarum qualitarum interuentu.

*Libr. 7.  
metho.*

Siccitas & humiditas magis materiales sunt qualitates, minúsque efficaces, ob id earū actiones minus latē parēt, quā calidi frigiditamen otiosę nō sunt, sed aliquid etiam agunt (vt in quatuor elementorum actionibus primariis & secundis probauimus) & actiones alię quędam primas has siccationem scilicet & humectationem sequuntur.

*Lib. 2. tē-  
peramēt.*

Siccatio enim durat: quādoquidē omne ficcum si modicē calens ficcum permanet, durum est. Id ostendit lutum estiuo sole duratum, lateres etiam igne ficcati. Ossa item, cartilagines ligamenta, & reliquę corporis nostri partes solide, id est, crassę & durę, & animalium ceterorum, atque adeo plantarum omnium: maioris tamē & minoris ratione in singulis horū generibus latissimē fusa: ac etiā in vno alicuius corpore, in quo sunt ossa siccissima, ob id durissima, & quō ficciora sunt, eō etiā sunt duriora: caro & adeps & nerui sensifici minimum sicca & dura: in medio horum reliqua est latitudo magis & minús siccarum partium. Omnes verō tandē adeo siccantur: vt rigide ac inflexiles, duręque fiant à calore nostro humi-  
dum



dum depascēte, & à siccitate in nobis ignea. sed multò largiore terrea. Vnde sanitatis tuē & scopus est nō mediocris, siccitatē illā pręproperam frangere, ac ne tam citò fiat prohibere humectante victu. Idem ostendit conuulsio ex inanitione omnis seu siccitate, qualis plurima & periculosissima morbis acutis superuenit. Item lapides, metalla, terrea denique omnia ob id dura, quod sint sicca, & quanto duriora, tanto sicciora & contrā: dum vt dixi, modice calentia talem retineant duritiem, cū terra ipsa elementum si vsquam inueniatur, sit adamante durior ob siccitatem summam.

*Li. i. prognost. Hi. Galen. in libr. de nat. hu.*

Siccum autem quia bifariam siccatur, duobus etiā modis durat. Primo, humorē in poris & spatiis contentum ebibendo. Deinde alterando & sicciorē reddendo partium essentiam, consumendo scilicet ipsarum humilitatem. Possis alias siccationes duas addere dictas libr. 7. methodi, sed remotiores sunt, & quę possint sub harū priore cōtineri. Quod autē siccis secundo loco diximus, id est, quod etiam propriē durum efficit. Nā durum repletionē est renitens: durū concretionē est congelatum & coagulatum. Siccantia enim propriē & primariō nominantur, quę digerunt, & temperamentū ad sicciorē statū perducunt, qualia sunt omnia vacuan-

*Cap. 4. li. 5. simpl.*

*Ibidem. Lib. i. cō. ph. gen.*



tia præsertim insigniter, siue per se vacuent, ac nostram substantiam dissipent, vt medicamenta purgantia, hæmorrhagiæ omnes tam spontinæ quàm medicæ, vrinæ largiores, vt in diabete: sudor profusior, vt in cardiaca affectione: semen largius, in venere: siue per accidens, vt inedia, aut victus tenuior, & quæ calorem acriorem reddunt, vt labores immodici, vsus acrium, salforum, & reliquorum immodicè calidorum. Adde omnes animi affectus, aërem calidum, siccum, & cætera, quæ corpus per se aut per accidens quouis modo vacuant.

*Lib. II.  
simpl.*

Humectationem sequitur mollitio. Omnia enim humida sunt mollia, si cū calore tantum modico humida perseverent. Ob id sanguis, pituita, & reliqui humores, quia liquidæ consistentia sunt (licet horum quidam siccent) etiam molles sunt, & adeps mollis, magis quidem humidiorum animalium, qui propriè pinguedo dicitur: minus verò mollis & crassior terrosiorum, qui propriè adeps vocatur. Caro item mollis eunuchorum, puerorum, mulierum, utpote humidiorum: duriuscula, fossorum, nautarum, agricolarum. Sic lutum & terra imbre irrigata mollescit, rubigo ferramentorum, oleo rubigo dætiæ, aqua diacalciteos: adamas & calculus in nobis, sanguine hirci calido: vnio & testa



testa oui, aceto: ebur zytho vel oxycrato, id est, posca molitum fit tractabile: metalla quoq; singula suū habent emolliēdi genus, quod tractabilia magis ea sine igne reddat: quāquam ea etiā tū humida verē non sint.

Humectatio & ab ea mollitio fit vel penitissimē in totam partem nostrā, idq; per solam nutritionē, vel superficie tenus & per spatia rerum humectatarum inania nō autem per totum, qualis ea quæ fit à balneo vel fotu aquæ dulcis, vel olei maturi. Hæc em spatia quidē inania humore suo replēt, & madorem quēdā solidis partibus addūt: earum autem substantiam totam nō reddūt humidiorē, seu humidum earum substantificum non verē instaurāt. Quanquā est credibile, tenuiore eius madoris parte humidū ipsum quadātenus recreari. Vera autem partium humectatio per solū fit nutritionem, hoc est, vacuatæ triplicis nostræ substantiæ repletionem, lib. 4. simpli. cap. 9.

Harum autem facultatū quasdā ratione Ga. in the prima & sola inuenimus, alias sensu interdū riaca ad vnico: est quando etiā duobus & tribus & Pisonem. quatuor. Neq; enim calcem & niuem, quod candida sint, rosam quod rubra, vt calidam aut frigidā dicas, sufficit: sed tactus visui additus calcē calore causticā, niuē frigore glaciātem inuenit, & nobis id firmiter persuad



suadet: ac inde saporem alium esse falsum, alium acrem, alium amarū, aut dulcem gustatus iudicat, vt calidum, frigidum, humidum, siccum tactus. Multorū item probationem ex odore molimur, & facultatis eorum robur ex vehementi exhalatione deprehendimus, vt virtutis imbecillitatem ex odore remisso. Propterea quæ in odoratorum genere sunt odoratissima, illa in eodem præstantissima putantur, vt post audies. Alia, calidi, frigidi, humidi, sicci significata, & singulorum exempla non protuli fuga sermonis prolixioris.

Coniugatas inuicē actiones primas calcificationē aut refrigerationem cū humectatione vel siccatione, quæ sequantur, secundæ vel tertiæ actiones, ex prædictis simplicibus colligere non erit difficile. Sunt autē facultates & actiones tertiæ, quæ vlteriùs procedendo propè particulatim appellātur: vt sarcotica, colletica, epulotica, vretica, vomitoria, eccoprotica, errhinos, apophlegmatica, menses ciendi aut sistendi facultas, seminis generatrix, extinctrix, prouocādi, reprimēdi. Quales magna ex parte primas simul & secundas sequuntur: vt sarcoticum siccū ad primum gradum: detergens, colleticum siccans & astringens: epuloticum siccans, ad secundum gradum valenter astringens.

Est

*Libr. 3.  
method.*



Est quādo in neutram possis apertè reii-  
cere hanc tertiam: vomitorium enim est  
hoc, illud vt bulbus vomitorius, nux vo-  
micā, agaricus, elleborus albus, non ob ali-  
quam qualitatem primam vel secundam,  
sed quia vel substantiæ suę raritate innatāt,  
vel stomacho sua substantia sunt contraria.

Sed quæ ex secundis desiderari possunt,  
& quæ ad tertias pertinent tum facultates  
tum actiones, sic accipe ex libr. 5. simpl. Gal.  
quorum exempla ex libris simplicium se-  
quentibus collocupletare possis.

Tenuātia sunt calida, tenuium partiū, vt  
cinnamomum, piper, zingiber, casia, aristo-  
lochia. Crassantia frigida, crassarum par-  
tium, vt malicorium, balaustium, galla.

Durum est, cui caro nostra temperata  
cedit.

Molle, quod cedit carni eidē, id est, cuti.

Corpus  
durum  
molle

Absolutè seu in summo, terra  
dura, aër, & aqua mollis.

In victoria seu excessu, os du-  
rum, caro mollis.

In collatione ad symmetrum,  
vel quoduis obuium, vel sei-  
psum dum habebat secundū  
naturam, id est, durius mol-  
lius, quo significato hīc au-  
diendum est.


Valid

Plato in  
Timæo,  
& libr. 1.  
vsus par.  
Cap. 3. li.  
5. simpl.



Tensio ar-  
ticuli vel al-  
terius

Corpus du-  
rum, id est  
siccum dum  
sanum erat,  
durius





Cutis etiā tēditur à subiectis ei musculis *Cap. 10.*  
tumētib<sup>9</sup>, vel à carnis copia. Partes etiā alię  
tēdūtur repletioē quauis, laxātur à causis cō  
trariis. Articuli verò ferè laxant<sup>r</sup> humectatis  
ip̄os ambiētibus ligamentis & tendonibus.

Rarefaciēs est, quod poros cutis dilatat, *Cap. 13.*  
calidum modicè, siccum minimum, tenuiū  
partium: vt chamæmelum, althæa, oleū ve  
tus, chamæmelinum, ricininum.

Densans huic contrariū, poros cōtrahit,  
frigidum aqueū nō terreum, non aëreum,  
non astringēs: vt aqua frigida, semperuiuū,  
portulaca, tribulus viridis, lens palustris.

Anastomoticum, id est, ora venarum & *Cap. 13.*  
arteriarum aperiens, est calidum, acre, mor  
dax, crassarum partium, & terrenum: vt cy  
claminus, allium, porrum, capa, fel taurinū.

Stenoticum, id est, eadem ora constipans  
& contrahens, est frigidum, astringēs, cras  
sarum partium, nō acre: vt bolus Armenia,  
& terrenorum corporum magna portio.

Attrahens, succos ex alto vehementiūs *Cap. 16.*  
euocat, calidum, tenuium partiū: vt dictam  
nus, thapsia, sagapenum, fermētum, fimus  
columborum & anserum, fex vini vsta, calx  
viua, sandaracha, quæ etiam incidunt, dige  
runt, rodunt: attrahens similitudine torius  
substantiæ medicamentum purgans & ale  
xiterium pōst dicetur.

Reper



Repercutiens, succos occurrētes in altum repellit, frigidum est, crassarum partium: quod si etiam astringit, multo magis repellit, ut acerba, austera.

*Initio li.* Modicè repellunt rosarum folia, flores,  
*4. c. ph. p.* succus, ericę fructus, palmulę, capreoli vitis,  
*lib. 6.* germina & folia rubi, canirubi, aspalathi,

cyperus, malobathri foliū, radix spice nardi, crocus, lycium, hypocisthis, magis acacia, omphacium: maximè malicorium, balau-  
 stium, galla omphacitis, rhus vterq; fructus myricę, spina Aegyptia. Succus tamen ex nucum vigentium corticibus expressus maximè astringens, tenuissimę esse substantiæ ostenditur, quod lanarum substantiā totam

*Lib. 6. c.* & manus contrectantium penitus tingat &  
*ph. part.* contumacissimè, ita ut generosissimis absterfionibus elui nequeat. Astrictionē enim substantiæ tenuitas iuuat maximè, quod astringentia ob substantiæ crassitiem in altum corpus penetrare non possunt, & densata astrictaq; ab his superficie corporis cui admouentur, viam sibi ad interiora præcludunt, ob id partes inflāmatas minùs iuuāt.

*Cap. 10.* Emplasticum, id est, illinens, quod poris corporis illitum tenaciter hæret, est glutinosum, terrenum nō acre, ut butyrum, adipēs, oleū, resinę, gummi: sic aloë, bolus Armenia, gypsum, farinę addito liquore em-  
 plast



plastica euadunt. Eadem sunt emphractica, id est, obstruentia poros suo lentore, quos tamē aloë sumpta amarore terget & aperit.

Eccartharticum, id est, poros omnes ex- Cap. II.  
purgans, est acre, partium per adustionē tenuium, non glutinosum, ut nitrum, aphronitrum, abrotanum, orobus, lupini amari, amygdalæ amaræ, & cætera nitrosa & amara, etiam si parum astringāt, ut absinthium: sed hæc & similia poros cutis non purgant, internos latiores purgant.

Hæc eadē sunt ecphractica id est, obstru-  
ctionem tollentia pororum, tum interno-  
rum, ut hepatis, lienis, venarū: tū cutis. Præ-  
ter ea (ut nuper dixi) quæ etiam astringunt.  
Hæc etiam sunt rhyptica generatim dicta.

Rhyptica speciatim sordē a cute & vl-  
ceribus tantum tergent, non etiam obstru-  
cta liberant, quia sunt amariora imbecilliora,  
falsa scilicet & dulcia: ut sal, mel, hordeum,  
faba, amygdala dulcia.

His cōtraria sunt emphractica, id est, ob-  
struētia multitudine crassitie, lentore. Dul-  
cia quoque hepar & lienem promptē ob-  
struunt, quia ceu iucunda citō ab his rapiun-  
tur ante cōstionem.

Tergentia etiam pilos tenuāt, ut nitrum Lib. I. cō.  
vstum, nitri spuma, fistiles testæ, pumex, buccina phar. p.  
cinorum & purpurarū & cæterorū ostreo-



rum testæ vitæ, tritæ, tenui cribro cretæ: sic ossa sepiæ etiam non vsta, alcyonium, struthij, bryoniæ, dracontij, aristolochiæ radix, veratrum, fursur, beta, lixiuium.

*Initio lib.*

*7.c.ph.p.*

*Libr. 2.c.*

*ph.gen.*

Tergēt modicè, farina fabarum, hordei, ciceris, semen lini torrefactum: magis terebinthina, thus, mel despumatatum, amygdala amaræ: valentiùs erui farina, semen hormini, radix ireos, & pauacis. Valèter tergentia omnino etiam digerunt, ob id valde ficcant.

*Cap. 18. li*

*br. 5 simp.*

Anodynum, id est, sedans dolorem, vacuata doloris causa, calidum primo gradu, tenuium partium: vt chamæmelū, panis calidus, lac, adeps anseris, gallinæ, suillus, 1. lib. pharm. gen. Narcoticum autem frigidum, crassum, vt opium, mandragora, papauer, hyoscyamus nomine tantum abusiue anodynum dicitur, quia tactum stupefacit, sine quo non est dolor.

Odyneron verò, id est dolorificum, quicquid affatim alterat, aut continuum soluit.

*Cap. 2. 5.*

*6. 7. 8. lib.*

*5. simpl.*

Suppurantia in pus vertunt humorem tumefacientem & carnem contusam: sunt calida quantum pars suppuranda, ita vt essentiam caloris augeant, qualitatem non intendunt, nec obrundant. Sunt & humida, sic tamen vt nec augeant, nec minuant humiditatem partis naturalem, quod saltē sit manifeste



nifestum & sentiri queat, sed aliquid excrementi in spatiis vacuis contēti per halitum digerant. Suat denique emplastica, porisque obstructis essentiam caloris augment: ut hydrelæum, panis cum oleo, pix, adipēs, mædullæ, gummi, radix althææ. Agunt igitur caloris quantitate: emollientia autē caloris qualitate: sunt enim calidiora nobis, & humiditatē excrementitiam, & naturalē partium humorem modicē deficcāt, phlegmonas, & alias dispositiones coquit myrrha, crocus, castoriū, thus, fœnigræci cocti succus, quæ & digerunt, præsertim myrrha.

Escharoticum, id est crustificum, ignis *Cap. 14.*  
modo & cauterij corpus colliquat, & sæpe  
escharam facit, est calidum siccum quarto  
gradu, crassæ essentiæ, dolorificum: ut calx *In fine li-*  
viua, sæx vini vsta: quanuis enim vrendo *br. 5.*  
tenuiora seipsis euaserint, crassa tamen adhuc sunt essentia.

Septicum, id est putrefaciens, etiam causticum & vrens, sed parum vehementer, est *Cap. 14. li-*  
calidum siccū minus, essentiæ tamē tenuioris, *br. 5. sim.*  
exiguo morfu, & dolore aut nullo: ut arsenicum, sandaracha, chrysocolle, aconitū.

Cathæreticum, id est superficiem solam *Ibidem.*  
detrahens, & hyperfarcosin absumēs, unde  
& fircophagon quoq; dicitur, est calidum  
siccū minus quàm septicum: ut flos Asiæ pe-



træ, æris squamma, æs vltum non lotum.

*Cap. 15. li* Sarcoticum, id est carnem gignens in vl-  
*br. 5. simp.* cere cauo, est siccum ad primum gradum,  
*& libr. 3.* detergens modicè & sine morfu, non astringens: vt hordei farina, thus, & quæ plurima  
*Meth.* lib. 3. Methodi describuntur.

*Ibid: m.* Colleticum, id est glutinans carnem in vlcere, est siccus sarcotico, astringit, nō terget: vt omnia acerba & austerà.

*Ibidem.* Epuloticum vel sinuloticum, id est cicatricem vlceri inducēs, siccatur & astringit magis quàm colleticum, non terget, vt æs vltū in dura carne: in molli autē lotum, malicorium siccum largius inspersum, & puluis tenuissimus cathæreticorū paucus, vlceri inspersus, cuspidē specilli.

*Cap. 21.* Vreticum seu diureticū, id est vrinas mouens, mediocres quidem eccatharticū, plurimas verò acrius, calidius, siccus medicamentum: vt semē apij, petroselini, fœniculi, dauci, & quæ lac augent, ac menses cient.

*Cap. 10.* Lac gignunt  
*& 21.* ex sanguine

Pauco, victus calidus, humidus, plenior.

Pituitoso, calida primo vel secūdo gradu, non siccātia, vt eruca, anethū, fœniculus, virētia.

Bilioso, purgātia bilē, victus calidus, humidus.

Mens



Mēses mouētia calida sunt magis, quā  
lac gignentia, & sicca modice: vt fabina, ca-  
laminthe, pulegium, daucus, & alia permul-  
ta: quorum catalogus exprimetur in syrupo  
arthemisia.

Semen gignentia & prouocantia calida  
flatuosa, bene nutriētia, vt bulbi, fabę, scin-  
cus, satyrion, eruca.

Semen extinguentia & corrūpentia, re-  
frigerantia, desiccantia, totis substātiis con-  
traria: vt nymphæa. Sic ruta, agnus, suo calo-  
re feminis substantiam consumunt.

Semen supprimunt frigida alimenta, &  
medicamēta sumpta & admota, vt lactuca,  
blitum, atriplex, cucurbita: quæ ipsum co-  
gunt, incrassant, stabile reddunt.

Cathartica, id est purgatoria, vel commu-  
niter quæ excrementa quouis modo va-  
cuant (vt bechica, errhina, apophlegmatif-  
mata, vretica, menses mouentia) vel per ex-  
cellentiam, quę vomitu aut vētris deiectione  
humorem sibi familiarem trahunt, non  
solo calore sed qualitatū quæ in substan-  
tiis sunt, proprietate, seu totius substātię si-  
militudine, & simili elementorum quatuor  
mixture. Quæ res sola experiētia cogno-  
scitur, quamuis in quibusdam calor aliquid  
eius insinuet, id tamē nō certò, vt aloë rha-  
barbarum, flaua & amara bilē flauā & ama-

Cap. 19. li  
br. 5. et 25.  
24. & se  
quentibus  
libr. 3. sima



ram trahunt: & myrobalanus, citrina. Cnicus autem & elleborus albus, & turbith album, & agaricus albus, pituitam: elleborus niger, myrobalanus Inda & nigra, humorē melancholicum. Trahit autem medicamentum humorē, non trahitur ab humore, quia ob calorem suum est potentius in attrahendo: sunt enim omnia sic purgātia potestate calida. Eadem si non purgant, cocta in humorem transeunt, qualem attrahunt: nisi quod horum quidam in nobis corrupta in venenum abeunt.

Apho. 24.  
lib. 1.

Cap. 26. Hypercathartica, id est superpurgātia, sunt ex his valentiora viribus aut quantitate, & quæ vacuato humore sibi familiari, eū deinde trahūt, qui ob tenuitatem, calorem, liquiditatem, est ad sequendum paratior: postremo sanguinem naturæ maximè familiarem. Morfu enim suo venarum ad ventrem pertinentium ora laxant & aperiunt, vasaq; ipsa reddunt imbecilla ob fatigationem & intemperiem. Hæc aliis sunt vacuanda vel obtundenda, ut cesset hypercatharsis.

27. lib. 3.  
Simplic.

Bechica sunt tam quæ tussim excitant, ut cap. 17. lib. 2. quàm quæ eā sedant, ut cap. 1. lib. 5. & bechicæ hypoglottides in compositione medi. part.

Ecstatica, id est mētem alienantia, ut croci magna copia, solanum manicum.

Euchy



Euchyma sanguinē bonū gignētia, hoc est, rubentem, crassi & tenuis medium.

Cacochyma, quæ biliosum, vel pituitosum, vel melancholicum, vel aquosum gignunt.

Epiceraistica, quæ paulatim bonū succū sufficiunt in locum mali paulatim vacuati, vnde epicrasis, Gal. libr. 9. meth. Sunt etiam quæ obtundunt aliorū malignitatē vel morsum, vt vicia passa mordētes mediocriter stomachū, humores obtundit, lib. 2. alimento.

Exasperantia, quod lenius vel mediocre in cavitatibus fuit, & excrementis, vt acerba, austera, crudelitatem parientia.

Leniētia asperatas cavitates, vt oua mollia & recentia: item dulcia asperam arteriā læuē faciunt, & cancani herbarū radix, gummi, tragacantha, glycyrrhiza, vina dulcia.

*Ga. inf. m  
pli. & lib.  
7. c. ph. p.*

Quæ ex dictis facultatibus qualitates primas, vel simplices, vel cōiugatas nullius alterius interuentu sequuntur, vt molliens caliditatem, humiditatem: durans frigiditatem, humiditatem: laxans, humiditatem: tendens, ficitatem: hypnotica frigiditatem, secundæ sunt: etiam si adsit substantiæ tenuitas vel crassities adiutrix, vt crassans, repellens, astringens, stipās, frigidam, crassam: rarefaciens, digerēs, attrahens, anodyna, hydrotica, vretica, calidam, tenuem



substantiam sequuntur: aperiens, detergens, expurgas, caustica, calidam crassam. Præter quæ multis etiam adest substantiæ similitudo, ut in purgantibus, lac & semen generantibus facultatibus, quæ rectius in tertias reiciuntur, ut quæ primas simul & secundas sequuntur: qualis etiam sarcotica calida attrahens, detergens, siccans: epulotica siccans, astringens: colletica siccans, cogens, & cætera, quæ suprâ retulimus. In quibus exemplum si requiris, ex libris simplicium sequentibus quintum sufficere possis.

*Facultates quarte.*

*Capit. I. & 12. lib. 5. simp. & 12. lib. 5. simp. & 12. lib. 5. simp.*

Magis etiam procedendo, ad particulares peruenitur facultates, quæ à partibus vocantur cephalica, cardiaca, stomatica, stomachica, hepatica, splenica, vel à morbis partium ischiadica, nephritica, podagrica, colica, pleuritica: vel ab effectis, bechica, λίθων τε γυναικῶν, id est, calculos cominuens, sarcotica, colletica, epulotica, cathartica, cathartica, carnem super ossa nuda creans, foetum corrumpens, foetum extrahens, ad choeradas discutiendas, ad epilepsiam, spasmodum, & alia propè infinita similiter dicuntur. Tamen sarcotica, colletica, epulotica, tertiarum dicuntur, lib. 5. comp. ph. gen. & aliarum ex tertiis inter quartas recenseri eadem ratione possunt: ut lac, semen, menses, urinas, sudores respicientia. Reuerà enim quedam horum ambigunt, & utri



utriq; generi vicina sunt. Ob id Auerrois. v. col. cap. vltim. tertiam & quartā in vnā miscet. Alij quatuor hæc facultatū genera aliter distinguunt, vt primæ sint calfactrix, refrigeratrix, humectatrix, siccatrix: secundæ, quæ primos effectus primarū sequuntur, vt vis aperiēdi, claudendi, erodens, glutinatoria: tertie, quibus medicamenta vnā partē magis, quā aliam respiciūt: quartæ sunt à virtute & forma occulta seu specifica, vt purgatrix, venena expellens. Quibus vreticam & hydroticam mirum est per hos adiungi. In quorum multis sufficit dicere hoc hætenus calidum, frigidum, humidum, siccū tenuium partiū, vel crassarum, amarū, vel alio sapore præditum. Hic enim certius medicamentorum tēperiem & facultatem declarat.

Sapor enim acerbusterreus, ob id frigidus, crassæ substātiæ, refrigerat, crassat, densat, constringit, repellit in superficie potius.

Austerus illi temperamento & facultate in ipso sita, proximus est & insipidus.

Acidus, aquosus, frigidus, tenuis citra calorem, incidit, tenuat, mordet, obstruções liberat, repurgat.

Dulcis, calidus modicè, coquit, maturat, laxat, rarefacit.

Oleosus, aqueus & aëreus, humectat, laxat, mollit.



Salsus, terreus, calidus, hinc digerit, terget, illinc cogit, contrahit, densat: utroque ficcat, & salsa à putredine vindicat.

Amarus, terreus, per adustionē tenuatus, calfacit, ficcat, tenuat, terget, incidit, expurgat, menses mouet, crassa expectorat, epilepticis prodest.

Acer, igne<sup>9</sup>, calidus, tenuis, calfacit, tenuat, incidit, trahit, digerit, purgat menses, urinas, sudores mouet,urit, exedit, liquat, crustā facit. Facultates autē à partibus nominatæ sunt, non quòd omnibus partis, quā nomine designāt, affectibus conueniāt, nec quòd ita vni parti cōducāt, ut nihil aliis partibus pro sint, sed quia frequētissimè & magno cū fru-  
ctu ac potissimū partē iuuant, à qua nomen sunt mutuatę: ut cephalicæ caput, oticæ aures, ophthalmicę oculos, odōticę dētes, stomaticę os, stomachicę stomachū, pleuriticæ costas, hepaticæ hepar, splenicæ splenē, nephriticæ renes, arthriticę articulos, ischiadicæ, coxā, podagricæ pedes: & aliæ similiratione. Adhæc quæ medicamēta humores vel alterāt, vel totius substantiæ similitudine vacuant, id æqualiter in toto corpore præstant. Ob hæc illis facultates illæ à partibus nominatæ sunt miscēdæ, cū in ipsis partibus humorē coquere, vel ab his vacuare volumus: ut oxymeli pituitam coquit, incidit,



dit, tenuat, vacuat ex æquo in omnibus corporis partibus: cum pæonia verò aut bethonica coctum id valentiùs in capite præstat: cum capparibus aut tamarice in liene: cum eupatorio in hepate. Quæ igitur capiti tota sua substantia sunt familiaria, vsu maiorum probata, & practicum, quos vocant, sunt ferè hæc.

C E P H A L I C A.

CALIDA SIM-  
PLICIA.

Bethonica  
Maiorana  
Salvia vtraque  
Ruta vtraque  
Calaminthe vtraque  
Satureia  
Hyssopus  
Pulegium  
Melilotus  
Chamæmelum  
Stœchas vtraque  
Lauri folia & baccæ  
Acorus verus  
Pæonia vtraque: sed  
mas potior femina  
Aristolochia omnis  
Cubebæ  
Nux moschata

Moschus.

Ambra

Colocynthis

Castorium.

FRIGIDA SIM-  
PLICIA.

Rosa

Viola

Myrthi folia, flores  
baccæ

Salicis folia, flores

Nymphææ vtriusque  
flores

Caphura

Quæ verò his sunt frigidiora & narcotica, sunt vsu periculosa.

Hyoscyami folia &  
flores & semen

Man



Mandragoræ radicis	Diambra
cortex	Pliris duplex
Cicuta præsertim ma-	Aromaticum, rosatū
ior & cruda	Tinnitui auriū oleū
Papauer, præsertim ni-	balaninum, philo-
grum, & ex eo opiū	sophorum, euphor-
Nymphææ folia re-	bij, laurinum pro-
centia.	sunt.

FRIGIDA COM-	Saccharum & mel
POSITA.	Rosatū,
Electarium de gem-	Violatū,
mis	Nymphæatū.
Aurea Alexandrina	Dia morōn verò, &
Elect. <i>ἢ ἀρωματῶν</i>	dia caryōn Phleg-
Dia castoriū	mōis oris cōueniūt.

## PNEVMONICA, THORA-

## CICA, PLEVRITICA.

CALIDA SIM-	Saccharum & mel
PLICIA.	Hyssopus, Prasium
Glycyrrhiza	Iris, Calaminthe
Vuæ passæ	Origanum
Amygdalæ dulces, &	Brassica
ex his oleum	Enula, Squilla
Strobyli, id est, nuclei	Radix maluæ & al-
pinei	thææ
Pistacia recentia	Crocus, Myrrha
Dactyli	Spica, Pulmo vulpis.
Auellanæ	Agaricus.

F R I



FRIGIDA SIM- Diapenidion

P L I C I A. Dia hyslopi

Hordeum Diaprafij

Lac vaccinum Dia dūx

Amylum Dia calaminthe

Semen bombacis & Dia iris

papaueris Linctus de pino, de

Viola squilla, de brassica.

Iuiubæ

Sebesten

Pfyllium

Adiantum omne

Mora

Santala

Gummi acaciæ

Tragacantha.

CALIDA COM-

POSITA.

C A R D I A C A.

CALIDA SIM-

P L I C I A.

Amomum

Cardamomum

Cinnamomum

Xylaloë

Cubebæ

Caryophyllum

Doronicum

Enula Campana

FRIGIDA COM-

POSITA.

Dia penidiō sine spe-

ciebus

Saccharum violatum

Dia tragacāthum fri-

gidum

Electarium resum-

ptium.

Buglossum vtrunque

Ozimum

Polium

Rosmaris

Mentha

Melissophyllum

Cortex citri

Crocus

Moschus

Ambra

FRIG



FRIGIDA SIM-  
PLICIA.

Rosa  
Viola  
Nymphæa  
Aurum  
Argentum  
Sapphyrus  
Hyacinthus  
Smaragdus  
Vniones  
Corallium  
Ebur  
Santala  
Succinum, Caphura  
Terra figillata  
Belletzicæ myrob.  
Os à corde cerui  
Semen oxalidis  
Sericum crudum

CALIDA COM-  
POSITA.

STOMACHICA, GA-

STRICA.

CALIDA SIM-  
PLICIA.

Amomum  
Cardamomum  
Cinamomum

Diambra  
Dia margaritum ca-  
lidum  
Exhilarans Galeno  
adscriptum  
Electariū de gemmis  
Confectio alkermes  
Aromaticū rosatum.

FRIGIDA COM-  
POSITA.

Diarhodum sine spe-  
ciebus  
Saccharum rosatum  
& violatum  
Syrupus rosatus &  
violatus  
Dia margaritum fri-  
gidum  
Electariū triū santal.  
Frigidi fruct' conditi  
Trochisci de bolo  
Trochisci de caphur.

Zingiber  
Piper omne  
Nux moschata  
Macis  
Caryophyllum  
Xylaloë



Xylaloë

Spica, Casia

Cortex citri

Salvia

Mentha

Absinthium

Maiorana

Anisum

Cuminum

Mastiche.

FRIGIDA SIM-  
PLICIA.

Rosa, Viola

Malum granatum tri-  
plex

Cucumer

Cucurbita

Melones

Pyræ

Cydonia & cæteri  
austeri fructus

Portulaca

Lactuca.

H E P A T I C A.

CALIDA SIM-  
PLICIA.Absinthium præci-  
puè PonticumCALIDA COM-  
POSITA.

Diacydonium Gal.

Diagalanga

Diacuminum

Dianisum

Dia trion pepereon

Oleum cnici & pipe-  
rum

Zingiber conditum

Gepulæ myrob. con-  
ditæ

Cortex citri cōditus

Aromaticū rosatum

Elect. stomachicum.

FRIGIDA COM-  
POSITA.Saccharum & syrup.  
rosatus, violatusCydonia, aut persi-  
ca, aut fructus alij

austeri conditi

Diasantalon.

Schœnu anthos

Spica nardi

Cinnamomum

Calamus Aromati-  
cus

Mala



Malabathrum	Lactuca
Asarum, Apium	Viola
Fœniculus, Anisum	Solanum
Ammi, Daucus	Semina quatuor fri-
Squilla	gida, maiora & mi-
Cicerum decoctum	nora quæ vocant.
Eupatoriū, id est agri-	Santala
monia	Caphura
Chamædrys.	Ebur
Fumaria	Adiantum omne
Castutha.	Ruscus & asparagus
Amygdalæ amaræ &	media esse possunt:
dulces, & cætera pro-	tenuitate tamen ef-
pè amara & dulcia,	sentia obstructio-
quæ ipsum tamen	nes liberant.
promptè obstruunt.	
præter saccharum &	CALIDA COM-
vuas passas.	POSITA.
FRIGIDA SIM-	Rosata nouella
PLICIA.	Antid. de aromati-
Lichen, id est, hepa-	bus.
tica.	Diarhodon abb. cum
Intybus vterque	speciebus
Cichorium omne, vt	Dianisum
scariola, cicerbita,	Diacyminum
hieracium, chon-	Diacalaminthe
drilla	Diospoliticum
Oxyacantha	Trochisci de rha bar-
Portulaca	baro.



FRIGIDA COM- ne speciebus

POSITA. Saccharum rosatum

Diasantalum &amp; violatum

Ceratum Santalinum Trochisci de caphu-

Diarhodum abb. si- ra.

## S P L E N I C A.

CALIDA SIM- FRIGIDA SIM-  
PLICIA. PLICIA.Thymus, Epithy- Cortex radicis Ta-  
mus Græcorum & maricis, & folia &  
Arabum fructusGenista flos Asplenum, id est, ce-  
Cortex radicis eius- terach

dem &amp; capparis Adiantum omne

Cortex medius fra Intyba &amp; Serides

xini, & Sambuci Semina quatuor fri-  
Scordium gida, magna & par-  
Chamædrys ua.

Chamæpitys Lacrymavit et folia.

Biglossum vtrum- CALIDA COM-  
que POSITA.

Rubia, Nasturtium Diacalamitæ

Asarum, Calamitæ Diacyminum

Acorus Acetum scillites

Agnus Dia hammoniæ

Hammoniacum emplastrum.

Bdellium FRIGIDA COM-

Castorium, &amp; ferè POSITA.

quæ hepar respiciunt. Diasantalum



Ceratum santalinum id est, de ben, & de  
 Acetum, præsertim hammoniaco, & si-  
 album, atque adeò milibus: ad scirrhus  
 destillatum, sed id lienis, vt ipsa bala-  
 calidius est. nus myrepica, apta,  
 Oleum balaninum, calidis addi potest.

### N E P H R I T I C A, C Y-

#### S T I C A.

#### CALIDA SIM- PLICIA.

Abrnotanum

Eryngium

Eruca

Vretica

Saxiphagum

Lithospermum

Iuniperi baccæ

Radix Appij,

Rusci

Asparagi, Fœniculi

Dauci, & horum se-  
mina

Cubebe, & propè Zingiber conditum  
 que hepati & lieni Oleum scorpionum  
 calida conducunt, Emplastrum de bac-  
 & vretica. cis lauri.

#### FRIGIDA SIM- PLICIA.

Plantago vtrique

Nymphæa vtrique

Hordeum

Semen psilij,

Lactucæ, Portulacæ

Intyborum & Seri-  
dum

Papaueris albi,

Frigida semina ma-

gna, id est, Peponū,

& Melopeponū, Cu-

cumeris, Cucubita,

Citreoli quæ vocant,

#### CALIDA COM- POSITA.

Zingiber conditum

Oleum scorpionum

Emplastrum de bac-

cis lauri.

Syrup. de duabus &

quinque radicibus.

Oxymeli scilites.

#### FRIGIDA



FRIGIDA COM- Violarum, & cete-  
POSITA. ra propè quæ hepar  
Ceratumfantalinum & lienem refrige-  
Syrup.nymphææ, rant.

H Y S T E R I C A.

CALIDA SIM- tia, & menses mo-  
PLICIA. uentia.

Arthemisia

Sabina

Calaminthe

Origanum

Pulegium

Parthenium

Melissophyllum

Aristolochia vtraque

Gentiana

Valeriana

Rubia

Ruta

Cinnamomum

Calamus Aromati-  
cus

Schoenu anthos

Spica

Myrrha

Opopanax

Moschus

Ambra, & cetera pro-  
pè renes calfacien-

FRIGIDA SIM-  
PLICIA.

Corallium vtrunque

Nymphæa vtraque

Bilauustum

Galla

Polygonium vtrunq;

Semperuiuu vtrūque

Porrulaca, & propè a-

lia, quæ renes refri-

gerant, & menses

supprimunt.

CALIDA COM-  
POSITA.

Diacalaminthe

Dianisum

Diambræ

Diasatyrion

Tryphera magna si-  
ne opio.

Oleum amygdalinū  
vtrūque, nardinum



Aromaticū moscha- FRIGIDA COM-  
tum POSITA.

Oleum rutæ, croci, Diasantalum  
philosophorum. Ceratum santalinū.

## ARTHRITICA.

CALIDA SIM- Castorium  
PLICIA. Cassiani-

Nasturtium,	Sinapi	gra	} admo ta em sunt ano- dyna.
Chamædrys		Stercus	
Chamæpitys		vaccinū	
Hermodactylus		Panis ca-	
Herba paralytis phlo-		lidus	
midum species		Sapa	
Scilla		Oesypus	

Rhaphanus

Enulla Campana

Origanum

Pulegium

Calaminthe

Porrum, Asarum

Ruta, Acorus

Terebinthina

Myrrha

Oropanax

Bdellium, Hammo-

niacum

Sagapenum

Styrax, Galbanum

Euphorbium

FRIGIDA SIM-  
PLICIA.

Acetum

Aqua rosarum

Myrti partes

Psyllium

Bolus Armenia

Intyba & Serides

Lactuca

Semperuium vtrū-  
que

Solanum

Opium

Hord



Hordei cremor	Oxycroceum
Folia hyoscyami pa-	Ceroneum
rum calfacta	Diachylon
Folia cicuta parua	Diameliloton
torrefacta.	Oxymeli scillites, &
CALIDA COM-	cætera quæ cerebrũ
POSITA.	& nervosas partes
Oleum auellandarum	calfaciunt.
& seminis arãtiorũ	FRIGIDA COM-
Oleum vulpinum	POSITA.
Oleum balaninum,	Oleum rosarum &
id est de ben.	de ranis.
Oleum ex lapide ga-	Unguentum popule-
gate, & styrace, & eu	um
phorbio.	Syrup. limonum, &
Oleum laurinum, &	cætera renes refrige
ex nucleis cerasorũ	rantia.
Oleũ Philosophorũ	Oxycraturum. i. posca.

Quoniam purgatrix facultas inter quartas quoque continetur, vt dictum est, pauca de purgationis ratione, & singulos humores purgantibus medicamentis etiam hic adscribenda sunt.

Purgatio est humorũ sua qualitate mole  
storum vacuatio: siue enim hi calidiores, fri  
gidiores, humidiores, sicciores, aut per cõiu  
gationem harũ qualitatũ à sibi mediocri  
temperamẽto recesserint idoneo ad sagui-

*Ga. Ap.  
2. lib. I.*



nis probi constitutionem, siue aucti immodice iustam sibi proportionem sanguini inculparo componendo necessariam supergressi sint, semper qualitate ipsa molesti videntur, ergo vacuandi: sed prius ad expulsionem apparatus. Corpora enim cum quispiam purgare volet, oportet fluida facere, hoc est, humores crassos tenuare, lētos incidere, & tergere, & fluxiles reddere, ac meatus aperire, per quos faciēda est vacuatio. Tūc autē concocta medicari, atq; mouere oportet nō cruda: quanquā verō hæc propriē coctionem à natura in morbis salubribus factam loquātur: abusuē tamen humorū expellendorum apparationem perdictam Medici etiam coctionem appellant, fortē quod crassum dum est tenuatum, habile magis est, vt à natura coquēte vertatur in alimentum, si quid in eo relictum erat benignū, reliquū ad expulsionem promptiorem secernatur. similiter dū lentū est incisum, & detersum, & fluxile. Eadem ratione practici addūt bilem flauam esse coquendam, vt quauis ad vacuandū sit maximē habilis ob caliditatē, tenuitatem, leuitatem: tamen ne eius vis tā furiosa partibus noceat cōtinentibus, aut in quas trahit, aut per quas excernitur refrigerantibus obtundēda eis videtur: quod etiam hoc modo si quid in ea benignum supersit, à nat

*Aphor. 9.*  
*lib. 2.*

*Gal. ibi.*

*Ap. 22.*  
*libro 1.*



à natura separetur feliciùs , ac coquatur , ac  
 minùs putrendo, quod prauum est mitescat:  
 suam fortè sententiam ex his Galeni atque *Aph. 59.*  
 Hippoc. locis tuentes. Tertianæ exquisita *libro 5.*  
 quæ lōgissimā est, septenis circuitibus fini-  
 tur, & ardētes die septimo per crises finiri so-  
 lēt, cocta à natura materia biliosa, & expul-  
 sa. Chamæmelum sanat febres biliosas, *Li. 3. sim-*  
 & ex cutis densitate natas, easq; percoctas. *pli. ca. 9.*

Signa coctionis prauorum humorum in  
 pleuritide per sputum, in affectibus ventris  
 inferioris per deiectiones, in febribus putri-  
 dis & affectibus venosi generis per urinas  
 colligit Hippocr. Galenus, in Aph. prognos-  
 ticiis, libris therapeuticis.

Humorem crassum & lētum & flatulen-  
 tum, & saniem acrem & mordacē in oculū  
 affluentē, & fluxionem à capite in pulmo-  
 nes, & lassitudinem tensuam, & phlegmo-  
 nōde, in libris de compositione pharmac.  
 particular. coquit Galenus. Crocus & Myr-  
 rha ibidem coquere dicuntur humores pra-  
 uos & præter naturam in pulmone & sto-  
 macho. Ergo morbi omnes, & materiæ o-  
 mnes prauæ coqui à Medicis interdū dicun-  
 tur abusue: nā propriè à calore moderato  
 in benignū rei coquētis alimentū versio est  
 coctio: quæ etiā in morbis sanguineis fieri  
 videtur, dum pus ex sanguine in phlegmo-



ne fit à calore etiam natiuo, & hypostasis in vrinis per febres: sed ea est imperfecta, cum à solo calore natiuo non fiat, verum etiam ab eo qui præter naturam est, putrefactio addatur.

*Li. 6. sim  
pli. in an-  
chusa.*

Quid quod bilis flaua seipsa interdum multo crassior efficitur, dum vitellina, ærugino-fa, isatodes euadit? An non tunc apparanda expulsiōi est? Aut cur Galenus extenuādis & tergendis humoribus biliosis anchusam onocleam subamarā sufficere affirmat? Afferrem Actuarium bilem coquere zulapils quibusdam in purgantibus bilem, nisi fæcē Arabicam respere ipsum vellē mox audire.

Medicamenta igitur purgantia humorē sibi familiarem tota sua substantia trahunt sumpta, & quod magis mireris, admota horum quorundam. Bilem enim flauam vacuant.

### CHOLAGOGA.

Aloë	men
Abſinthium	Sambuci & Ebuli fo-
Scammonium	lia, & semina
Fumaria Dioscorid.	Colocynthidis fru-
Thlaspis semen	ctus ficcus
Sesamoïdes vtrunq;	Empetrum & Poly-
Cucumer agrestis	podium eidem.
Pepli & Peplidos se-	Addunt cum Arabi-
	bus



bus recentiores,    Cassiam fistulam  
 Mannam, seu mel aë- Rha barbarum  
 rium                    Rosas, p̄cipuè dictas  
 Tamar Indos            vulgò incarnatas  
 Myrobalanos, præ- Violas nigras seu pur  
 fertim flauas            pureas.

## B I L E M   A T R A M.

Epithymum            Addunt iidem,  
 Pulegium            Lapidem Armenium  
 Tragoriganum        lotum Alex. Trall.  
 Parthenium            Lapidem stellatum  
 Armenius lapis        seu Cyaneum vul-  
 Centarium minus     gò lapidem laxu-  
 Elleborus niger, sed li  
 hic deiectione, vt al Sennam  
 bus vomitu.            Esulam.

Cap. 5.  
 Libr. 2.  
 simpl.

## P H L E G M A G O G A.

## P I T V I T A M.

Cnici semen            Ricinus  
 Coccum gnidium      Scammonium,  
 Hypophaes, Galenus Chamælaea  
 libro 1. fac. nat.      Thymelæa,  
 Lathyrus & Tithy- Sambucus  
 mallus omnis          Ebulus,  
 Cucumeris sylvestris Colocynthis  
 radice cortex          Elleborus vterque  
 Stryax pinguis & fla- Polipodium Diosco-  
 uus                      rid.  
 Daphnoïdes,          Addunt cum Arabi-



bus recentiores,	Sagapenum
Turbith	Opopanax
Hermodyctylos	Euphorbium.
Sarcocollam	

## HYDRAGOGA, A-

## QVAS DVCENTIA.

Granum gnidium e- i. facul. natur.

tia phlegmagugum Ricinus,

Galeno Lactuca sylvestris

*Libr. the.* Aes vstum, & lotum, Tripolij, & Hemero-  
*ad Piso.* aris flos, aris squa- callis radix  
 ma. Sambucus

Chamædrys,

Ebulus

Chamæleon, Gal. lib. Tichymallorū gñā.

## PITVITAM ET AQVAS.

Squama aris

Chamælea, etiam bi-

Euphorbium

lem.

Ex his patet, quædam etiam plures hu-  
 mores trahere, vel ob actionis vehemen-  
 tiam, vel ob diuersas in toto ipso substan-  
 tias diuersas. Nam trahunt.

## FLAVAM ET ATRAM

## BILEM.

Veratrum nigrum, quod etiā phlegma-  
 gugum quibusdam est.

Fumaria.

## BILEM VTRANQVE

## ET PITVITAM.

Peplium

Polypodium.

Bilem



## B I L E M E T P I T V I T A M.

Colocynthis	cus.
Elleborus albus	Thymus
Tithymallus	Ciclamini radix
Elaterium	Chamapitys
Agaricus	Empetron eadem, &
Aristolochia, Cle-	præter hæc aquas
matidis fructus sic-	Diosc. & Galen.

Sanguinem purgari tradunt porrorū capitatorū sacco mercuriali, viola alba, sylvestri malua, salvia, veratro albo, quod & bilē vacuat: nō quod illa sanguinē foras trahāt, sed quod vel ipsum ab humoribus corruptis expurgāt (qua ratiōe omnia propè purgātia medicamēta dici queūt sanguinē purgare) vel quod actionis vehementia ipsum trahūt in hypercatharsin: vel quod ipsum tenuatum calfactū ad venarū exitus promoueāt: qualia quæ sumpta hæmorrhoidas promouēt, menses cient, vrinas cruētas excitāt: hama-gogum inde dictū medicamentū, vt cicer, præsertim agreste, & alia multa Galeno in simplicibus. Quæ enim herba corpori ad-mota per poros sanguine educto homines *Li. 1. fac.* necabat, cognosci desūt magno mortalium *nat. & li.* commodo. Recipimus ergo medicamenta *theriaces* facultate quadā natina cōuenientē sibi suc- *ad Pison.* cum trahere, quomodo partes tam anima- *& lib. de* lium quàm plantarū singulæ alimentū tota *nat. hu.* subst



substantia sibi familiare, & amicum, & conueniens trahunt: & magnes ferrum, & electrum, id est, succinum, paleā, & alia huiusmodi à natua quadam facultate conuenientis attractrice.

*Galen. in  
theriaca  
ad Piso.*

Admiratione eadē dignum est, feras venenosas cum corporibus suis nostro sint inimicæ, & tam subito nos perimant, moribus à se factis succurrere & solas hominem à tali periculo vindicare: quod scilicet simile retrahat ad se sibi simile, suamq; substantiam in se reuocet. Quapropter à crocodillo lesis, ipsius adeps vulneri impositus, summo est præsidio.

Morsus muris aranei etiā lethalis sanatio, citra dolorem fit mure ipso trito & imposito. Morsus viperæ ipsa vipera trita & imposita sanat: & theriaca ipsa imposita, atque etiam sumpta, aliarum etiam ferarum omnium venenatorum moribus efficax.

Huc pertinet nonnullorum natua quædam totius substantiæ societas, ex qua si iungantur, & iuncta seruētur, vis quædam mira consurget. id quod maiorum experientia longa probatum pro experto & certo recipimus. Ob id composita medicamēta vsurpamus, quæ à prioribus Medicis iisq; insignibus vehementer commendata fuerunt: neq; negligimus, quæ recentiores experientia longa comprobarunt.

Quid



Quid quòd alexipharmaca quædam sic venena trahunt sumpta, si sumantur, aut ad-  
moueantur ictui vel morsui venenoso, vt  
venenum ipsis insidens videas.

*Libr. 5. c.  
ph. p.*

Nec solum venena trahunt, sed plurima  
etiam aculeos & spicula indolenter & cor-  
poribus nostris extrahunt, quæ nulla vi no-  
stra educere antè licebat.

Vt autem rebus quibusdam magna inter  
se est cognatio, naturarumque similitudo  
(quod præter dicta generationes quoq; ani-  
maliû, & insitiones plantarum ostendunt,  
vt Hippocrates docet lib. de natura homi-  
nis) ob quam hoc illud trahit, hoc illud non  
lædit: vt euphorbium ventrem ouium so-  
lum non erodit, vt in eo seruari possit, qua-  
liter in folliculo suo bilis: ita aliis odium  
est manifestum non modò animalibus in-  
ter se, sed etiam plantis inter se, & plantis &  
animalibus in homines, & in certas quasdam  
hominum partes, aut partium affectus.

*Libr. 9.  
cō. pha. p.*

Brassica & hederæ, viti & ebrietati ad-  
uersantur.

Allium magneti affricatum, & oleû suc-  
cino, attractionem horum peruertunt, &  
ille ferrum abigit, hoc paleas etiam oleo  
imbutas.

*Libr. the.  
ad Pison.  
& initio  
c. ph. g.*

Cantharides vesicam peculiariter & so-  
lam afficiunt.

Lepus



Lepus marinus pulmones solos ex omnibus animalis partibus ulcerat.

Cicuta homines occidit, sturnos nutrit, nec vim lethalem in his exercet.

Veratrum homines corrumpit, coturnicum cibum est.

Amphisbena animal biceps si grauida fuerit supergressa, male abortit.

Stellio scorpiones vivos substringit, & ita perimit.

Basiliscus belua subflava triplici frontis apice munita, visus etiam solum, aut sibilo auditus, homines necat: ipsam autem beluam mortuam si quod animal attigerit, subito moritur. Ob id omne aliorum animalium genus propinquitatem ipsius deuorat.

Vsta muriu capita, & ex melle illita alopeciam curare possunt. Capita apum & muscarum vsta alij similiter adhibent eodem successu. Stercus murium cum aceto illitum idem potest.

Viperæ pellis in puluerem redacta, imposita alopeciis, pilos mirifice regenerat.

Caput leporis vstu cum adipe ursino illitum. Hedera, brassaica, raphan<sup>9</sup> naturali facultate ebrietati resistunt, & vitibus, ut dixi, sunt

inimica, ut si circum se ferantur, diffugiant.

Palmule proprietate quadam capitis dolorem faciunt.

Pæon



Præniæ præsertim maris radix recens collo appensa, cōtactu carnis calfacta, olfacta, continuo epilepsiam sanat: huius tamen rationem reddit Galibidem.

Cameli aut mustellæ cerebrum siccum *Libr. th.*  
ex aceto potum epilepticis medetur. *ad Piso.*

Castoris testiculi poti, conuulsioni remedio sunt. *Ibidem.*

Hirundinis cerebrum ex melle illitum *Libr. th.*  
ad suffusiones facit. *ad Piso.*

Fel hyænæ illitum suffusionem discutit, *Ibidem.*  
visum acuit.

Aspidis exuium tritum & illitū ex melle, visum facit acutissimum. *Ibidem.*

Accipiter in vnguento susino coctus herbæ visui medetur. *Ibidem.*

Cantharus, id est, scarabeus oleo incōctus, auri instillatus eius dolores sanat. *Ibidem.*

Stercus canū solis ossibus biduo pastorū, *Lib. 10.*  
ob id durum, albū, neq; grauitèr olēs, optimū est in crustis oris, & anginis: strenuè enim iuuat, nec vllam habet insuauitatem. *simpl.*  
Eoq; siccato, leuigato p cribrū medicinale creto, Mus Medicus plurimū vsus est, cuius testimonia maximi facit Galenus: additq; hoc medicamento se nullum nouisse valentius, neque in anginis, neque in paristhmiorum phlegmone, aut tonsillarum magna adeo, vt suffocationis sit periculum.

Item



Item in dysenteriis, & summè inueteratis vlceribus & summè malignis. Idem digerit & desiccatalios affectus. Quod experientia longa & ipse, & eo priores Medici probauerunt ad anginam quidem mistum aliis huic affectui cōuenientibus: ad dysenterias verò cum lacte probè cocto postea per calculos ignitos vel ferrum candens vstulato.

*Libr. 10.  
simpli.*

Stercus pueri triduo nutriti lupinis dulcibus, aut gallinis, perdicibus ex aqua, aut tenui iure probè coctis, pane bene cocto cum sale pauco, & fermento, & vino vetere tanto, quantum perfectè possit coquere, ipso die tertio primum acceptum, siccatum, leuigatum, cum melle attico illitum (insufflatū Gatinaria) statim sanat gutturis phlegmonas sine venæ sectione: cuius experientiam certissimam saepe vidit Gal.

*Alexā-  
der Ap.  
initio pro  
ble.*

Hæmodiam, id est, dentium stuporem ab acidis & acerbis & austeris natum, vt lib. de optima secta, portulaca esu sanat, causa eius effecti nobis incognita: huius tamen causam reddit Galen. libr. 6. simpl. & Arist. prob. 38. sect. primæ.

*Libr. the.  
ad Pison.*

Ceruinum cornu, aut bouis astragalus vsta, cum vino trita. denti vacillanti circumlita eum confirmant.

*Ibidem.*

Veruecis cerebrum ex melle illitum infantium dentitioni utilissimum. Idem præstat



stat mel & butyrum, gingiuas tamē tenuā-  
do, Gal. lib. 10. simp. Item & cerebrum le-  
poris cum capite toto elixum, lib. 11. simpli.

Coctionem ventriculi iuuare, & stoma-  
chicum esse ventrem mergi, vel elixum, vel  
siccatum & sumptum, & tunicam interiorē  
ventriculi gallinarum siccata & potā, fal-  
sum est expertus Galenus: tamen in ea pro-  
missione vana etiam hodie perseuerant, qui  
principes Medici habentur. *Li. 11. sim-  
plic.*

Iaspis virens os ventriculi adhæsu re vera  
iuuat proprietate quadam. *Lib. 9. sim-  
plic.*

Astragalus bouis vstus cum lacte potus  
lumbricos rotundos educit. *Lib. 11. ad  
Pis.*

Vaccini lactis potus dysentericos iuuat. *Ibidem.*

Hepar lupi hepaticos tota substantia iuua-  
re sufficienter se expertum dicit Gal. libr. 8.  
comp. ph. part. & hodie hepatis eius ficcati  
puluerem cum vino albo dant hydropicis,  
tanquā secretum aliquod remedium. Id  
tamen hepar lupi mistum medicamento he-  
patico (quod ex eupatorio fit) minimo id  
efficacius reddidit. Dabat autē Galenus læ-  
uigati hepatis lupini drachmam vnam cum  
vino dulci, vt thereo Cretico, vel mulso  
protropo, id est, quod defluit antequā vix  
calcentur. Nam id grātū hepati, quia ipsum  
nutrire potest, ac medium est inter calidum  
& frigidum. Si verò febris adsit, datur cum

*Li. 11. sim-  
plic.*

*Lib. 8. cō-  
ph. part.*



aqua calida, aut succo fereos, vel simili.

*Asclepi. a-*

*pud Gale.*

*lib. 8. cōp.*

*ph. part.*

*Lib. th. ad*

*Pison.*

Caro trium κοχλίων, id est, cochlearum, multum tusa cum vini nigri cyathis tribus calfacta, pota, hydropicos tota substantia non vna aut altera qualitate iuuat.

Affecto iecori eupatorios herba strenue auxiliatur: id autem quia astringendo hepar roborat, & tenuitate essentiae, ac incidendo & tergendo citra calorem manifestum obstructions eius liberat. Pistacia hepatis obstructo conferunt.

*Lib. 2. alim.*

*Lib. 8. cōp.*

*ph. part.*

*Lib. th. ad*

*Pison.*

*Ibidem.*

Vua passa tota substantia est familiaris hepatis, ut alimenta omnia cum nutriendo corpore habent proprietatem quandam secundum totam ipsorum substantiam.

Stercus bubulum aridum vstu tribus cochlearibus potum hydropicos iuuat.

Lumbrici terrae, quae γῆς ἐν Ἰσραῆλ, id est, terrae intestina vocat, Gale. ex melicrato potu ieterum purgatione mox liberant.

#### COLICA.

*Lib. 10.*

*simplic.*

Stercus lupi osibus passu, ob id albidius, supra frutices, vepres, herbas altiores prima aestate repertum non in terra: potum cum pauco sale aut pipere, aut alio simili. ex vino albo tenui, vel aqua, & (quod mireris) ad λυχῶνας, id est, ilia appensum dolores colicos



licos citra phlegmonē perſanat, aut ſaltem plurimū mulcet, & his ita præcauet, vt non redeant: vel ſi redeant, tardius & mitiores multò redeunt, etiam ſi ipſum ſtercus teratur cum oſſibus deuorati animalis nō præmanſis nec concoctis. Appendendum verò vinculo & cingulo ex lana ouis à lupo mactatæ, vel ex pelle ceruina, vel quauis alia materiā. Umbilico infantis inter telas confuto & appenſo ventri idē hodie tribuitur, & certiffimum affirmari audio.

κορυδαλλο, vel κόρυδος ὄψις, id eſt, gale- *Galen. in*  
rita aſſata vel elixa, ſi aſidue edatur cū iu- *ther. ad*  
re, colicos ſæpe plurimū iuuare expertus eſt *Piſ. et lib.*  
Gal. Hæc auis puſilla, in capite gerit ceu ga- *II. ſimpli.*  
lerum ex pilis erectis natum, nobis ob iter  
plerunq; obuia. Marcellus Empiricus hupū  
pā accipit, quòd apicem in capite gerat, pa-  
uonum modo, vt Dioſcorides ait in cory-  
dalo, cui κορυδαλλός opinor mendosè pro κο-  
ρυδαλλός iuuare ſcribitur: ſed hupupa ὄψις  
ὀρνιθίου μικρόν, id eſt, auicula parua, quātam  
Dioſc. & Gal. corydalon affirmāt. Vires eaſ  
dē ad colicos dolores & nephriticos tribuūt  
periti, & probatiſſimas pulueri auiculę no-  
bis frequētis (quā vulgus meſenguā vocat.)

Stercus gallinæ cum ænomelite vel ace *Libr. 10.*  
ro, vel vino aqua diluto, colicum dolorem *ſimpli.*  
diuturnum ſanat.



## S P L E N I C A.

*Lib. th. ad.* Astragalus bouis vstus ex oxymelite potus lienem absumit.

*Piso.*

*Ibidem.* Myrobalanus ipsa splenem iuuat.

Asplenium, capparis, tamarix tota substantia familiares lieni plātæ ipsum iuuant, & liquant, & absumunt tumentē: quin vsu multo asplenium ipsum consumit omnino.

## N E P H R I T I C A.

*Ibidem.* Sarxiphagō & betonica renes iuuant, vt alia aliarum partium propria medicamenta.

## C Y S T I C A.

*Ibidem.* Scorpius assus cum pane comestus, vesicæ calculos conterit: & lumbrici terræ ex vino sumpti, & murium stercus potum.

*Ibidem.* Vesica caprina aut ouilla cremata, ex posca pota: aut leporis testiculus ex vino odore coctus, potus his qui vrinam inuiti reddunt, benefacit.

*Lib. 9. cō.*  
*ph. parti.*  
*in fine.*

## V E N E R E A.

*Lib. th. ad.* Renes scincorum poti, pudenda intendere creduntur.

*Piso.*

*Lib. II.* Bouis astragalus vstus, tritus, potus mediocriter venereus est.

*simplic.*

ART



## A R T H R I T I C A.

Caput milui sine plumis vstum cū aqua. *Lib. th. ad*  
quantum tribus digitis capi potest, podagri *Pis.*  
cis auxiliatur.

Lumbrici terræ cū rosaceo cerato illiti,  
podagricorum inflammationibus conue-  
niunt.

Erinacei terrestris caro siccata, pota ele- *Libr. ii.*  
phanticis, cachectis, conuulsioni obnoxiiis, *simplic.*  
nephriticis, anasarcicis auxiliatur: quia va-  
lenter digerit, & siccatur.

Mustelæ caro siccata, pota, epilepticos *Ibidem.*  
iuuat eadem ratione.

Elurorum salicorum caro trita palos &  
spicula extrahit, tūquā trahēdi vim habeat.

Myacum id est mutulorum caro morfi-  
bus canum medetur.

Cochlearum caro pertrita valēter siccatur  
etiam hydropicos: & mucus ex ipsis haud  
ita pridem captis stylo confixis emanās cū  
thure vel myrrha, vel aloē, vel quibusdam  
horum, vel omnibus ad cerati crassitiē coa-  
ctus aures purulentas desiccatur: & fronti affi-  
xus, oculorum fluxiones.

Cochlex cum testis tuse palos extrahūt,  
& menses sistunt. Caro ipsius sola vulne-  
ri etiam neruorum imposita sola pulchrè  
glutinat, & sine phlegmone in homine etiā  
duro & agresti addita farina volatili, & si



vis, thure, myrrha, resina fricta: hęc initio libri vndecimi simplicium. Horum tamen causa quxdam reddi potest, quod scilicet digerant, siccant, trahant calore.

Lignum Gaiaci (quod vocant) scabiem Hispanam tota sua substantia sanare quibusdam videtur, cum tamen in eo sapor sit amarus & acer, non inualidus: vnde vim habet incidendi, tenuandi, tergendı, & purgandi, per quas facultates vacuat vrinis, sudore, vomitu, deiectione, insensibili trāspiratu, putrem ex contagione materiam: sepe tantum spirituosam, cum recens est contagio, nec vehemens, & spiritus affici contumaces: sepe simul etiam humidam, cum in vasa ipsa & corpus mali labes iam grafatur. Cui corruptelę nisi occurratur per alterantia & vacuantia, etiam in partes solidas impetus fit, easque putredo occupat, ferro sepe & cauterio tantum curabilis: quomodo ex diariis in affici promptis transitus fit in putridas, ac interdum in hecticas febres, nunquam si absolutę sint, curabiles. Neque victus tenuis & tenuans, catapotia Aegidiana, aut illitus ex argento viuo, suffitus ex cinnabarifactitia, vel herbarum digerentium & tenuantium decocto (quę sunt alia hodie consuetissima mali huius remedia) ratione alia quā corruptę



ruptæ huius, materiæ totius vacuatione  
luem istam perfanant.

Taurini cornu rasura cum aqua pota san-  
guinis eruptionem cohibet.

*Lib. th. ad*

*Pison.*

*Ibidem.*

*Μαγοί*, id est, femora vsta idem præstant,  
& aluum solutam sæpe sistunt.

*Ibidem.*

*Ibidem.*

Hippopotami cutis vsta, læuigata, ex a-  
qua corpori admota panos digerit.

*Libr. II.*

*simpli.*

Adeps anseris & cerui medulla ex rosa-  
ceo phlegmonæ medetur, & dolorem mi-  
tigat.

Cinis cancri fluuiatilis substantiæ pro-  
prietate mirabilis in morfu canis rabidi: &  
alysson herba antè dicta, libro sexto sim-  
plicium.

Ex his patet à partibus animalium qui-  
busdam morbos quosdam curari: quin ipsa  
etiam rota eorum corpora affectibus qui-  
busdam auxiliantur. Cancer enim flu-  
uiatilis tritus illitusque spicula & surcu-  
los extrahit, quod etiam carni filuri piscis  
saliti tribuit Dioscorides & capiti saura-  
rum trito Galenus libro vndecimo sim-  
plicium, & aliis præterea multis hanc tra-  
hendi facultatem vterque certam adscri-  
bit.

Sunt enim medicamenta parti-  
bus quibusdam amica, alia iisdem inimi-  
ca, alia his atque illis affectibus idonea,  
vt abundè docuimus. Ne mireris igi-

*Zib. I. cō.*

*ph. gen.*

*Lib. th. ad*

*Pison.*



tur, partes viperæ medias theriacæ imposi-  
tas, vim illi efficacem tribuere ad resistendū  
morsibus viperæ, & elephantia, & aliis per-  
multis affectibus. Adde quòd quædā sim-  
plicia medicamenta ex tota ipsorum sub-  
stantia vnā quandam & simplicem habent  
virtutem, cuiusmodi ferè sunt prædicta. Alia  
mixtam in tota sua substantia facultatem ha-  
bent, & duplici actione funguntur, tam ma-  
nifestè sæpe, vt etiam quàm maximè con-  
traria ab eis in corpore fieri videamus: atq;  
id miraculum esse vidètibz apparet, & in-  
opinabile quibusdā audientibus ac impos-  
sibile putatur, nisi viderint.

Lapathi enim folia ventrem cient, semen  
assumptum stringit.

*Ibidem.* Brassicæ, lentium, ostreorū, ostracoder-  
*Ibidem.* morum omnium, & gallorum vetulorum  
*li. 1. alius.* ius & decoctum sumptum, aluum soluit:  
ipsum autem singulorum corpus sumptum  
ventrem comprimit.

*Lib. II.* Gallinarum ius simplex aluum sistit: gal-  
*simpl.* lorum ius cum sale prolixissimè coctorum  
*Lib. III. ad* subducit.

*Pison.* Aloë & squamma æris supercrescētes vl-  
*Li. 3. tēpe-* cerū carnes astringūt. & humores sub his na-  
*vament.* tos subinde siccant: assumpta autem per os,  
corpus totum purgant: quia nihil est, quod  
sumptum & admotū vires habeat easdem.

Serum



Serum lactis potum aluum soluit, caseus sumptus ipsam cohibet.

Proximum autē miraculo est trifolium herba hyacintho similis, quando vere flores emittit, & semen habet *κνίαν ἀγρίαν* simile, hæc enim decocta multū, & moribus phalangij aut viperæ ex aqua fotu admota ipsis medetur, & dolores statim sedat. Eodē verò fotu in alio non morso parti sanæ sensum similem, & dolores similes his quos morsus inuehit, omnes excitat: morsus itaq; sanat, & ferarum modo partem affligit.

Quis omnia hæc non modo cognoscenda Medico, sed etiam admiranda non iudicat? Neque solum animalibus ipsis inter se, & ipsorum partibus quibusdam & plātis & metallicis quibusdam secum, aut cum aliis magna est naturæ societas aut contrarietas: sed quod etiā saxeus admiretur, sonis ipsis aut corporibus sonoris inter se tanta est cognatio, ut sibi similibus delectari videantur: fide enim testudinis quavis, quo voles modo attemperata, si correspondentē ei in testudine altera ipse attemperas, intendendo & remittendo, cum sonum edet similem sono alterius tibi antea non audito, altera illa velut exultans concutitur, tanquam simili suæ attemperaturæ sono gaudens harmoniaq;. Eam verò ipsius concussionem festu-

t s



ca tenuis illi antè imposita apertè declarabit. Multò maiora his miracula Deus optimus maximus etiã in hac rerum mundanarum face excitauit, quorum fidem certissimã experientia quotidiana perficit, qua sola percipiuntur, quæ totius substantiæ similitudine aliquid perficiūt, nullaq; methodo planè constant, nec ratione actio illa inuestigari potest, quãuis in quibusdam reddere conetur Galenus: vt in pronia & alyssovim siccãdi & digerendi insignem tribuit, quibus ad curandam spumam opus est, sed sumptum alyssum etiam agit & fanat rabidum ipsum canem & hominem.

Hec fusiùs tractare poteram, & collocupletare remediis propè infinitis tota substantia operantibus, quæ partim ab a his scribuntur veteribus, partim à neotericis & practicis, partim hodie in vsu sunt frequentissimo rusticorum, nisi libri magnitudinẽ immodicam fuissẽ veritus. Adde quòd non statueram librum substituere de his quæ proprietate substantiæ totius quid agunt, quem Galenus aliquoties est pollicitus: an verò eum præstiterit, ignoratur: nondum tamen inter eius opera comparet. Id aliquãdo aut mihi aut alteri latius fundere licebit & elegantius maximo mortalium emolumento. Nam illa & celerius & multò certius quod possunt

*Lib. 6. sim  
pli. in alyss  
so et alibi.*

*Libr. II.  
simplic. in  
cancro flu  
uiali.*



possunt præstant, quàm quæ qualitatibus manifestis agunt, neque tanta egent aliorum simplicium mistione, per quæ melius agant, aut sine quibus non agant, aut per quæ conferuentur. Licet eorum quædam *Libr. II. simpli.* aliqua ex his postulent, vt cancrorum fluuiialium cinis morsum canis rabidi cū thure & gentiana præstātius multò curat, quàm per se & solus: ne putes cum quibusdam ea si miscentur, vim suam perdere.

Medicamenta hæc, quæ secundum aliquam totius substantiæ proprietatem agūt aliquid, siue sumpta, siue admotā, siue etiam appensa, experiētia sola sunt inuenta, & eadem probanda, an id præstent, quod ipsis tribuitur.

Horum tamē non paucorum ratio quædam reddi possit, vt quòd omnia facultate *Libr. 10. simplic. in sang. ve-* incidenti prædita olfactu vel potu iuuant *spertilio-* epilepticos: qua ratiōe præonia his salubris, *nis.* quæ tota substantia id facere aliis dicitur: item portulacæ hæmodiam ab acidis, acerbis, austeris natam curātis, causa incognita Aphrodisæo initio problematū, declaratur, Aristot. sect. 1. probl. 38. & Galen. libr. 6. simplic. & lib. de opt. secta. His probatis fides *Li. 1. sim.* est habenda: non autē incantationibus verbosis, nec vocibus barbaris, quas præstigitores vsurpare consueuerunt.

M E T



DE MEDIC. COMPONEN.  
METHODVS COMPO-  
NENDI IN QVATVOR  
CONSISTIT.

**P**Artem operis hoc libro secūdo institu-  
ti tertiam aggrediamur, & doceamus,  
in quibus componendi medicamenta ratio  
*Qualitas,* consistit. Ea verò vt reliquorum compo-  
*quātitas,* nendorū in tribus potissimum versatur, re-  
*tēpus cau* rum scilicet miscendarum delectu, earundē  
*sarum sa-* quantitate, & forma compliri furura. Quæ  
*lubriū, ca.* tria etiam in quouis medicamento tā com-  
*85. artis* posito quā simpliciter sumendo, aut admo-  
*medicæ,* uendo obseruanda sunt. Deligitur enim  
*et alibi* hoc vel illud medicamentum. verbi gratia,  
*passim.* purgatorium, & datur hac vel illa quātitate,  
te, & forma vel catapotiorum, vel potionis,  
vel alia, quæ agro gravior, & fini proposito  
aptior fuerit.

Porro miscendæ res composito medica-  
mento deligendæ sunt, quæ plurimæ qua-  
tuor. Hæ quæ affectū præter naturam, hoc  
est morbū, morbi causam, symptomata abi-  
gant, aliæ, sine quibus priores affectum abi-  
gere nequeant: alie tertio, per quas melius  
primæ affectum tollat: postremo etiam mi-  
scendæ, quæ dictas tres miscendorum diffe-  
rentias foueant, & diu integras seruent. Ad  
hæc quatuor referendi sunt scopi omnes cō-  
ponendorum medicamentorum, siue ipsa  
vnic



unicum habent effectum, siue multiplex, ut  
theriaca, in qua multe sunt particulares co-  
positiones, singulae affectibus quibusdam  
peculiariter efficaces. Quae quatuor, omni-  
bus insunt aliquid efficiētibz: ob id in sin-  
gulis corporis instrumentis, id est, partibus  
actionem aliquam edentibus, à Galeno in-  
quiruntur in lib. de usu partium, ut in oculo  
visionis instrumento, humor crystallinus  
est primaria visionis causa, ceterae oculi par-  
ticulae sunt, aut sine quibus visio non fiat,  
aut per quas melius fiat, aut à quibus cæte-  
rae conseruentur. Pretiosiora verò diuiti-  
bus, viliora pauperibus deligenda, ut post  
multis ex Galeno exemplis cognosces.

Veruntamen ut in nostri corporis instru-  
mentis particulae multae usum eundem saepe  
praebēt generalem, ut oculum vena, arteria,  
neruus, & quae ipsum ambiunt ossa, conser-  
uant, alia tamen atq; alia ratione (Nā vena  
ipsum nutrit sanguine, quem defert, arteria  
etiam caloris in eo natiui tēperiem seruat:  
neruus motum dat voluntarium musculis:  
& tactus sensum, etiam oculi tunicis ad di-  
gnotionem tristatium: ossa ipsa supercilio-  
rum, pomorum, zygomatis, nasi à foris oc-  
cursantibus tuetur) ut libr. de usu partium  
docetur. Sic in medicamentis compositis  
multa saepe simplicia idem, ut videri potest  
cuius



cuipia, pollentia miscentur: sed tamen quae  
particulatim nonnihil differant viribus, ve  
saltem maioris & minoris ratione diuersa  
sunt. Adhuc ut idem polleant, hoc vni parte  
est familiare, illud alteri. Sed de his poste  
fufius. Contra in nostris organis pars vna  
interdum subit vsuum duorum, vel trium, ve  
etiam quatuor simul rationem, ut lingua  
tunica per se sapes discernit, sensus in ea  
gustatorius, aut potius animalis in ea spiri  
tus est, sine quo non discerneret, nisi etiam  
ab ipso potissimum discerni contendas.

Eius tunicae raritas est, per quam melius  
humores sapore praediti in ipsam tunicam  
recipiuntur. Eodem pertinet tunicae huius  
puritas, ut nec bile, ne pituita multa crassa,  
nec alio humore praesertim saporis aliquem  
insignem (qualis est falsus, amarus) sortito  
imbuta & tecta occursum & penetrationem  
rei gustandae prohibeat. Sensus autem gu  
status & tactus eadem tunica seruatur, quo  
vitat calidiora, frigidiora & caetera noxia,  
excipit dulcia & sibi familiaria.

Eodem plerunque modo in medicame  
to vno simplici hi quatuor scopi inueniun  
tur, ut in casia per se data: interdum in duo  
bus, ut in rha barbaro cum terebinthina:  
nonnunquam in tribus, ut cum praedicto pa  
nis azymus additur: est quando in quatuor  
simul



simul mistis, verbi gratia, in tetrapharmaco, ut singula vnicum habeant scopum.

Cum igitur medicamenta composita fiant omnino præstantissima, tum ob simplicium quæ iniiciuntur probitatē, tum ob mistorum virtutis proportionē, magna utriusque habēda est ratio: non neglecta interim forma compositi, quæ quātam vim habeat, postea dicemus. Vnūquodque autē est præstantissimum, quod proprium generis sui odorem & saporem habet valentissimum, ut de croco, casia, cinnamomo, styrace, & ceteris in theriace, & passim in aliis compositis obiter admonebimus. Proinde optima quæque à medicinalis materiæ peritis vno consensu commēdata, sæpe & diu tibi spectāda sunt, ut noscas, & ab aliis deterioribus secernas, odore præsertim ac sapore: quāuis & color in nonnullis rectē deligendis non parum conferat Dioscoridi & Galeno, sed etiam & locus. Ob id postquā traditas ab utroq; in singulis simplicibus notas obseruaris, maximum est inspicere, in qua regione vnumquodq; ipsorū gignatur præstantissimum, in eāmq; tibi est proficiscendum, ubi optima sunt singula: ut Galenus in Cyprum vectus, cadmiā largā, diphryges, spodidū, pompholygē, calcitin, misy, sory, chalcanthum retulit: ex Syria verò Palæstina, opob

*Ga. initio  
lib. de ant.*

*Li. 9. sim.  
et de ant.*



opobalsamum: ex Lemno, terrā seu sphragidem Lemniam (cuius solius gratia in Lemnū nauigarat) tanta copia attulit, ut tota vita illi sufficerent. Quod si ad regiones eas proficisci vel nauigare nō detur, saltem *Lib. 2. cō. ph. gen.* per amicos fideles indidem accipe, uti Galeno ex omni natione, prastatissima quotānis afferebātur amicorum fidelium cura & industria. Nam perditī horū coemptores omnia vitiant, & variis modis contaminant.

Quæ autem in singulis regionibus prastatissima gignantur, Dioscorides libris 5. & alij celebres viri descripserunt: ut,

Irim	} Illyricam.	Chamadryn	} Creticum.
Ami		Chamæpityn	
Phu		Hypericum	
Castorium	} Ponticum.	Daucum	
Agaricum		Gentianam	
Bitumen		Anisum	
Opobalsamum	} Iudaicum.	Thymum	
Petroselinum		Thlapsi.	
Meu Hispanū &	} Macedonicum.	Aristolochiā	
Cuminum,		Veratrū nig.	
Elemium	} Aethiopicum.	Glycyrrhizā	
Elleborum &		& succū eius	
propè cetera calida, tenuiū partium.		Scordii, &	
	} Ex editis & siccis locis.	alia permulta, de quibus paulo post, & libr. 3. &	
		4. in theriace dicam.	

Hy



Hyssopum, { Montana hortens. &  
 Calaminthe, { campes. melior.  
 Amomum, { Scythicum, ibidem.

Hyssopum, Cilicium, Dioscor. Creticum  
 Archigenes, lib. 8. comp. phar. part.

Sic medicamentum purgans bonum de-  
 cernit Mesues tota sua substantia per longā  
 experientiam cognita: quæ etiā mala quæ-  
 dam iudicauit, aut toto genere, qualia sunt  
 daphnoides, lathyrus, euphorbium, sagape-  
 nū, & alia violētiora: aut specie accidentalī,  
 vt turbith nigrum, agaricū nigrum, colo-  
 cynthidem vnicam in planta, scāmonium  
 de regione Scenitarum. Bonum quoq; deli-  
 git sapore nobis iucūdo & odore familiari,  
 & colore nō ingrato. Contrariū reiecit, ceu  
 naturæ nostræ aduersum, aut parum propi-  
 tium, vel mistis aliis corrigit. Item in pro-  
 priè purgatoriis attrahendo scilicet ea præ-  
 fert, quæ rariora leuiora, & igni propiora: vt  
 agaricū, scāmonium, colocynthidē, aloēn,  
 turbith, polypodium, præter pauca quedā,  
 vt cassiā fistulosam, cnicum, ricinum, irim,  
 hermodactilos, lapidem cyaneum & Arme-  
 nium, quorū bonitas præcipua in grauita-  
 te consistit, eorum plenitudinem aut natu-  
 ralem substantiæ compactionem declaran-  
 te. Quæ dos rha barbaro, absinthio, my-  
 robalanis comprimendo etiam purgātibus



adest. Nec parum illi ad delectum conducunt tempus collectionis & custodiæ, ac locus natalis, & conseruationis.

Dulcia, insipida, stiptica, vomitoria, rara, virtutem nacta aut superficiariâ, aut imbecillam: vt violas, rosas, fumariam, adiutum, lupinos, recentia præfert veteratis. Contrâ autem acria, densa, virtutem validam aut penitiorem fortita, quò vetustiora eò valentiora putat, modo ætate longa non sint exanimata. Dulcia verò & falsa ætatis mediæ commendat.

Sic cœlum pluuium plantis calidis siccis vires minuit, frigidis humidis auget: calidû verò siccum contrâ. Quapropter & Galenus in antidotis plantas Creticas plurimas cæteris præfert, vt paulò antè dixi: quibus tamen, inquit, non cedant Italicæ, præsertim ex locis editis, & dum cæli constitutio humida non fuit. Ob hæc plantæ humidiores in locis humidioribus humidissimæ euadût: in ficcioribus tēperatiores, vti & animalia.

*Aphor. 2.* Quod Hippocrates dicebat, naturarum hæ  
*li. 3.* quidem ad æstatem, hæ verò ad hyemem  
*Li. 9. met.* bene malè se habent. Sub cœlo regionem & situm vëtorum comprehendimus. Neque omittenda est alimenti cuiusq; proprietates, quam plerunque vitiat soli natura, aut cœli, aut aliarum rerum, vt fimi, sterco-

ris.



ris, plantarum odio dissidentium: ut contra quædam perficiunt: sic thaphanus aut scilla hermodactylum meliorem facit, & hyssopus epithymum, & quercus polypodium: contra, lathyrus scammonium vitiat, & brassa vitem.

Purgantia cum his reponantur & vsurpentur, quæ vim eorum meliorem & tutiorem efficiunt, non augent verò acrimoniam. Ne iunge igitur scammonio lathyrin, vel tithymalli genus aliquod, sed mastichin & spicam, quæ omnia acria medicamenta corrigunt. Purgantia ex herbis ante triennium ferè læguent, præter utrunq; elleborum. Virtus igitur simplicium à regione proficiscens non est negligenda: quavis calidæ tenues ex Creta plantæ, si sint Italicæ aut similes sunt, aut non multò Creticis inferiores, si ver totum æstatis modo siccum fuerit, nec plantæ ipsæ multo imbre irroratæ.

Medicamenta itē deligantur omnia in suo Li. I. ant. vigore, & eadē bene habita: fugienda autem ceu ignobiliora quæ in suo genere sunt tenuiora & graciliora, aut enormiter procera: quòd illa viribus, alimentum penuria careant: hæc verò vires alimenti copia obrutas habeant. In quolibet enim genere præstant, quæ nec rugosa, nec exilia, neq; modum excedentia,



sed quæ bene nutritâ & constrictâ habent substantiâ. Ob id nec crocû nec scillas, nec vi-  
peras vel emaciatas vel immodicè magnas  
ad theriacè Galenus expetit, sed mediocres.

Eadem verò proprium generis sui odo-  
rem habebunt valentissimum, & in gustus  
qualitate proprietas cuiq; generi sua, si præ-  
polleat, optimum declarat medicamentum,  
præsertim ex plantis sumptum, nec his om-  
nibus, cum quædam sint, quas citra pericu-  
lum, gustare non liceat. Viperæ verò & alia  
quædam medicamentorum genera notis  
aliis suo loco partim dictis: partim dicendis  
præstantissima deligentur.

Sic primæ notæ virtutis propriæ mellis  
ex sapore dulci & acrisumuntur, quæ utrū-  
que si habet valentissimum, quatenus melli  
datum est, optimū est mel, modò adsint aliæ  
quoq; notæ ab odore, colore, consistētia, &  
partium coalitu: ut videlicet sit etiam palli-  
dum, aut subflauum, odore iucundo in thy-  
mum inclinante, non improbè thymum re-  
ferēte, quia id thymo minutim inciso adul-  
teratum est: substantia item neque crassum  
sit & grumosum, neque nimis liquidum,  
sitq; vnitum per totum & glutinosum, ut si  
digito attollatur, visci modo longissimè  
*Li. the. ad* continuitatem seruet, nec abruptum à se  
*Pisonem.* diuellatur. Hęc enim mellis optimi ex pecu-  
liari.



liari eius natura sunt perpetua accidētia. Sic cætera compositionē faciētia medicamenta singulatim & accuratè explora, quia vnus cuiusdam vitium sæpe omnia corrumpit.

Ob id in cæteris simplicibus medicamētis saporem & qualitates cæteras sensibiles re ipsa nō lectione sola explora: nam experientia longa cuiusq; medicamenti facultatem indicat. Sic mellis quoddam genus est inuentum, quod largius coctum & despumatum, aut etiam citra hanc coctionem sola vetustate in vinosam qualitatem transit, à quo theriaca vinum odore & sapore mētitur, quæ minùs proba est: quemadmodum etiā improbatur, quæ acido est sapore, aut ex vino nec optimo nec vetere, aut ex pane malè cōfecto & largiore copia misto cum carnibus viperinis. Sed de his suo loco.

Fructus item plantarum deligantur non modò, vt diximus, bene habiti, fœcūdiores, substantia cōpactiore, ex regione legitima, & lecti in suo vigore, sed qui furculis adhuc hæreant, ex quibus alimenti adhuc nonnihil trahentes aliquandiu minùs minuuntur, & ob continuitatem cum furculis, calor illorum natius in aërem ambientem minùs expirat. Ob id nec rugosi immodicè sunt, quales sunt fugiēdi, vt leues, rari, exusti, tempore longo tabidi. *Zi. I. an. id.* Quando nāq;



in compositis medicamentis scribitur euphorbium, thapsia, succus aliquis aut liquor, flores, folia, fructus, radices, semina, vigentia semper accipe, fuge vetustate languescentia. Vetustas autem cuique sua est. Thapsia enim recens vehementior, annua mediocris, bima minus efficax, trima inutilis.

Metallicorum facultates diu vigent, tamen longo temporis spatio etiam languescunt: quædam namq; ex his anno vicesimo aut tricesimo adhuc sunt vtilia, quia non elanguerunt, nec omnino declinauerunt. Cuique enim suus vigor est & sua declinatio, atque senium. Vigor odore & sapore, interim colore & consistentiæ crassamento his qui sæpe viderunt noscitur.

Cortices item radicum in totum multò sunt vtiliores ipsi earum medullis, lib. 2. ant.

Chamæpitys & chamædrys campestris est generosior: alia tamen herba plurimæ in campis genitæ sunt imbecilliores: in montibus & locis editis valentiores.

*Li. 4. fac-  
ut. tuend.*

Rutæ folia modicè siccata diospolitico miscēda: nam plusculum siccata, acria, amara, iusto calidiora redduntur: non siccata excrementosum quendam humorem retinet, nondum ex toto concoctum, cuius vitio flatum discutere minus possunt.

Thy



Thymum fit Atticum, aut planè ex editis *Ibidem.*  
locis & siccis: coma autem eius cum flori-  
bus est miscenda medicamentis: lignosum  
verò quicquid est, abiiciatur.

Piper longum & zingiber, ambo inte- *Ibidem.*  
gra & minimè perforata: nam ambo per-  
forari ob humiditatem excrementosam ce-  
lerrimè solent.

Piper longum qualitatè piperis planè *Lib. 4. fa*  
habeat, nec maceratum solvatur, nec sit fo- *mt. tuè de.*  
raminulentum. *in diatri-*

Piper nigrum nec sit exile, nec rugosum, *on. pip.*  
nec crassi corticis, sed graue, maximum,  
plenissimum. Album maximum sit, simi-  
liter & plenissimum.

Seseli sit Mafsiliense. Petroselinum  
Macedonicum, & præcipuè Estreaticum.

Calaminthe, Thymum, Pulegium potif- *Ibidem in*  
simum ex Creta: sin minus, certè ex regio- *diac. la-*  
nibus editis & siccis. *minthe.*

Ex herbis abiecto lignoso & duro ad *Ibidem.*  
medicamenta accipiantur folia, & ea maxi-  
mè, quæ subtilissima & virentissima, & in  
summis herbis nata, adhæc flores, & cum  
his festuæ minutissimæ tenuissimæ. Hæc  
mediocriter siccata tunduntur, cribrantur  
tenui vel crasso cribro pro vario scopo, ut  
dicitur in his quæ melius reddunt compo-  
situm.



*Li. II. sim  
pli. in can  
cris.*

Sidera etiam quorundam vigorem augere nonnullis est persuasum, ob id Aesculapion cacos fluuiatiles ad morsum canis rabidi per cynocaumata frequentissimi, vrebant post ortum canis, quando sol in Leonem transisset, non nisi luna decima octava.

*Libro 3.  
antid.*

Alyssos ad morsum canis rabidi efficacissima herba, ex totius substantiae similitudine, legenda sub astu Caniculae: & ficcata contundi, cribrari, seruarique debet, ne difflatur.

Scalpturas, ut draconis radios habentis in iaspide viridi damnat Gal. lib. 9. simpl.

Efficacissima item sunt remedia, quae affectui partis, ut intemperiei medentur, & simul partem ipsam nutriunt substantiae totius similitudine, ut vicia passa in affectibus hepatis & vinum saluberrimum, si aegrotent sine phlegmone, erysipelate, abscessu, calida intemperie ipsius vel aliarum partium principum, vel totius. Nam alit, coquit, roborat, putredinibus resistit, intemperie frigida, humidam, si qua adsit, tuto persanat.

Eadem melli adsunt, nisi quod substantiam non cogit corporum, quibus adhibetur: ob id nec ea roborat, sed eius loco terget, orificia aperit, transitus purgat, urinas mouet ac nutrit: illa non despumatum, hoc despumatum potentius praestat. His vero nutrit



nutritoriis medicamentis si affectus non cedit, ad ea quæ solum sunt medicamenta, transeundum est.

Medicamenta probatissima & vigentia deliguntur ad compositionem, à natura morbi, & agri, & medicamenti: vt enim curatoria indicatio prima est à natura morbi, secunda à natura totius vel partis: sic medicamēti componendi ratio additur & natura medicamenti: vt sanguini ex pulmone educto per vas apertum conueniunt astringentia, vt acacia, rosa, balaustium, malicorium: per vas ruptum, etiam astringentia, sed simul glutinantia, & sine morfu siccantia, vt gummi hederæ. Sed cū tam astringentia quàm glutinosa & emplastica vias sibi præcludant, calida & tenuium partium: vt cinnamomum, casia, amomū, costus, piper, myrrha, eis sunt miscenda, quæ illis vias præparent, & ea in corpus deducant: licet alioqui vasorum apertioni & rupturæ, & præterea erosioni curandæ maximè aduersentur. Ob id ea non miscentur sanguinis reiectioni ex gula, ventriculo, intestinis, vti nec frigida, & narcotica, sputo sanguinis maximè salubria, dum frigiditate sistunt sanguinem ad vas affectum ruentem, propter dictā prius causam, quòd scilicet viam sibi præcludant.

*Libr. i. ha.  
ad Pison.*

*Initio lib.  
c. ph. par.  
Libr. 7. c.  
ph. par.*

*Scopi cō-  
positionis  
medica-  
menti in  
sputo san-  
guinis.*



*Libr. 4.  
metho.*

Præterea omnium internarum partium communis deligendorum medicamento-  
rum indicatio est, ut ea eligantur, quæ ani-  
malis naturæ sunt maxime familiaria: fu-  
giantur & respuantur contraria, ut ærugo,  
æris squama, æs vstum, cadmia, pompholyx,  
lithargyros, cerussa, vlceribus quidem ex-  
ternis sunt innoxia, interioribus verò non  
adhibenda.

## QVOMODO BASIS

### DELIGATUR.

*Lib. 5. fa-  
nit. tuen-  
da in fine  
quod præ-  
ceptum o-  
mnibus  
causis sa-  
lubribus  
est comu-  
ne.*

Medicamentum itaq; primū est deligē-  
dum, quod facultatem habeat curando affe-  
ctui contrariam: ut in frigido affectu calfa-  
ciens, in calido refrigerans: intenso laxās, &  
contrā: in raro densans, & cōtrā: & in cæte-  
ris similiter deliges. Neq; tamen sufficit in-  
uenisse & delegisse facultatem affectui cō-  
trariam, sed æquipollentem etiam, & quæ à  
medio in diuersum æquè recedat, ut in mor-  
bo calido, id est, per quē pars est calidior suo  
temperamēto ordinibus, verbi gratia, duo-  
bus, refrigerās duobus gradibus inuenien-  
dum. Eadem ratione in multum tenso, va-  
lenter laxans: in parum denso, modicè rare-  
faciens: & in cæteris ad portionem. Affe-

*Libr. 9.  
metho. ad  
finem.*

ctus curandi ob id tota natura tibi notissi-  
ma, tibi ob oculos sæpe ponenda, ut reme-  
dium inuenias illi profligando idoneum, &  
quod



quod nec ei<sup>9</sup> reliquias in corpore dimittat:  
 nec etiā vltra quā opus est agēdo, affectū  
 in corpus inuehat priori contrarium: quod  
 accidet, si affectui, verbi gratia, calido nu-  
 meris duobus adhibeas refrigerās medica-  
 mentū numeris tribus. Nam victa calidita-  
 te, frigiditatis vnū gradū in corpus impri-  
 met. Id verò medicamentū à quibusdam  
 & radix & basis totius compositi vocatur,  
 sicq; clarioris doctrinæ gratia passim appel-  
 labimus. Est autē id, à quo primaria & præ-  
 cīpua medicamēti toti<sup>9</sup> actio proficiscitur,  
 & cuius causa cætera adhibētur, per quæ sci-  
 licet hoc meliūs agat, vel sine quibus hoc  
 non agat, vel quæ etiam totū conseruant.  
 Vt enim fundamēti firmitas reliquū probè  
 sustinet ædificiū, & linea cui appictæ aliæ fi-  
 guram constituunt, eandem velut erigit, sic  
 basis hæc: ob i l fundamentorū & basium in  
 architectura est semp̃ habita magna ratio:  
 vti radicū in agricultura, quòd ab his tota  
 plantæ vita procedat, & in cōponendis me-  
 dicamentis basium, & in corporis nostri in-  
 strumentis anxie querenda pars est actionis  
 causa, princeps & primaria. Cū igitur tā-  
 tarum sit virium ea basis & radix cōponen-  
 di medicamenti, multa cura, præcipuūque  
 studium in ea probè diligenda ponendum  
 est. Quam rem nosse omnino debes, vt  
 prædi



prædiximus, omnium simplicium facultates, & totam morborum omnium essentiam: deinde inire tecum rationem, an cum hoc vel illo medicamento his viribus prædito, talis & tantus affectus poterit exactè profligari, & pars ad naturalem habitum restitui.

Cum autem plerunque ad manum nobis non sint simplicia sic affectui contraria, ut eius naturam attingant & æquent, sed magna ex parte vel supergrediantur, vel sint multò inferiora: tunc ex multis simplicibus in vnum mistis basim molimur, ut ex calido ad tertium gradum & altero calido ad primum gradum æquali portione mistis, medicamenti basim calidam secundo grado efficiamus, si talem medicamenti scopus, & curandus ab eo affectus requirit: quomodo si columna hæc abacum ex lapide simplici & tam crasso & tam lato requirit, hic autem desideratur: ex multis in vnum glutinatis abacum idoneum molior. Quomodo item si columna basim quadratam postulet, habeo autem tantum lapides duos exactè triangulos & æquilateros, quorum neuter per se columnam tunc sustinere possit: iis duobus lithocolla idonea tanquam ferruminatis basim efficio quadratam, compositam quidem, sed nihil aut minimū simplici inferiorem. Sic plerunque usu venit, ut  
simpl



simplicia habeamus duo aut inter se contraria solum, aut etiam quorum vtrumque per se, & seorsum est affectui curando aduersissimum & nocentissimum: ambobus tamen certa quantitate mixtis efficitur medicamentum longè præstantissimum, eaq; componendi ex cōtrariis ratio in tota medicina frequentissima est, & methodo constat exactissima.

In omnibus enim affectibus generosa medicamenta ex contrariis componuntur: vt stomaticum, diamoron & diacaryon, & alia permulta succo mororū aut viridium corticum nucum, & interdum galla, aceto, rhoë & similiter astringentibus, & vehementer repellentibus constant: adhuc myrrha, melle, & aliis permultis digerentibus, & prætereà lenientibus, coquentibus. Quædam autem non modò ex contrariis inter se constant, vt digerentibus repellentibus, vt diabesasa Andromachi, sed validis vtrisque: alia valentioribus digerentibus quàm astringentibus: alia contrà, aucto scilicet alterutro aut diminuto, pro affectus præsentis natura, & ægrî, & aëris.

Ex contrariis autem non modò inter se, verùm etiam ipsi affectui per se nocentibus efficacissima sunt medicamenta, vt oleum per se omni vlceri est nocentissimum, quia

*In fine li.*

*6.c.ph.p.*

*& li.1.c.*

*ph.pa. &*

*initio lib.*

*3.meth.*

*Ibidem.*

*hum.*



humectat, & sordes parit: omne autem vl-  
cus siccantia & tergetia requirit. Chalcitis  
autem quia vehementer rodit, & arugo, vl-  
ceribus maximè nocent: ex ambobus au-  
tem mistum optimum fit remedium: sic ce-  
ratum & arugo per se carni generadè in vl-  
cere cauo sunt contraria: mista verò idonea  
mensura (quæ cuiq; vlceri & naturæ sua esse  
debet, sarcoticum efficiunt laudatissimum.

Contraria autem hîc intellige nō modò  
propriè dicta, vt calidum frigidum tensum  
laxum, repellens, attrahēs: sed etiā quæ eiuf-  
dem sunt speciei, sed maioris & minoris ra-  
tione sunt diuersissima, vt summè & mini-  
mum astringēs: item summè & minimū la-  
xans, vel digerēs, vel calfaciens. Composi-  
ta igitur ex cōtrariis tā cōgeneribus quàm  
diuersi generis sunt multiplicia. (Cōtraria  
autē cōgeneria voco, vt summè astringens,  
minimū astringens, & similia. Cōtraria au-  
tem diuersi generis, vt astringens seu dēsans  
& laxās, frigidum calidum.) Primò, cū in  
congeneribus vehementi misceo mite alte-  
rum quòd medio indigeam vt rosarū florē,  
vel rosas ipsas, vel aliud ex clemēter astringē-  
tibus cum galla, vel alumine, vel alio va-  
lenti: sic cum calido frigidum misceo, si am-  
borū melio egeo, quòd nec refrigerat, nec  
calfacit: si autem portione inæquali ambo  
misc

*Libr. 8. r.  
ph. part.*



miscueris, ex hac variatione cōpositorum  
medicamentorum numerus erit maximus:  
quineriam duobus quibusdam diuerso pō-  
dere mistis; magna compositorum multitu-  
do efficitur: vt si rosarū flos & alumē a qua-  
li portione miscentur, tunc medium erit ex-  
tremorum medicamētū vel flos duplus, tri-  
plus, quadruplus ad alumen, tunc mitissimū  
fuerit medicamētū: aut cōtrā, alumen du-  
plum, triplum, quadruplum ad florem rosa-  
rum, tunc vehemētissimum fuerit medica-  
mentū, ratione maioris & minoris in vtro-  
que diuersissima pro portione alterutrius  
maiori aut minori. In quibus ne quære  
quod pręstantissimū, omnia enim respectu  
ad aliquid iuuant vel nocēt. Iuuant enim,  
cū tempestiuē talia & tāta corpori adhi-  
bentur, quando talia & tanta corporis affe-  
ctus pręter naturam postulat: nocēt, si quid  
horum desit. Quod sæpe accidit vires re-  
mediorum & naturas affectuum ignoran-  
tibus, ob id sæpe coactis sine methodo ad  
alia atq; alia remedia transire.

Sic si in pulmonibus apertū est vas, reme-  
dia tibi inuenienda astringētia, quę cōtra-  
hant: si ruptū, quę siccēt sine morſu, astring-  
gāt & glutinēt: si exesum, sarcotica, additis  
boni succi alimentis & renutrientibus. Ne-  
que solum basim facimus mistis pluribus

cont



contrariis, sed etiam saepe idem pollentibus: quia vnius larga satis quantitas nobis non suppetit: vt si anodyn non volo, id decocto chamemeli paro: quod quia parcius mihi adest, quàm opus est, quod deest, refarcio per melilotum.

Miscentur ergo medicamenta vel congeneria, id est, eiusdē generis & facultatis, vt astringentia omnia, sed alterum summè, alterum minimum, vel diuersi generis. Cōgeneria quidem, vt multa horum extremorum media habeamus, maioris & minoris ratione diuersa ex mensura mistionis huius vel illius extremi, quod in omni affectu est optimum, & ad remediorum copiam præstantissimum. Quæ larga remediorum supellex etiam nobis adest, si duo affectui per se noxia miscemus: vt oleum & æruginem vel chalcitum in medicamento sarco-tico, vt aliquoties diximus.

Diuersi verò generis medicamenta miscemus non ad ipsorum copiam solum, sed quia rari sunt affectus, qui sola vel astringentia vel digerentia requirant. Si enim parvus est affectus, per se definit: si maior est futurus, per sola repellentia non persanatur, præsertim corpore multis humoribus pleno: aut si pars affecta natura est imbecilla. Ob id cogimur saepe vel statim ab initio vel paul



paulò pòst aliquid digerens miscere, & si dolor vehemens vnà affligit, etiam mitigatorium. Si complicati sint multi affectus, scopi plures erunt inuentionis & compositionis remediorū: vt si simplex vulnus est cum contusione, vnus à vulnere est medicamentorum glutinantium, alter à contusione digerentium aut coquentiū, tertius à dolore vel in parte iēta, vel etiam illi cōtinua, & is scopus anodynorū: vel si hæc non sufficiunt, narcoticorum: vbi videlicet victis omnibus, horū maxima est necessitas. His enim temerè non vtendum est, ob noxam corpori & sæpe affectui ab his impendentē.

Basibus præterea diuersis sæpe opus est, quòd medicamentum sit polychrestum, id est, multis simul affectibus salubre, vt theriace, mithridatios, & alia permulta: tuncq; tot bases deligere oportet, quot actiones à medicamento exigimus, nisi fortè in vno simplici pluriū vsuum vis claudatur: vt in rhabbaro, aloë, absinthio, facultas cholagoga inest, & styptica, quibus duabus virtutibus si affectus eget, vt cum bilis flaua os vetriculi obsidet, simplicia hæc duarum basium loco fuerint. Eadem ratione si ex pulmone crassum & lentum humorem sim educturus, miscenda sunt incidētia, tenuantia, tergentia, expulsiōi parantia, purgātia, & le-



nientia, ne exasperatio dolorifica his succedat: sic omni vlceri cōueniunt siccantia, tergētia, quia ei perpetuò adsunt sanies & sordes, maior utraq; valentioribus, minor mitioribus remediis siccātibus & tergentibus indigens. Eodem habet modo in affectibus omnibus complicatis, nisi qui naturam habent eandem: ut si tertiana febris est, ipsa enim affectus calidus siccus à bile flaua calida sicca, quo casu refrigerātia & humectantia intendere solum opus, quia febris ipsa & eius causa bilis flaua putrens eadem genere remedia postulant: sic ladanum per se capilli defluuium sinit, quia raritatem cutis astringente sua densat, & sanguinem benignum per caliditatem suam attrahendo, substantiæ pilos generantis inopiam corrigit. Quæ raritas cutis & alimēti penuria dux sunt pilorum fluentium causæ, quarum priorem astringentia tantum corrigunt quidem: posteriorem verò augent, nam sanguinem à parte repellunt, & ob id etiam pilorum defluuium augent, si ambæ hæ causæ illos deturbent: sed calore ladani vehemētia repulsionis lenitur.

*Lib. 1. cō.  
ph. part.*

*Lib. 2. cō.  
ph. part.*

Quod si medicamentum ipsum simplex est imbecillum, eius duplum est miscēdum, ut in hemicrania veteri ponendum est duplum euphorbij bimi aut trimi loco recentis.



ris. Sic epithymo ad purgandam melan-  
choliā imbecillo adduntur elleborus ni-  
ger. fenna: cneco phlegmagogo, scammo-  
nium, agaricus, turbith: rha barbaro chola-  
gogo scammoniatū aliquid, nisi simpliciu  
horum quantitatem multum augere mauis.  
Ratione eadem pro cinnamomo duplum  
optimę casię vel carpesij, & in aliis similiter.

Si verò est valentius, vires eius aliis sunt *Lib. I. cō.*  
remittēde, vt in alopecia euphorbij & thap- *ph. part.*  
fix vim valentē frangit Gal. oleo, cera, thu- *Ibidem.*  
re, melle, adipe, vel humiditate quauis oleo-  
sa. Sic psilothrorum, id est, pilos aufe-  
rentium medicamentorum ex sandaracha,  
arsenico, calce viua, virtus vehemens mistu-  
ra imbecillorum medicamētōrū, vel liqui-  
dorū, vt vini, mellis: vel aridorum, vt ami-  
li, terræ selenus fr, frangenda. Sic scammo-  
nium quarto ordine calidū, essentiæ tenuis,  
virium omnium substantiam maximè dis-  
sipans frangitur per contraria tota substan-  
tia, & qualitate: & vires roborantia, vt per  
dactylos in diaphœnico, per pruna in dia-  
pruno, per succum rosarum in cathartico  
diarrhodo, per carnem cydoniorum in dia-  
cytonio purgatorio, cuius meminit Gal. li.  
v. alimento. Quę frigida sunt, crassæ essen-  
tiæ, astringentia partium substantiam & co-  
gētia. Quibus alia addūtur, vel his admini-



culantia, vel partes principes iuuantia totius substantiæ proprietate, vt post in compositorum enarratione patebit.

Item si qua in eo est substantia aut qualitas corpori vel affectui nocitura, aut etiam medicamenti actioni, ea antè vstione, lotionē, vel alia quauis ratione tollatur, aut mistis aliis corrigatur & frangatur. Ob id metalla sepe vrimus, vt tenuiora fiant: & lauamus, vt mordacē acrimoniam vlceribus noxiam tollamus. (Nam mordacia in vlceribus vitamus, vt exasperantia in phlegmonis præsertim dolorificis) scammonij & aliorū valentium vires corrigimus & obtundimus aliorum mistione, vt in antidotis cathartici patebit. Sic errhina valētia mitigat Galenus lacte muliebri, vel aqua, vel alio.

Sic succus ireos per se calidus est, cū aceto autem non calfacit, lib. 2. comp. ph. part.

*Lib. 4. method.*

*Li. 13. method.*

Eadem ratione in vlcere gulæ medicamenta deligit Galenus non modò vlceri curando idonea, sed quæ nullam vlceribus propinquis, vel deglutiendo contactis, noxam inferant. Ob id etiam stomaticis non vult misceri chalcanthum, sory, misy, chalcitim, diphryges, æs vstum, squamam æris, æris florem, quia noxia hæc sunt deuorata gulæ, ventriculo, & cæteris partibus ventris inferioris.

Ab



Ab effectus præterea magnitudine variatur medicamēti nō genus, sed vehementia, ut achoribus paruis & adhuc incipientibus sufficiunt mediocria digerentia vino mersa: diuturnioribus autem & maioribus valida debetur: curatu verò difficillimis & longissimis valentissima. Sic alopecie incipienti sufficiunt purgationes, una quidem per catapotia ex aloë, duæ verò ex hiera diacolocynthidos, prior ex drach. eius. 4. posterior ex drach. 5. sine errhinis & apophlegmatismis & topicis remediis, quæ veteratis sunt necessaria præsidia. Validis enim medicamētis initio affectuū nō est utendum, nisi sint extremi: sed mitiganda sunt eorum mixtura, quæ vim illorum validam dissoluant, quod paulò antè docuimus. Sic imbecilla medicamenta superficiariis affectibus & genitis ab humore paucō, nec crasso, nec lento, nec impacto adhibenda sunt. Valenter autem digerentibus est opus, si affectus est profundior & ab humore multo, crasso, lento, valenter impacto. Sic in alopecia contumaci & inueterata validis medicamētis miscet Galenus ceratum liquidum, in parua & incipiente imbecillis medicamentis, oleum laurinum. Sic medicamentis phlegmones scirrhis quædam ex liquoribus acris miscentur, & medicamentis ad pterygium

*Lib. 1. cō.  
1<sup>a</sup> part.*

*Lib. 1. cō.  
ph. part.*

*Lib. 4. cō.  
phar. p.*

*Lib. 2. ad  
Glaucō.*



& sycofin quiddam ex medicamentis exedentibus. Sic maligna & putrida vlcerapostulant medicamenta acriora, & quæ ignis vires habent, quale est misy, fori, calx, sandaracha, arsenicum, cùm cætera vlcerarequirant medicamentum siccans & tergens sine morfu & vehementi irritatione.

Ab affectus verò temporibus, etiam sæpe medicamēti genus mutatur, vt incipientibus achoribus, siue totius cacochymia saltem multa, astringens & repellens remediū est parandum: incrementibus verò repellēs quod influit, & coquens ac discutiens, quod iam influxit. Sic phlegmonæ incipienti, si moderata est, sufficiunt repellentia mediocria, qualia sunt omnia frigida: si verò violentior sit affluxus, valentioribus repellendum, austeris scilicet, ac interdum etiā acerbis. In augmento astringētibus digerens aliquid miscendum, in statu digerentium vis intendenda, in declinatione his propè solis vtendum, nisi prope partem principem sit, & in collo, alis, inguinibus: aut materia sit pestilens, aut crassa, & valentiùs impacta.

*Lib. 10. c.  
ph. part.*

Nam in omni humorum in aliam partem affluxu communis auxiliorum scopus est repellendi & reperiendi: vbi verò nihil amplius influit, quod impactū est, digerendi. Sic gargareonis phlegmonæ initio adhibenda,



benda, quę materię affluxum repellant, mediocrem quidem, mediocriter astringentia scilicet aultera, vt rosa, flos rosarum, & cetera prius dicta: vehementem verò valentius astringentia, scilicet acerba, vt balaustia, malicorium: si verò iam constitit fluxio, digredientia miscemus. Nam quousq; aliquid *Lib. 6. cē. ph. part.* influit, repellendum: vbi constitit, coquendum: deinde digerendum. Sic diamoro nūc cum repellentibus, nunc cum coquentibus, nunc cum digredientibus rectē quis vtetur in phlegmonis oris, si eius vsum pro generalibus illis scopis mutauerit.

Initio fluxionū, vt in phlegmone, quod *Ibidem.* influit, est repellendum, ceteris tēporibus digredientia repellentibus miscenda sunt, vt in incremento repellentia prępolleāt in declinatione digerentia: in statu amborum æqualis portio. Si verò reliquię quxdam inflammationis, velut in scirrhum induratę supersint, solis digredientibus agendum est corpore puro. Qua methodo qui vtetur, & simplicium medicamentorū vires nouerit, nunquā auxiliis idoneis destituetur, vbi vbi fuerit. Nam priusquā toti corpori sit prospēctū, si afflicte parti medicamentum acre & ca *Lib. 4. method.* lidū admoueas, trahit more cucurbitulę ex toto corpore in afflicta partē superuacua, & ei grauata sic affigit, vt agrē auelli queat.



*Li. 12. method.*

Cum ab affectu præter naturam indicationem primam deligendi medicamenti ad compositionem idonei diximus, non à morbo tantum ipso, sed etiã à causa adhuc præsentente ex interna, cuius propriè est præcautio, intelligimus & à symptomatis, licet hæc primò & per se nihil curatorium indicent.

A causa enim sumitur indicatio componendi remedia, ut pityriaseos, id est, furfurationis in capite à pravis ichoribus & saniebus nascentis remedia sunt, quæ hos ichoras digerunt & tergent, vacuato prius corpore toto, si vacuationis egere videbitur. Addunt quidam roborantia partem astringentia, ut ne affluentem sibi saniem recipiat. Sic phthirias eos, id est, morbi pedicularis in alta cute excitati à colluvie humorum calidorum putrescentium siccantia & valenter ex alto trahentia sunt idonea auxilia, quorum materia usu probata est sumenda (nam omnibus quæ experientia commendavit, fidentum) ut staphis agria, sinapi, cardamum.

*Lib. 1. cõ. ph. part.*

Sic achoras ex sanie tenui & mordaci ac simul ex humore crasso & lento natos curant, quæ hunc humorem incidunt & digerunt, & necessario reprimunt humoris influxum, ut in alopecia, quæ omnia acetum acerrimum præstat cum metallicis, ut cimo lia, pompholyge, cadmia, vel charta vsta, sub



subactum, vacuato prius corpore toto & capite, nisi affectus sit exiguus: tunc enim sufficiunt topica seu metrica auxilia. Sic in putridis febribus humoris, qui putrendo febrem gignit, fouet, auget, rationem habendam docet Galenus per alterantia, quæ putredinem finiant: & per vacuantia, quæ materiam putrem aut putredini paratâ de corpore pellant.

*Lib. 9. &  
II. meth.*

Eadem ratione in diariis febribus, quauis externa causa defuerit (à qua ut quæ non amplius sit, nihil curatorium indicatur) tamen quia in corpore dispositionem remanentem excitauit, quæ causa continens fuit febris, & eius accessione prorogauit, dispositioni illi prospicit. Si enim diaria est ab æstu, per totum accessioneis tempus irrigat caput partem primam, & immodicè à sole calfactam. Irrigat autem oleo rosaceo, refrigerato, ex alto effuso. In diaria à densata cute balneo refrigerante vel densante, magna illi cura est rarefaciendi corporis, frictione molli multa, cum oleo tenui & laxante. In diaria à mœrore præter dicta remedia lætitiâ: ab ira, animi tranquillitatem, & cætera contraria dispositioni in corpore relictæ à causis illis externis iam desitis. Sic in fluxionibus à calore vel dolore, symptomata hæc fluxionis causas pri-

*Lib. 8. method.*



num opprimenda docet. In fluxionibus vero à transmissione, partis transmittentis primam & maximam rationem habendam censeat. Nullus enim affectus percurari potest, manente in corpore causa quæ ipsum excitauit.

Eam indicationem à causa morbi ad rectè basim inueniendam, pluribus docerem magnarum esse virium, nisi prolixior esse metuerem. Ob id mihi satis est visum, ipsos velut fontes quosdam rei indicasse in Methodo medendi. Ex quibus diligens lector haurire plura possit, si hæc illi non satisfaciant: satis enim nobis est componendi Methodum indicasse, nec omnia afferre particularia conamur: quando id infiniti fuerit operis, & parum necessarij. Pauca tamen in singulis particularia afferimus, ceu sensui notiora, per quæ Methodos ipsas vniuersalia maximè proderes, & rationi notiores lector possit intelligere.

A symptomatibus quoq; indicatio est deligendorum remediorum, quæ ipsa vel tollant, vel mitigent, vel saltè nō exacerbent. Vitabis enim in capitis dolore ab ebrietate palmulas & myrrham: nam illæ proprietate quadam dolorē capitis faciunt. Hæc etiam sanis vapore multo & calido caput replens:  
multò



multò magis iam dolentibus auget. Eadem ratione vitabis mentham, crocum, & alia omnia, quæ papore calido caput repletia dolorem geminant. Vsurpabis autem in eodem hederam & brassicam, quæ naturali virtute ebrietati resistunt.

Stupefacientia adduntur quibusdam, quæ dolorem leniunt, non quòd dispositionibus opitulentur, sed quia vim sensoriã stupefaciunt, sine qua non fit dolor. Vbi enim dolor inuictus vrget, sensum stupefacientibus vtendum est in auribus cælo, renibus, & in qualibet alia parte vehemēter dolente. Auribus autem inflāmatione dolentibus opiū lacti muliebri vel albumini oui, vel castorio æquali mistum iniicitur: sed si vehemētissimus est dolor, duplicatum. Nec solum vt oppositū opio miscetur castoriū in auribus purulentis, sed etiã quia coquit & siccatur.

*Libr. 3. cõ.  
ph. par.*

Narcotica autem per se dispositiones ipsas dolorificas non iuuant, imò lædunt, & crudiores ac contumaciores reddunt: per accidens verò sæpe iuuant. Vbi enim dolor per ea cessarit, & somnus sit obortus, natura dispositiones dolorificas concoquit.

*Lib. 3. cõ.  
pha. par.*

Narcoticis verò huiusmodi vtimur, quando à nullo anodyno potest dolor mitigari. Ob id ipsius vsum semper vitauit Galenus, nisi magna eum necessitas ad vtendum

*Ibidem.*

*Ibidem.*



*Ibidem.* dum cogeret. Eadem omnino ratione,  
*et ap. 31.* quia meconiū insigniter stupefacit, ut tuti-  
*libr. 6.* or esset eius vsus, Apollonius, & alij quidā  
*Ibidem.* insignes viri ipsum tostū castorio miscue-  
rūt, quòd non tosto nonnullos offendi vi-  
derint, ut dies multo post vsum caliginosè  
viderint, & capitis grauitatem senserint, &  
cibos malè coxerint. Sed inter torrefacien-  
dum omnem eius efficaciam tolli saepe ex-  
pertus est Galenus: propterea melius duxit,  
non tostum castorio miscere, quòd refrige-  
ratoriæ facultatis eius vehementia obtun-  
deret. Postea verò eius malignitate tēporis  
spatio obtusa vtendum est, quando scilicet  
adhuc abundè efficax manet: quod in Phi-  
lonis antidoto libro quarto audies.

Medicamento verò ex opio & lacryma  
papaueris tantum vtimur, cū ex doloris  
vehementia, à morbis periculum imminet:  
quanuis horum vsu noxa quadam solidis  
partibus accidat, post corrigēda: collyria ta-  
men ex opio multorum oculos sic imbecil-  
les reddiderunt, ut hebes visio euaderet: &  
aures aliis sic infirmarunt, ut auditū graua-  
ret. Ob id in his rarissimè eo vtēdum, in ca-  
pitis dolore nunquam, quia nemini tam ve-  
hemens accidit, ut animi deliquio mortuus  
sit aliquis, aut seipsum occiderit, ut colico-  
rum nonnulli. Quantumcunque enim quis  
capit



capite doleat, minus dolet, quàm cui oculus,  
auris, dens, cœlum. Nec tamen soli tactui stu-  
pefaciendo narcotica ista adhibentur, sed *Lib. 3. cœ.*  
etiam auditui, vbi ob eius acrimoniã fit au- *ph. part.*  
rium tinnitus: & oculis, quando ob videndi  
acrimoniam suffusorum imagines à vapo-  
re ex ore ventriculi exhalante adsunt.

Optimus autem compositionis narcoti- *Lib. 9. cœ.*  
corum scopus est, vt ad tria, qui ea compo- *ph. part.*  
nit, respiciat: primùm, vt sensum tact<sup>o</sup> obtu-  
dat: secundò, vt nihil noxæ ex hac stupefa-  
ctione in particula relinquatur: postremò  
(quod est inximũ) vt dispositioni auxiliien-  
tur. Quæ tria Philo in sua antidoto seruauit.  
Nam hyoscyamus & omnium valētissimè  
opiũ facultatis sensoria, stuporẽ & somnum  
torpidũ frigiditate summa molitur. Vt autẽ  
horũ vehemẽtia obtundatur, nec adeò no-  
ceat, sed imminẽs ab eis noxa potius in hi-  
beatur: vtque citiùs distribuuntur stupefa-  
cientia (nam per se admodum tardè per-  
meant) & penetrent interiorum affectarum  
partium substantiam: calfacientia adiecit  
costum, pyrethrum, euphorbium, piper,  
quæ etiam noxios & dolorificos humo-  
res coquere, crassos tenuare, lentos incide-  
re, & tergere, & flatulentos item spiritus te-  
nuare, & vtrosque per halitum digerere &  
vacuare possunt. Ob hæc Philonium, &  
quæ



que similia sunt, doloribus colicis implacabilibus salubre est: ac in vomitu, singultu, erosione stomachi aut ventriculi ab humoribus acris, & in æstu ventriculi.

*Lib. 8. cō.  
p. par.*

Eadem ratione medicamentis ut stomachicis sic hepaticis opium, altercum, & similiter refrigerantia interdum miscentur, que calidas illarum partium intemperies mitigent: ea tamen mēsurā, ut totum compositum dictis partibus non sit vehementer refrigeratorium. Si enim refrigerantia in mistione præpolleant, sensus partium affectarum magis obtundet, & calor partium totius magis extinguetur: si calida vincunt, frigiditatis effecta minùs apparebunt, sed innoxium magis fuerit medicamentum. Nam viuis corporibus simile quid mortificationi accidit ex opio, & similiter frigidis: dum partes horum usu causas dolorificas sentire desinunt, & crebro usu frigiditatem partibus immedicabilem excitant.

Ut igitur in refrigerantium & calfacientium oppositione quantitas alterutrorum, præpollentem medicamenti actionem ostendit, sic in aliis contraria recipientibus, densantia rarefacientia, cogentia, fundentia, digerentia, repellentia, humectantia  
sicca



siccantia, vel solum diuersa astringentia, erodentia, tenuantia, tergentia, mitigantia, digerentia, hypnotica, id est, torporem & somnum inducentia. Sic Andromachus suis confectionibus bechicis & hypnoticis ad tenues humorum influxus incrassandos, siccandos, refrigerandos, opium miscet, & mandragoræ succum, & radicis eius corticem, & alterci semen. Quædam enim eius compositiones duo ex his, quædam tria, quædam omnia continent.

*Lib. 7. cõ.  
ph. par.*

Opium soli sapæ mistum lana exceptum, sedi, fronti, naribus, aut alteri parti vehementer dolenti impositum abundè stupefacit: vt tamen id medicamentum frigidas dispositiones valenter coquat, additur crocus, nardus Indica, myrrha, castorium. Addi etiam possunt semina anisi, ameos, apij, petroselini, seseleos, cumini, dauci, ad amari medicamenti insuauitatem corrigendam, & vt citius penetret, urinæque moueat, & succos crassos, si qui sint, magis tenuet. Eadem ratione vigilias in morbis per refrigerantia & humectantia expugnamus: syncopen quoque magna cura præcipuèque studio tum præcauet, tum præsentem abigit, libro I. ad Glauconem, & libro methodi II. Et si qua sunt alia symptomata præsertim insignia,



gnia, & quæ causæ morbum fouentis vel  
augmentis, tunc rationem obtineant, ab illis  
aliqua componendi medicamenti sumitur  
indicatio.

Quædam autem medicamenta interdum  
componimus contra nullum morbum, sed  
vt quod secundum naturam est, seruemus,  
qualia multa sunt cosmetica, id est, corpus  
ornantia & expolientia: & commotica, id  
est fucatoria: de quibus multa lib. 1. compo-  
sitio. phar. part.

Inflammatam igitur, aut aliter ægrotan-  
tem particulam aliquam curaturis, commu-  
nis omnium inflammationū alteriūsve cu-  
iusuis morborum generis, sub quo sit mor-  
bus partis, scopus primus occurrit, & indi-  
catio ab affectu ipso, qua primum medica-  
mentorum genus, quibus vtendum sit, inue-  
nias. Deinde indicatio ex partis natura su-  
mitur, ex qua particulares medicamento-  
rum differentias eligimus: de qua dicere  
tempestiuum iam fuerit.

A partis natura & vsu indicatio sumitur  
deligendi medicamenti, quod parti sit blan-  
dum & innoxium, indolens, temperamen-  
tum eius non vitians, sed seruans aut resti-  
tuens, si per morbum sit mutatum. Nam cu-  
rationis genus etiam affectuum eorundem  
in qualibet parte materiis variat.

Vt



Vt ophthalmia id est, phlegmone oculi tunicae adnatæ, quanuis omnium phlegmonarum curationi per vacuantia subiicitur, tamen quia ea tunica plusquàm cutis reliqua sentit ob sensus promptitudinem & substantiæ raritatem, repellentia postulat, quæ non exasperent, sed clementer astringant mista liquoribus mitigatoriis oui albumini, fœnigræci decocto, lacti mulieris inuenculæ, & euchymæ è mamilla supra cotem medicam expresso, in qua collyrium teritur, vt tepidum adhuc oculo infundatur, præsertim cùm magna est ophthalmia, aut humorum affluentium acrimonia: quãdo amyllum, aster Samius, spodium lotum, pompholyx lota, cerussa lota, plumbum vstum & lotum, & id genus alia ἀποια id est exiguam aut nullã qualitatem gustui aut olfactui representantia, qualis aqua, sunt salubria. Hæc enim quia rosionis omnino sunt expertia, & sola terrestri parte substantiæ, mediocriter siccant, his miscentur medicamentis, & aliis contra vlcera vel sola, vel cum erosione, & sanie mordacissima effluente. Qualia multa in cornea & rhagoides tunica nascuntur. Quod si hæc primis diebus nihil iuuare videantur, longiore tamen spatio auxilium sensibile præbent, solâq; his vlceribus coueniunt. Nam adstrin-

y



gentia sanie effluentem retinent, & hac ratione dolorem ex saniei morfu natum intendunt: acria verò dispositionem mordacem augent, & quod affluit, corrumpunt, siue benignum erat, siue iam cœptum corrumpi à malo oculi habitu, vel capitis, vel totius corporis vitio.

Vlcera item oculorum eadem secundum genus curatione sanantur, quæ cetera scilicet siccantibus & tergentibus siue inorsu, & postremo adstringentibus: tamen propter partis naturam sint omnino morsus expertia & læuissimè trita, vt ex pōpholyge lota, tenuissimè trita collyrium factum misto interdum mandragoræ succo, ad vehementissimos dolores leniendos sufficit: alij succum rosarum vel polygonij, vel albumen oui addunt paulò ante vsum, quia citò illa acescunt. Omnium enim vlcerum non modò oculorum materia huc spectat, vt vlcus ipsum sit purum, natura verò partium ipsum replet, ac cicatrice tegit. Quæ verò vlcera recipiant, & requirant mordicantia, prius dictum est.

Sic oris totius tunica cùm sit cute totius corporis multò rarior & mollior, ad hæc ea sola medicamēti insuauitate infestetur, cūque faucibus subiecti sint duo meatus: guttur in pulmonem, gula in ventriculum, per



per quos aliqua portio medicamēti stomati-  
 ci in dictas partes potest defluere, stomati-  
 co miscere non audemus valentia, & insua-  
 uia, & quæ his partibus obesse possunt. Ob  
 id emplastro dia chalciteos & aliis quibus-  
 dam validis & vim quandam lethalem ha-  
 bentibus in vlceribus cutis vti possimus: in  
 oris verò affectibus nemo vtatur tutò, etiã  
 si vlcus ea postulet, nisi magna eorum vsus  
 sit necessitas, qui eorū aliquid in fauces, &  
 inde in guttur, aut gulam delapsū vehe-  
 menter partes recepturas lædit. Contrà in  
 reliquarum partium affectibus, saporū sua-  
 uitatem, vel insuauitatem non spectamus.

Sic phlegmone stomachi & ventriculi &  
 hepatis non solis laxantibus est curanda ob  
 harum partium actionem corpori toti ne-  
 cessariam ad viuendū, sed miscentur etiã  
 astringentia harum partium robur seruan-  
 tia, vt absinthium, aloë, mastiche, nardus, cy-  
 donium. Sic in scirrho hepatis calfacien-  
 tia & tenuantia præpolleāt magis, quàm in  
 scirrho aliarum partium, sed mollientibus  
 admodū moderatis vtendū, quia iecoris  
 corpus velut ex humoribus concretum est:  
 ob id Herophilo parenchyma dicitur.

Item in scirrho hepatis semen cucume- *Lib. 8. cō.*  
 ris & baccæ iuniperi miscentur, quæ mi- *h. part.*



tigent, & aliorum vehemētiam obtundāt: & mel, & eryngium, vel similia sumendis adduntur, vt excretionis viam præsternant per vrinas his quæ ex scirrho iam terfa & fusa per sumpta & admota fuerint. Scirrhus enim omnis cū fiat à frigido, crasso & lento humore in partes solidas transmissio, calidis, incidentibus, tenuantibus, & tergentibus, & digerentibus est curandus.

*Libr. 2. c.  
ph. p.*

In dolore capitis ab æstu initio refrigerandum, maximè per sinciput: quòd ibi os sit tenue, rarum, & sutura coronalis: non per occiput, quia id ægrè vritur, nec citra noxam refrigerantia sustinet ob spinalis medullæ exortum tot neruorum principium. Per sinciput etiam est calfaciendum in capitis dolore à perfriktione: sic vitia sedis requirunt refrigerantia & ficcātia, sine morfu tamen & rosione, vt metallica non acria, nec omnino acerba, sed lota. Quia pars hæc calida humida quodammodò præter naturam ob excrementorum calidorum contactum perpetuum, & quia ægrè transpirat. Adhæc quia sensu exacto est prædita ab acris & acerbis, quia rodunt vel diuellunt irritatur.

Sic lassitudinem motoriā etiam phlegmonæ de crurum, brachiorum, spinæ oleo infricātes partem curamus, vt eius faculta-

te



te percutim ad musculos ipsi connexos perueniente ipsam discutiamus. Si autem similis lassitudo in tunica interna asperæ arteriæ, & musculis laryngis, post vociferationem multam, & præcipue acutâ fiat, oleum & alia emollientia & digerentia per cartilagineas ad partem lassatam non peruenient, sed paulatim deglutitis est opus lenientibus: tamen balneum dulce omnibus his commune est auxilium.

Sic aquâ mulsam, oxymeli, & alia, omnibus non eadem mistione coquimus: quidam enim ea libentius bibunt aquosiora, alij dulciora, vt quidam vinum dilutius amant, & si meracius biberint, iis caput feritur: alij meraciore gaudent, qui si dilutius biberint, his ventriculus euertitur. Sic diamoron hi dulcius volunt, quibus plus mellis miscendum: alij austerius, quibus minus. Cum igitur alicui medicamentum sumendum imperas, cõiice aut interroga, quibus præcipue saporibus secundum naturâ delectatur, & singulis quod iucundum est, para: modò ne medicamenti facultas insigniter exoluatur. Ob hæc Medici sumenda medicamenta faciunt media, quæ pluribus naturis conueniunt, & ab aliis minimùm recedunt. ob id faciliè ad propriam cuiusque naturâ paucis quibusdam additis accomodantur.

*Li. 4. san.  
tuend.*



*Lib. 3. cē.  
ph. part.*

Sic phlegmone initio repellentia materiam affluentem postulat: quæ verò est in parotidibus, trahentia, nisi interdum & rarò paucum astringentium multò digerēti miscendum sit, quando scilicet parotis cum paruo dolore erumpit.

Remediis item hemicranicis tam calidis quàm frigidis iubet Galenus misceri corroborans aliquid, astringentia scilicet facultate prædita. Quod præceptum in partibus actionem aut vsum toti corpori cōmunem & necessarium habentibus est perpetuum, ventriculo inquam, & hepate, liene sæpe.

Præterea indicatio curatrix & medicamentorum vt aliorum quoq; remediorum inuentrix sumitur à viribus, ætate, cōsuetudine, non primò sed ratione temperamēti, quòd hæc ambo immutant, & nouum sæpe faciunt: illæ temperamentum in quo consistunt, sequuntur. Item non à partis temperie solùm, sed ab ipsius situ, connexione, figura, magnitudine, sensu exacto & obruso, aëre, id est anni parte, regione, cœli statu. Quorum singulorum exempla tantùm singula prolixitatis fuga adscribemus.

Imbecilla debentur remedia omnia imbecillibus, nisi vires copia grauata falsam imbecillitatis suspicionem præbeant: tunc enim valentiora ferre possunt, vt & robustæ



ste nec grauata insigniter.

Pueri & senes valentia remedia non ferunt, præsertim vacuantia. Illi enim calidi humidi plurimum per insensilem transpirationem vacuantur: his infirmum & frigidum corpus viribus scilicet omnibus imbecillis.

Consuetæ remedia minùs molestare solent, sed etiam minùs sunt efficacia.

Pars ab ore & stomacho remotior sumenda medicamenta valentiora indicat, quòd priusquàm affectui occurrant, vires eorù oblundantur alteratione, aliorù mistione.

Eadem ratione quæ sunt profundæ partes, admouenda medicamenta postulât valentiora, & quibus tenue aliquid additum ad penetrandum paret, vt acetum, euphorbiû: vel etiam astringens à tergo impellat. Contra verò cùm parti affectæ remedium viribus integris aut parum fractis occurrit.

Quia connexio lieni est per vas venosum cum venis mesaraicis, lienis vacuatoria remedia sumpta aut iniecta facio valentiora, quàm si ex initio mesarei vel etiam toto mesareo esset vacuandum.

Cauæ intus partes, medicamenta intrò recipere possunt: foris, foras: intus & foris, utroque versus: nec intus nec foris, nusquàm. Magna verò cavitatis largius medicamen-



tum capit, ut vomitoria sint larga quantitate, quæ vesicam vel uterū vacuant iniectiones, paræ: quæ intestina lata & parum plena aut pressa, largæ: quæ angusta, quæ stercore aut flatibus plena, aut fœtu, vel ascitæ, aut tympania pressa, paræ.

*Libro 3.  
method.*

Quæ corpora sensu tactus exquisito sunt prædita & mollia, valentia & acria & mordacia medicamenta non ferunt: quæ obtuso, ea ferunt.

Aër si temperiem habet morbo similem, quia causa est insalubris, medicamenta debent habere qualitatem aëri & morbo repugnantem, insigniorem, quam si aër ipse morbo contrariam haberet intemperiem. Horum omnium exempla propè infinita sunt tota methodo, lib. sanit. tuendæ, & lib. 2. ad Glauconem. Quapropter non est, cur in his pluribus immoremur.

*Libr. 9.  
cō. pha. p.*

Ab affectu simul & partis natura plurima, ut in dysenteria opium, galla, malicorium, cortex pini, semen alterci, myrta sicca, acacia, rosæ sicca, pyra, sicca omnia torrefacta dantur, ut dolorem obtundant, & partem aduersus causas dolorificas roborant.

*Libr. 1. c.  
1b. p.*

Sic alopeciae difficili nec cedenti tribus aut pluribus totius purgationibus dictis à Galeno topicum debetur medicamentū calidum



lidum, quod digerendo vacuet, non tamen adeò calidum vt vrat, aut etiam cutim citra vstionem immodicè ficeret: nec tamen mediocriter calidum, vt non vacuet quod volumus, sed tenuium sit partium, vt in altum penetret ad originem radicis pilorum: quia cutis capitis crassior & durior, ob id efficacior opus est medicamēto, quod & prauos succos digerat, & sanguinem probum trahat, qualis est thapsia. Quæ cum multò sit calidior quàm affectui & parti conueniat, solam ne applica: nam cutim vlcera, & tumores in ea excitat inflammatorios: ob id quædā eius vehemētiam mitigantia misce, vt ceratum ex oleo tenuium partium (quale est sabinum verus, vel ricininum recens: non Hispanum, vel omotribes, vel aliud astringens) vel aqua mista thapsiæ recenti: nam annuæ vis dissoluitur: bimæ magis, tri ma est inutilis.

Sub natura partis cōprehende naturā totius, & expende, an quod medicamento genus pars affecta idem corpus totū insinuet, an diuersum. Id quod simile vel dissimile partis & totius temperamentum tibi planè ostendēt, vt lib. 3. methodi fusiùs leges. Præ- *Libr. 3. c.*  
sidia etiam alia ciuilibus corporibus scriben *ph. par.*  
da sunt, alia fossoribus & messoribus, vt acetum feruens, aut muria acetosa in parotide.



Lib. 6. cō.

ph. par.

Ad totius naturam, ægri quoque & Medici facultates referas. Pauperes enim Medici sumptuosa & diuitum remedia parare nequeant, quod illis sit res domi angustior. Pauperibus etiam pauperem ex viliori materia apparatus, diuitibus dignū ipsorum diuitiis ex opulentiore preparare oportet. Ob id identifricium suum diuitibus cinnamomo, pauperibus casia vel amomo aromatizat & iucundius odore & sapore reddit Galenus, & in opulentorum ozæna medicamentis miscebat odoris gratia aliquid hedychroi in falerno veteri merfi, libr. 3. cōpositio. pharma. part.

Neque tamen ob id putes, sumptu superfluo aut parum necessario diuites onerandos, ut magna pecunia & longis itineribus conquiras remedia, quibus similia tibi sint in promptu. Nam cum ad manum sunt remedia paratu facilia affectui curando idonea, superfluum est vel exotica vel rara vñu disquirere: ut cum parotidas curare possis trahentibus & digerentibus remediis propè infinitis, quorsum attinet in id mustelæ sanguinem quærere? citra quem si nequit curari parotis, remediorū planè inops fuerit medicina, cum præter hunc aliis permultis parotidum auxiliis sit fecundissima. In paratu tamen facilibus delectus quoque est habend



tabendus. Nam asini urinam & similia *Lib. 6. cō.*  
 otui dare in affectibus oris & gargareonis *ph. part.*  
 um Apollonio, extreme est dementiæ, cum  
 lia sint permulta paratu facilia æquè effi-  
 acia: adde quod permulti sint, qui mori ma-  
 int, quàm illam bibere. Absurdissimum  
 etiam est, in oris phlegmonis potiones alias  
 medicas quàm purgatorias dare.

Sic diamoron & diacaryon & similia *Lib. 6. cō.*  
 pauperibus parare potes sine ullo sumptu *ph. part.*  
 aut cum minimo: diuitibus verò sumptuo-  
 siora sūt cū cassia cortice vel nardo Indica,  
 vel folio malabathri, vel omnibus simul. In-  
 de etiā sumptuosa diuitum mulierum Ro-  
 manarum vnguenta spicatum & foliatum.

Item ad potenter digerendum phlegmo- *Ibidem.*  
 nas indurescentes, diuitum compositis sto-  
 maticis additur costus, amomum, macer,  
 opus Cyrenaicus vel Medus, aut alius: pau-  
 perum verò stomaticis digerentibus addi-  
 tur acorus, meon, cardamomū, dictamnus,  
 sinapi, loco illorum sumptuosiorum dige-  
 rentium.

Eorum etiam qui assument medicamē- *Galen. in*  
 ta naturæ proprietates est inspicienda: sunt *theriaca*  
 enim nonnulli tam facile medicamenta *ad Piso.*  
 capientes, ut etiam sepe ea concoquant, *ex li. 2. epi*  
 & nutrimentum ab his aliquādo sentiant, *demiōn*  
 nullum autem incommodum. Alij con- *Hip. Phi*  
 tra *lophar-*  
*maci.*



*Miso-  
pharma-  
ci.*

*Li.3. me-  
tho. & I.  
alim.*

trātam sunt inepti ad medicamenta assu-  
menda, vt iis vti, nequeant, quia stomachu  
ea aduersatur, & ante vsum facile dissolui-  
tur. Vnde veterum prāstantissimi optimas  
medicamentorū compositiones effecerunt,  
ex singulorū natura cōpositionis rationem  
inueniētes, & quę intēsa erāt viribus, alio-  
rum mistura remittentes, & simili ratione  
acria hebetātes, reliquāq; pro affectuum &  
naturarū differentia obseruantes, quę scili-  
cet medicamēta, quibus morbis, & quo mor-  
borum tempore conuenirent, & quomodo  
affectis corporibus, & quali victu vtētibus,  
& quo anni tempore. Sic theriacen ex opti-  
mis & plurimis multūq; variis medicamen-  
tis composuerunt aduersus ferarum noxia-  
rum morsus & venenosa pharmaca, & alios  
affectus plurimos, quōdq; hominum natu-  
ras plurimū inuicē differre perpenderent,  
ita vt aliud alij medicamentum sit idoneū.

*Libr.6.c.  
pha.part.*

Si diuitibus paras stomatica coquentia  
& digerentia, misce amomum quantum  
crocum, myrrham, alumen: & si vis, horum  
trium loco solum pone amomum.

In corporibus mulierum & eunuchorum  
& aliorum molli carne & alba prāditorum  
nec soli assuetorum, caput aestu calfactum  
refrigerare vehementer non audemus.

In mollibus & delicatis corporibus vlce-  
ratis



s vtendum est medicamentis morfu o-  
mino carentibus:hæc enim vel sine mole-  
stia agent,vel saltem nihil nocebunt.

Prædictas indicationes propè omnes de-  
liendis quoq; aliis simplicibus miscendis  
in fine quibus basis non agat,quàm per  
se melius agit,& postremo à quibus o-  
mnia illa conseruâtur,applicare oportet,vt  
omnino tibi persuadeas,nihil rectè ad mi-  
nendum vti,nec ad curadum inueniri pos-  
se,nisi per indicationes seu scopos,& veluti  
respectus,vt appellaut. In quibus præcipuè  
ut ab effectu præter naturam,ab ægri na-  
tura,& ab aëre. Has autem in sequentibus  
tibi minùs accuratè expressas leges,igno-  
rantia aut negligentia ne adscripseris, sed  
has de industria vel obiter perstringemus,  
vel etiam silentio præteribimus: quando  
ad viuum singulas excutere prolixius esset,  
quàm rei mihi propositæ conueniret.

## S I N E   Q V I B V S.

**B**Asi medicamenti inuenta & probè con-  
stituta,ei sunt addenda alia,sine quibus  
affectum basis ipsa profligare non potest,&  
pristino habitui corpus restituere.Sunt au-  
tè ea multiplicia,vt mox audies:ferè tamen  
omnia basim aut ad partem affectam dedu-  
cunt,



cunt, aut ipsi commodè ad actionem applicant: nisi basis ipsa per se sit idonea, & multorum simplicium rationem sustineat.

Miscentur ergo quæ tota sua substantia parti sunt familiaria, & ob id dum à parte trahuntur, simul vim medicamenti eò deducunt, vt simplicia cephalica medicamenti vim ad caput secum trahunt, cardiaca ad cor, nephritica ad renes, arthritica ad articulos medicamentum deducunt, quo partitis affectus indiget.

Miscentur etiam quæ basim per meatus natura, aut obstructione, aut densitate, aut cōpressionē angustissimos, in partes, si opus est, remotissimas cōuehant sua vel acrimonia, vel essentiæ tenuitate, vel vtraq; vel accurata tritura; ob id acetū obstructionibus viscerum liberandis miscetur: euphorbium externis intrò penetraturis remediis myrrha aëriæ substantiæ multæ particeps crocā terreū intrò deducit rhabarbarū, asarum, leuissimè terūtur in pollinis modū, cū mouendū est lotiū: casia, cinnamomū & similia tenuissimè trita miscentur, vbi menses sunt mouendi: euphorbium, pyretum & similia, vbi per sumpta medicamenta est ab articulis trahendū. Contrā sine his basim exhibemus, cū parti affectæ facilè & mox occurrit ex partis situ & figura, vt rhabarbarum



arum, crassum & negligenter tritum datus, cum aliud tantum mouenda est, non tantum mouendæ vrinæ.

Hæc prædicta quatuor, familiaritas totius substantiæ, tenuitas studiosa tritura, acrimononia, ubi ipsius basis vires aut etiã substantiam ad partem affectam deduxerunt, ea ut in affectum agat, tempore eget interdum etiam diuturniore: ob id nonnunquam barbarius miscentur, quæ ipsas affectæ parti diutius affigant, ut mora saltem ipsæ id perficiant, quod non possunt obiter præstare: ut medicamenti gulæ & trachæe alteriæ miscemus crassa & læta, quæ vim medicamenti sarcoticam, colleticam, sinuloticam, si vltimus adest, in parte remorentur & affigant.

Non tamen aut in via, aut illa mora in parte volumus medicamēta coqui, & horū vim à calore nostro euinci, priusquam & partem affectam attigerint, & vsum optatum præstiterint: ob id opium theriacæ miscetur, & ob alia quædam alibi dicenda.

Medicamētis verò quæ hære partem alicui volumus siue sumitur, siue admoueantur, ceram, oleum, adipem, vel lentum aliud miscemus, memores tamen eorum quæ rectè sumendis aut admouendis miscentur.

Nam ceram sumendis nemo rectè miscuerit, ut neque axungiam, quæ admouendis sunt

*Libr. 6. c. 2.  
ph. p.*

sunt



sunt aptissima, vti ad vlcera gulæ & asperæ arteriæ syrupi, butyrum, oleum, & lentiores succorum, opportunissimi.

Si tamen vlcera sint putrida in ore, parte calida, humida, ob id ad putredinem paratiore, quia medicamenta his idonea continenter per saluam elota adherere nequeunt, validissimis in ipso sic vlcerato medicamentis vti cogimur, qualia sunt caustica, & quæ crustas ferri candentis modo efficiant. Sed in externis partibus causticis per se vtimur: deinde crustas tergentibus auferimus: at in oris vitiis propter partis naturam tutius est causticis miscere tergentia, mel, thus, eruum, irim, aristolochiã: ne ob partis naturã recidiua putredo nascatur. Misyos ergo crudi vel tosti drach. tres cum mellis cyathis sex dissoluantur, vel chalcitis tosta cum melle tanto, vt sordium habeat spissitudinem: vel chalcãthum vstum cum melle similiter mistum. Sic caninum stercus, cinis hirundinũ, & humanum stercus, ana cum melle.

Sic æruginem cum aliis mistam aphthis malignis adhibet Andromachus & Crito ibidem: & arsenicum, & sandaracha, & alumen scissile, oris putredinibus applicantur ibidem.

Eadem ratione malignis vlceribus sedis, intestinorum, vteri, vesicæ, meatus vrinarij  
simil



similia adhibetur remedia, aliter atq; aliter  
mista & soluta pro variis à parte & affectus  
magnitudine, & situ indicationibus.

Sed quoniam usus à medicamentis expe-  
ctatus præcipuè is qui calori aut frigori suc-  
cedit, non præstatur, nisi medicamenta ipsa  
actu id sint, quod dicuntur, hoc est, calida  
vel frigida, calore nostro egent, deducente  
ipsa in actum: ut medicamenta purgantia cum  
potestate calida sint omnia, ut agant, actu  
calida esse oportet caloris nostri actione.  
Eodem modo opium & alia frigida ut a-  
gant, quod agere nata sunt, in frigiditate il-  
lam suam à calore nostro deducenda sunt: actu  
enim non magis frigida sentiuntur, quam  
alia loco eodem conclusa. Sed tamen utraq;  
prius accuratè sunt terenda, ut ea calor no-  
ster propè tota citius attingat: nam piper, &  
cætera potestate calida; non fiat actu calidum  
à nobis sine contritione tenui: nec rha bar-  
barum aut asarum, & vretica alia urinas mo-  
ueant, nisi diligenter sint comminuta: aga-  
ricus item & colocynthis citra contritio-  
nem hanc multum sunt noxia, si sumantur.  
Quam ut promptius recipiant, ille in tro-  
chiscos primum formatur: hæc cum aliis sic-  
cis teritur & friabilibus.

Nisi item facultates medicamentorum, *Li. I. op.*  
sine quibus basis ociosa fuerit, in suo vigo- *ph. part.*



re constant (quas color, odor, sapor, consistencia, non solum calor aut frigus significant) vires à composito promissas ne expecta, vt indicabit libr. 4. compositio theriaces. Est tamen quando medicamentum vires simplicium languidiores poscit, vt euphorbium vestutate ignauius idémque flauius: quando pars exactius sentit, cui est applicandum, & affectus vt punctura est cle-  
*Li. 8. sim.* mentior. Sic in rha tenuis & aërea substantia, & frigida terrea mutuò sese non impediunt, imò valentioris effecti sunt causæ: quia aërium deducit intrò crassam & terream & frigidam substantiam, alioqui per se in superficie hæsuram, nec partes internas contracturam, refrigeraturam, siccaturam.

Miscetur etiam medicamento non modo sine quibus ipsum efficere id non possit quod promittit, sed sine quibus medicamentum hoc vel illud compositi nomen non habeat: de quibus abundè post in forma medicamenti idonei constituenda.

Ea igitur omnia quæ composito miscentur, aut etiam citra mixturem, in basi perficiuntur necessario, antequàm ea, quod optamus, in affectum efficiant: illa rationem eius sine quo medicamentum nõ agat, obtinent, vt basis ipsius coctio, visio, tritura, lotio



lotio, & alia permulta, quæ in singulis appa-  
rent compositionibus. Item quæ glutino-  
sius, liquidius, crassius, tenui<sup>9</sup>, acrius, mitius  
medicamentum reddunt, quando harum  
qualitatum aliqua est opus ad actionem op-  
tatum. Item quæ partibus familiaria ad eas  
vim vel etiam sæpe substantiâ medicamen-  
ti alterantis, roborantis, vacuantis deducūt.  
Quando medicamentum agit in propin-  
quam sibi materiam, in longinquam non  
acturum, aut tam imbecilliter, ut nullus in-  
de successus esset sperandus. Præterea quæ  
sumptum vel admotum medicamentū tam  
iucundum faciunt omnibus suis qualitati-  
bus ægro, ut id ipse nō inuitus accipiat, ne-  
que eo assumpto nauseet, & inde vomat. Si  
enim vomat, nullus est huius medicamenti  
usus, ut neque si admotæ præ morfu & dolo-  
re, aut alia de causa mox æger illa abiicere  
cogatur: nisi fortè vomitu illo fiat fluxionis  
auersio, & excrementosum aliquid etiā ex  
ventriculo simul elidatur. Ad hæc quæ hu-  
morum coctionem iuuant, quæ excremen-  
ta vacuationi apparāt, quæ meatus aperiūt,  
per quos medicamento via est futura, atque  
etiam excremento, illa etiam rationem eius  
obtinēt, sine quo medicamentū nihil agat.  
Ad hæc virium robur quantū est necessa-  
rium medicamento ad actionem mutando



& sensus tactus, eòdem pertinent. Quapropter apoplecticis, dissolutis, hystericis remedia quantumvis morbo & eius causæ idonea dentur vel applicentur, cassa sunt, aut parum secunda: sæpe motus, sæpe venter plenior causa est vacationis tū celerioris, tū largioris: sæpe quies retineri in ventriculo, sæpe ventris inanitio coqui medicamentum cogit, præsertim si erat clementius: sæpe item corporis situs ac figura ex deiectione vomitorium effecit, & contrā.

Cessatio quoque à vacationibus aliis causa sæpe est per accidens huius vel huius vacationis. Nā si in diabete des mediocriter aluum mouentia, illa etiam ad vias vreticas trahentur: ut si in lienteria, diarrhoea, dysenteria des vretica, vel hydrotica, vel quæ viscera respiciunt, sæpe aliorū impetu illa per sedem detrahuntur. Per accidens quoque voluntas nostra sæpe rationem eius sine quo non fit medicamenti actio, habet: ut si quis aluo à medicamēto irritata, naturæ impetui non seruiat, sed aluum cohibeat: fit sæpe, ut aluus postea non descendat.

Non modò autem quæ ante medicamentum sumuntur, ut ei materiam apparerent, sed etiam quæ post recipiuntur, sæpe actionem medicamenti obrutā excitant, sæpe ad medicamenti expulsionem naturā irritant. Ut  
sum



Sumpto purgante medicamento si quis diutius à cibo abstinet, si pe nihil mouet: si tempore pòst legitimo cibū sumat, hoc recreata natura medicamentum expellit.

Infinita propè alia inuenias in compositis medicamentis, sine quibus illa nihil omnino agant, aut tam parum agāt, vt nihil egisse videri possint. Eadem verò, cū sint imbecilliora impedimenta, vt melius operetur medicamentū, aut etiam si omnino absint, per accidens his accēseri possunt, per quæ melior fit medicamenti actio. De quibus dicere iam tempestiuum fuerit.

## P E R Q V A E M E L I V S.

**T**ertio loco medicamentis certa methodo componendis deligenda sunt, & miscenda, quæ ipsius basis & aliorum, sine quibus basis non agat, actionem reddant meliorem, perfectiorem, efficaciorē, salubriorem, tutiorem: celeriorē, si celeritate opus est: aut tardiorē, si tarditas optanda est, qualia sunt vstiones, ablutiones, trituræ, & quæ basis ipsius aut aliorum vim corrigūt, valentiorē minuēdo, imbecilliorē augēdo, noxiam corpori emendando. Item quæ coloris, odoris, saporis, consistentiæ gratiam agro iucundam me-



dicamentis conciliant.

De horum autem quibusdam prius est dictum, de aliis exempla aliquot proponamus non inutilia lectori. Valentiorē vim minuunt per se quidem quæ basi aut prædictis sunt contraria, vel tota substantia, aut sola qualitate manifesta, aut vtraq; vt scāmonio calido, tenui visceribus noxio vires dissoluenti, pruna dactyli, succus rosarum frigida, crassæ essentia, partium substantiam cogendo, roborantia, miscentur in antidotis catharticis. Sic valenter calidis opium, semen hyoscyami, cortex radicis mandragoræ, & similia miscemus, vt illorum vehementiam obtundamus: præterea vt sensu per hæc frigida stupefacto dolorem sedemus: sic vehementer astringenti minimum astringens miscemus, cum mediocri astringitione opus est: vel vehementer digerenti minimum digerens, cum moderatè resolvendum est in aliis ad portionem. Per accidens verò vim aliorum remittunt, quæ partis naturæ sunt familiaria, eamque aut tota substantia, aut qualitate, aut vtraque contra noxam à medicamento imminentem roborant & muniunt. Vim etiam minuunt, quæ tenuibus crassitiem, celerioribus tarditatem, rarioribus densitatem, lenioribus gravitatem addūt: nisi à crassitie, tarditate, densi



densitate, grauitate vehemens actio proficiscatur. Est enim quando horum actio est optatior.

Sic sulphuris valenter calidi & digerentis vim pari cimolia terra frangit in achori *Libr. i. c. 8. ph. part.*

bus Apollonius, & ex ambobus compositum ad symmetriam medicamentum reducit. Addit & acetum incidens, tenuans, digerens, repellens.

Sic medicamentis ad affectus internarum partium penetraturis ea miscemus, quæ penetrare in altum faciant, etiam affectum non iuuantia, vt acetum in phrenitide, quod neque mitigat dolorem, neque laxat tensionem. Et quia medicamentorum affectui aptorum virtus in altum penetrando dissoluitur, sæpe affectus ab his præsidium non sentit, nisi mista sint medicamenta valentissima. Contrà in affectibus superficialibus, vtpote quibus occurrunt medicamenta viribus integris, satius tamen fuerit miscere, quæ tum medicamenti vim intrò ad penitiora deducant, tum affectui ex sua natura auxilientur, & sint tenuium partium, vt acetum in calidis dispositionibus, euphorbium in frigidis. Cuius vtriusque virtus vehemens dissoluitur, & corpora permeando & alterius mistura, vt rosacei cum aceto in capi-



*Lib. 7. me  
thod.*

tis interno dolore, nisi vlcus adfit in finci-  
pite, cui vis applicare. Sic vstio metallicis te-  
nuitatem essentia, acrimoniam & vires au-  
get, lotio acrimoniam & vires eas minuit,  
tenuitatem retinet. Sic aloë non lota ma-  
gis purgat, minus roborat, lota minus sol-  
uit, magis roborat.

Quæ verò actionis vehementiam remit-  
tunt, eam non aboleant, neque qualitatibus  
contrariis, neque tota substantia contraria:  
quomodo theriace sumpta medicamēti pur-  
gantis vim & actionem abolet: quomodo  
magnes alio cōfrictus ferrum à se abigit,  
non attrahit: succinum oleo maceratum pa-  
leas nō attrahit, sed eas etiam oleo imbutas  
à se repellit, antipathæa rerum & occulta na-  
turarum contrarietate, vt antè diximus.

*Libr. 10.  
simplic.*

Virtutem imbecillam augment ac excitāt  
medicamento, quæ illi imbecillo robur,  
tardiori celeritatem, crassiori tenuitatem,  
denso raritatem, graui leuitatem, insipido  
acrimoniā, aut falsuginem, aut amaritudi-  
nem, adiiciunt, si qualitatibus illis est opus:  
si contrariis, quæ contrarias afferunt: vt  
vstio terreis & metallicis vires addit, & ce-  
leritatem, tenuitatem, leuitatem, raritatem,  
acrimoniam. Vsta enim omnia essentia te-  
nuitatem acquirūt & acrimoniam, excepta  
chalciti,

Ruta



Ruta & ramus salicis & cortices eius ar- *Lib. 9. cō-*  
 teriacis quibusdam inter parandum mouen *ph. parti.*  
 dis, siccata abiciuntur, noua substituuntur,  
 vt in diachalciteos ramus palmæ præscindi  
 tur sepe, lib. i. comp. ph. gen.

Quæ partem roborant, medicamentis mi  
 scentur: vt hieræ picræ, mastiche, crocus, &  
 alia aliis plurimis. Crocus idem linteo pu  
 ro ligatus incoquitur, expressus abiicitur in  
 arteriacis, lib. 9. comp. ph. part.

Hodie Arabum sectatores turbith iun  
 gunt zingiber, tâquam eius calcar: agarico  
 salem fossitium (gemmeum vocant) & stœ  
 chadem, si ad caput ferri volunt. Scammo  
 nio cor lædenti ambram cor ipsum robo  
 rantem: crysallum, refrigerantē inflammā  
 ti: gallam astringentem aperiēti eidem ora  
 venarum: spicam item mastichen, tragacan  
 thum, caphuram vna ratione vel duabus.

Vim medicamenti noxiam corpori, &  
 etiam deleteriam emēdamus, vt cantharidi  
 bus per se & suæ naturæ contrarietate vesti  
 cam vlcerantibus miscemus alia, quæ vim  
 earum exedentem corrigūt: vretica tamen  
 si vrinam cieri affectus requirit, & ceratum *Li. II. sine*  
 eisdem miscemus, aut emplastrū idoneum *plic.*  
 ad vngues *ψωγώδεις.*

Sic elloboro nigro humanæ naturæ con *Li. i. rat.*  
 trariam vim emendat Hippocrates misto *viēt. acu.*



anisi, dauci, seseleos, cumini semine odore simul & esculento.

Sic mel veteres, hodie magis saccharum medicamentis sumendis miscemus, linguam & os prius vino interdum abluimus, & cyathi tam fundo quam labris iucunda sapore & odore miscemus, & os sumpto pharmaco abluimus, aut delicato condimento recreamus, ne tristato illi consentiens stomachus subuertatur, & ad vomendum ventriculus incitet. Sic catapotia foliis auri interdum tegimus, interdum saccharo, & aliis.

*Lib. 7. me  
abod.*

Nec omittenda est cuiusque temperamenti proprietas, quæ ut in alimentis, sic etiam in medicamentis vim habet magnam, ut non modo expendamus an hoc illud medicamentum partis & totius temperaturam vel eandem vel diuersam seruet, (quomodo Galenus docet in medicamentis ulcerum lib. 3. 4. Methodi) sed quomodo se habet ad medicamenta hæc vel illa. Quædam enim naturæ clysteribus etiam malo suo necessariis omnino sunt abstinendæ, cum ab his sentiant sæpe mulieres mox uterinos affectus, aliæ à potionibus medicis, quædam à catapotiiis, aliæ à bolis purgantibus, aliæ ab aliis omnino abhorrent, vel ob naturæ suæ cum his contrarietatem, vel opinione aliqua



qua id persuasit, vel quia iis usæ malè habuerunt. Ob id rogandus quisque est, si quando purgatus est, & qua purgatorii medicamenti forma præcipuè delectetur.

Ut melior fiat medicamenti actio, miscentur quæ ipsum gratius reddat colore, *Gaius natura hum.* odore, sapore, consistentia, siue sumendum est, siue admouendum, nisi quòd in admouendo saporis minima ratio est habenda, nisi quatenus illi cum odore conuenit. Sumenda autem si quatuor dictis dotibus sint iucunda, & præterea pauca, ventriculus trahit promptius, comprehenditque: actu etiam calida citius reddit, aut frigida, si calidior erant potestate, & si refrigerandum est: ob id & celerius & valentius agunt. Si quo *Aph. 38. li. 2.* horum autem fuerint ingrata, non comprehenduntur, non retinètur, sed ventriculum evertunt, & vomuntur mox, aut deiiciuntur sine actione, uti & alimèta quauis meliora: quia tamen ingrata sunt, non comprehenduntur à ventriculo, nec ob id coquantur. Cum autem suum cuique sit iucundum vel consuetudine, vel imaginatione, vel tota substantia, & horum quodque sola experientia noscatur, rogandus quisque est, quo medicamenti sumendi aut etià admouendi crassamento, colore, odore, & in illo etiam sapore delectatur.

C O L O R



## C O L O R.

Propterea daturi medicamenta vel foliis auri tegimus, vel vase argenteo, stanneo ve, aut alia constante materia non trasparente includimus, oris angusti, idq; in tenebroso aëre propinamus: ob id etiam inuenta emplastra melina, id est, rufa, & coloris cydoniorum, ex vsta ærugine docet Galentis: quia ex ærugine cruda viridia quosdam terrent: sic cauteria maximè occultamus, præsertim meticulosi: & scalpello venas aut arterias secturi, aut hæmatophobis his faciem velamus, aut alio torquemus.

*Lib. 2. cō.  
ph. part.*

*Libr. I. cō.  
ph. gen.*

*Nota ad  
coctiones  
medica-  
mentorū.*

*Li. 2. rat.  
viēt. acut.  
Hippoc.*

Vt emplastrum ex lithargyro sit albius, deligit Galenus oleum purius & lucidius, & aquam puram & candidam, quæ cū lithargyro in mortario temperat, deinde igni ex lignis peruri cœptis vel perustis antè carbonibus exactè incensis coquit in aëre syn-cero, sub dio, in sole. Oleum autem crassum, aqua turbida, aër nubilus, vmbra, fumus, medicamēto facile nigredinem conciliat. Quòd si primus iste focus coctionem non absoluit, in alium similiter ardentem cacabus transferatur.

In his quæ sorbitionibus mista ventrem solvunt, non nihil præsidij est, nisi ob amarorem, vel asperitatem, aut multi-  
tudi



tudinem, aut colorem, aut fuspicionem aliquam omnino fuerint ingrata. Multitudinem non sine causa adiicit, quæ etiam alimenta facit ingratiiora, non ægris solis, sed etiam sanis: cum alimenta minus larga auidius deuorentur, quàm largiora.

Ob id ægris cibos auersantibus alimentum parcius est offerendum, multò magis medicamentum. Quapropter cum largius purgandum efficaciora sumimus, si nihil repugnet, ne magna remedij imbecillioris copia opus sit. Sic puluerem hieræ diacolocynthidos, & alterius cuiusuis potius damus catapotiiis aut aliter, quàm ipsam hieram melle exceptam, nisi res alia aliud suadat. Sic cum purgatoria infundimus liquori idoneo, paruam potionem imperamus, ne copia largiore ægrum à deglutiendo deterreat, neue ea si semel sit deuorata, citius & valentius stomachum euertat.

Melina (vt paulò antè dixi) fiunt vnguēta, id est, mali cotonei colore, cocta medio-criter, seu vsta ærugine: quia color hic est gratior, neq; terret ægros, vt sæpe viridis ab ærugine cruda. Cerussa quoque quibusdam vnguētis additur ad coloris albi gratiam.

Huc pertinet quòd quæ simplicia coloris propè expertia sunt, vt aqua, tunica cornea, colores omnes optimè recipiūt: vt inodora  
(qual

*Lib. 2. cō,  
ph. gene.*

*Li. 6 sim.*



*Li. 2. ali.* (qualis est balanus myrepfica) omnibus suscipiendis odoribus aptissima: & insipida, ut cucurbita, saporibus omnibus recipiendis sunt appositissima.

## O D O R.

Quantum odoris gratia in medicamentis tam sumendis quam ad mouēdis valeat, docent abundē Medicorum omnium libri.

*Libr. 1. c. ph. part.* Ob id enim Cleopatras Medicus ad capillos in capite gignendos succo radicis arundinis, muscis vstis, adipi vrsino, oleo cedrino, vinum aut passum affundebat, ut odor obtunderetur.

*Ebide.* Sic pilos tenuatibus scilicet, tergētibus, ut nitro, ossi sepia, pumici odorata miscet Galenus libro 1. composit. phar. part. cyperum, schœnu anthos, melilotum, rosas siccas, iridem Iliricam, herbam cydonia m, melissophyllon: & si opulentis paras, spicam nardi, Indicam & Gallicam & montanam, terram Erethriadem, malabathrum, folium malabathri, amomum, myrrham, crocum, costum, mentham. Crito ibidem etiam psilothra suauem habere odorem volebat.

Nec te moueat, quod amomum, & alia quædam similia diuitum compositionibus addi legis, nonnunquam pauperum. Illis enim largius, his parcius immisceri intellige.

Vrina



Vrina licet achoribus sanandis conueniat, quia tamen est odore ingrato abominabilis non vtenda est. Ad odoris gratiam cyperus additur capillos tenuantibus.

*Ibidem.*

*Ibidem.*

*Lib. 5. cō.*

*ph. part.*

*Lib. 7. cō.*

*ph. par.*

Sic odorum dentifricium facit Galenus miscendo casiae aut amomi drachmas duas mediocribus : cinnamomi autem drachmam vnam regibus.

Bechicis adduntur semina petroselini, apij, dauci, feseleos, vt aliorum medicamentorum insuauitatem suo odore grato & sapore emendent, & frigidorum vires obtundant, vt etiam vrinas prouocent.

Odorem cuique iucundum medicamentis addendum declarant emplastra *iuvdia* id est, suauolentia, vt intelligas nō sumēdis solis, sed etiam ad mouendis medicamentis odorem gratum esse conciliandum. Cū medicamenta omnia, praesertim purgantia, ventriculum, & praecipue stomachum nervosam eius partem & maxime sensilem laedant, his odorifera sunt miscenda, quae noxam eorum obtundant, actionem verò non impediant: quae praeterea tenuent crassos succos, incidunt, tergeant, vias aperiant, per quas est vacuandum.

*Gale. lib.*

*quos pur.*

*opor.*

Quae qualitates habent odoras, misceri debent stomachicis, vt aromata & semina quaedam etiam esculenta, anisum, daucum

cum



cum, fefeli, cuminum, quæ etiam Hippocrates miscet peplo & veratro nigro, per id pleuritidem sub diaphragmate purgaturus, ut medicamentosum quod in eo est humanæ naturæ contrarium, mitigetur & obtundatur. Nam ut foetida omnia stomachum subvertere solent, sic odora roborare. Quod si non modò odora sint, sed etiam esculenta, multipliciter iuuant stomachum malis humoribus subuersum, ut idem de vtero & vterinis remediis tibi persuadeas.

**Zi. 8. met.**

Absinthium aqua feruente tingendum, quò minùs odore offendat, postea oleo incoquendum ad ventris fluentis fomentum, si modò vacuatio ampliùs non duret.

Sic nostra casia tanquàm cinnamomo quæ sumuntur omnia aromatizamus, aut alio odoramento naturæ ventriculi & partium aliarum principum familiari.

Odore enim iucundo fit, ut non modò incundius sit medicamentum, sed etiam eo odore spiritus animalis & vitalis reficiatur, ut alimentorum sic medicamentorū. Quò fit, ut lipethymia languentibus caryophyllum, nux moschata, zingiber, & alia id genus animum mox reuocent, uti odor pa-

**Apho. 18.**

**libr. 2.**

**Lib. 11. sim.**

nis, aceti, vini, & similium. Nam odore vires celerrimè reficiuntur, secundo loco, postremo cibo.

Quam



Quam rem persuasi omnes graueolentia fugimus tam sani quàm ægri, ceu naturæ nostræ contraria, tametsi omnia id genus naturam nostram non lædere ostendat castorium odore abominabili, sed quod nec sumptum nec admotum cuiquam vquam nocuit.

## S A P O R.

Saporum iucunditas cuique hominum naturæ sua magni est momenti, vt non modò alimentum sit salubre, sed etiã vt medicamentum sumptū sit efficax. Ob id rogandus quisque est medicamētū sumpturus, quæ maximè saporis differentia delectetur. sunt enim qui austeris, alij acidis, alij dulcibus, sunt qui salis & amaris ducuntur, nonnullos acria delectant. Hunc igitur saporem medicamento insigniorem dabimus, quo æger præter cæteros delectatur, nisi eius vis affectum nobis curandum insigniter sit auctura. Nā sapores calidos salsum, amarum, acrem in affectibus multum calidis non probauero: vt neque frigidos acerbum, austerum, acidum in frigidis. Cur autem non odore modò, sed etiam sapore suauia esse debeant alimenta, docet Galenus Aph. 38. libro 2. Paulò deterior cibus aut potus, suauior tamen, melioribus & minus saui-

A



*Lib. 6. cō.  
ph. par.*

busest præferendus. Medicamenta verò iucunda esse quatenus licet, debent, ut à ventriculo comprehensā in actum reducantur, ac ne-nauseam, flatus fluctuationes ex insuauitate ipsa pariant, adeò ut citò suprà aut infrà ventriculus excernat. Sic qui primus stomaticum diamoron composuit, cum molle coxit, ut & gratus esset, & diutius seruari posset. Præstantior enim est succus mororum per se incipienti oris phlegmonæ, sed gravior & perseverantior cum melle coctus. Nam citra coctionem etiam cum melle repositus citò corrumpitur: coctus autem cum melle non modò diu seruator, sed etiam utilius fit sequentibus phlegmones temporibus, incrementò, statui, & declinationi, ad perfectam usque curationem.

In omnibus autem oris affectibus medicamento suauiatem cuiusque palato gratam sumere non satis est, nisi ea visceribus ori per gulam & guttur communicantibus etiam innoxia sint.

Quæ considerans qui primus diamoron composuit stomaticum medicamentum, succum mororum cum melle coxit, ut scilicet gratus esset, & toto anno seruatum in proprium esset, quoties vtendi occasio incideret, non solum tempore mororum.

Opule



Opulentis itē & delicatis viris & mulie-  
ribus, & malo natura stomacho præditis,  
stomatica simplicia sunt gratiora medica-  
mentosis, vt quod ex succo foliorum moro-  
rum fit, quod omnium est maximè imbecil-  
lum: ex succo enim batinorum est valentius  
hoc item potētius: ex succo corticis nucum  
viridium costo cum melle, licet nō sit acer-  
bus gustu, vehemētissimè tamen astringit,  
vt succus ex granatis acerbis cum corio tu-  
sis expressus, ex dulcibus autem sine cortice  
expressus est suauior sed imbecillior, cum  
cortice valentior sed insuauior. Ex tribus  
autem generibus simul tusis addito glycy-  
rhizæ succo, bonus est, nec immodicè exaf-  
perat. In his igitur vide, ne suauitas vires  
quæritas obscuret.

Eadem saporis gratia vinum phalernum  
acre laudatissimū mithridatio & theriacæ  
miscendum, vt amarorum in his antidotis  
multorū iniucunditatem tegat, docet Ga-  
lēnus lib. antidotorum. Sic Hippocrates ve- *Li. 2. rat.*  
ratro nigro daucū, vel fefeli, vel cuminum: *viēt. acn.*  
vel anisum: peplio silphij succū miscet, vel a *Ga. in na*  
liud quidpiā non solum odoris iucūdi: sed *tur. hum.*  
etiā saporis, quē sub olore intelligere nō est  
difficile, cū horum duorum sensoria sint  
substītia, situ, actione proxima, & in plerif-  
que actionibus communia. His enim cōdi-



mentis medicamento purgantis insuauitas corrigitur sic, vt in ventriculo diutius morari possit. Multa enim pharmaca potanti tam sunt insuauia, vt stomachum peruertant, & vomitum protinus cieant. Alia licet paululum in ventriculo manere possint, prauos tamen ructus mouent, & post euomuntur.

Sapor igitur cuique iucundus quoad eius fieri potest seruatis medicamēti viribus appareatur, in sumendis omnibus, vt alimentis, in quibus vt domini gulæ & palato coquus seruit: sic in sumendis omnibus per os medicamentis siue alterent tantum, siue humores apparent incidendo, tenuando, tergendo, siue humorem aliquem qualitate molestantem purgent, siue partes ipsas roborant totius substantiæ similitudine, vel astringione, vel alia qualitate manifesta intemperaturæ partis contraria, siue ore retineantur, siue etiam deuorentur.

*Li. 4. fa-  
uit. tuend.  
in oxyme-  
lite.*

*Lib. 4. fa-  
nit. tuend.  
in diaca-  
laminthe.*

Cuiq; iucundus sapor nobis dicitur, quòd ne vinum quidem homini familiarissimū alimentum omnes idem iuuat, sed hunc dilutius, alterum meracius, sic nec oxymeli omnibus eadem aceti mellis & aquæ mēsurā coquendum, sed pro cuiusq; voluptate, quāquam plurimis naturis commune vnū scribi potest, quale quod à Galeno ibi describitur,



tur, non tamen omnibus: sic in diacalaminthe si mellis plus inieceris, pluribus iucundius facit: his tamen qui dulcia auersantur (sunt enim quædam talis naturæ) iniucundū. Fiat igitur medicamentum cuiusque naturæ iucundissimum, quoad eius fieri potest, sed tamen virium eius vtilitate seruata: hanc enim solui nolo, dum dulcedini & iucuditati studetur. Ob id rogādus quisque est æger ante medicamenti compositionem, quo sapore (& si vis qua forma medicamenti) maximè delectetur.

*Lib. 6. cō  
ph. par.*

## C O N S I S T E N T I A.

Crassa consistentia medicamenta ægrius & in corpus penetrant & deuorantur, quàm tenuia & liqda, vt cibo quàm potu impleri est difficilior: ob id crassa esse solent ingratiōra & nauseabunda magis. Quæ causa est, cur bolos catharticos, vt vocamus, liquore aliquo suauis dissoluere non rarò cogamur, qualia adhuc sunt ingratiōra, quàm quæ liquidiora sunt & perspicua. Quapropter collo pāneo & albuminibus purgare solemus. talia sunt nostra apozemata, zulapia, serapia, & quæ in rē præsentē coquimus aut infundimus medicamenta vel purgantia, vel aliter corpori profutura. Ob id mel aqua exigua liquatur, vt poros cutis obstructos ingredi ad detergendum possit.

*Apho. II.  
lib. 2.*

*Lib. 8. mē  
thod.*



*Lib. 7. cō.  
ph. part.  
ad finem.*

Sic dum asthma & orthopnoea sunt ab humore crasso & lento, vel purè in asperæ arteriæ meatibus vel pulmonum cauernulis infarto, tenuantibus, tergentibus, & humiditate copiosiore, vt potu vini largiore opus est, quò crassus humor & lentus ceu liquidior redditus, sursum per tusses à tergentibus excitatas, egeratur. Si verò abscessus adest, vino pauco opus, ob id siccantia esse incommoda reddendis ex thorace ac pulmone excreationibus docet Galenus.

*Li. 5. sim.  
cap. 21.  
Lib. 1. cō.  
ph. part.*

Est quando consistentia non ad gratiam tantum, sed ad melius agendum est. Ladani enim quia ceræ consistentia est simile, humiditatem requirit, quæ liquidius ipsum faciat: vires tamen eius non minuat, imò potius augeat, cum fluentem capillum per id sistere consilium est. Liquidum igitur fiat in vase duplici, ex vino austero & oleo myrteo maceratum: vel soluatur oleo lentiscino, vel mastichino, vel myrteo, & si ætas & aer frigida sunt, nardino, vel vino veteri & austero. Quæ omnia adstringendi viribus cum ladano conueniunt, & calore alimentū pilis attrahente. Hispanum verò & omphacinum oleum solum astringunt: vetus sabinum, ricininum solum digerunt, ergo horum neutrum per se conuenit, sed priorum loco misceri ambo simul poss



possunt. Item ladanum liquidius confis-  
tantum capillis adhibemus: crassius rasis, ut  
illos penetret, his hæreat, addito quoq; po-  
lytricho fiet efficacius ad pilorum produ-  
ctionem. In his autem oleum & vinum  
etiam rationem habet eius, sine quo lada-  
num nec applicari, nec agere possit. Me-  
dicamentis quoque capillos fluentes sisten-  
tibus, nisi sint essentia tenui, adduntur alia,  
quæ tenuitate essentia intro penetrantia  
cutem quoque in alto adusque pilorum  
radices alterent, neque per summa tantum  
vagantur.

Consistentia mediocris qualis est mellis *Lib. 6. c.*  
Attici, aut sordium auris in stomaticis, ut in *ph. par.*  
diamoro, & similis crassitudo in stomachi-  
cis, ut in diacydonio.

Consistentia etiam parua linimentis, ma- *In fine li.*  
ior vnguentis & ceratis, durissima empla- *6. sancta.*  
stris. Quapropter his cera nunc parcior *tuend.*  
nunc largior, & lithargyros additur ad cor- *Lib. 1. c.*  
pus & materiam præbendam. Sic oleo ex *pha. p.*  
semine abietis, vel floribus populi nigrae, & *Lib. 4. sa-*  
anethino, & chamæmelino sampsychino, & *nita. tuen.*  
similibus cerâ & resinâ addit Gal. ubi diu-  
tius vult super uncto corpore manere.

Magna humoris & eius tepidi quanti-  
tas in vomitoriis est efficacior, præsertim



si oleagina addantur, & diebus aliquot fiat præsumpta incidentia tergentia.

*Lib. 6. cõ.*

*ph. p.*

*Lib. 8.*

*meth.*

Crassa ut metallica, terrea vrendo fiunt tenuiora, & sic aptiora ad penetrandum.

Dia *λαρύνω* ob essentia tenuitatem efficacius stomaticum quàm dia *μώρω*. Penicillus, purpura marina, præsertim optima Tyria tinctus, tenuiorem astringendi vim habet, qua altè penetrando corpora quæ sunt circa ventriculum siccat ac roboret, & calfaciat, si calida illi misceantur.

*Lib. 3. cõ.*

*ph. p.*

Acetum essentia tenuitate in altum deducit medicamentorum aliorum vim, cum præsertim refrigerandum est: ut euphorbium, quando est calfaciendum.

*Lib. 8.*

*meth.*

Mastiche tusa oleo nardino mista ad for-  
dium crassitudinẽ sit, quo penicillus purpureus madefactus stomacho imbecillo imponatur. Et hæc de renui, duplici sicco & liquido. Contrà est, quando crassities optatior est, ut in vlceribus asperæ arteriæ, aut œsophagi crassa sint & lenta quæ adhibentur medicamenta oportet vlceri idonea, cum gummi tamen & tragacatha vel similibus, quæ suo lentore medicamentũ affectæ parti diutius affigant. Crassitudine etiã mediocri stomatica & stomachica esse componenda paulò antè probauimus. Sic in vlceribus intestinorum, vesicæ, vteri.

*Lib. 1. cõ.*

*ph. p.*

Sic



Sic in alopecia, vbi olei laurini libræ vni Romanæ miscuisti thapsiæ, aut si valentius vis, euphorbij: si infirmius, sinapi & nasturcij partem duodecimam, hoc est, vnciam vnam: si facilè à capite raso defluxurum tibi videbitur medicamentum, adde ceræ momentum, & vnciam vnam.

In nocturnis venereorum imaginibus crassioris substantiæ vnctiones seu cerata quibusdam compono, ne facilè à corpore defluant. *Li. 6. sanit. tuæ.*

Piper, zingiber, baccas iuniperi, mastichen, & alia quædã integra deuoramus, cum ventriculũ calfacere citra hepatis calidi noxam volumus. Si autẽ hepar & longinquas partes calfacere studiũ est, vel aliter medicamento tentare, nõ modò ea læuissimè trita sumimus, sed etiã liquori mista tenuissimo.

Huc pertinet, quòd quædã medicamentis inspissandis adduntur, quæ viribus eorũ nec obsunt nec prosunt, sed materiæ tantũ & corporis rationem obtinent, vt lithargyros emplasticis, & cera iisdem ac vnguentis, ceratis, linimentis.

Quanquã & lithargyros ceu materia *Libr. 9. simpl.* misceatur his quæ valentẽ habent facultatẽ mordicantem vel astringentem, & cera liquabilibus medicamentis etiam ceu materia, quia etiam ipsa quodãmodo media est



eorum, quæ valentem habent facultatem.

*Lib. 6. cõ.*

*pha. part.*

Nonnũquàm tenuitas & crassities actiõ-  
nem & suam & aliorum iuvant: vt diamo-  
ro addita crocus & myrrha, præterquàm  
quòd phlegmonas oriscoquũt, & ille repel-  
lit, hæc suo calore abũdè digerit eadẽ in al-  
tum corpus inflammatum essentia suæ te-  
nuitate subiens simul croci minùs substãtia  
renuis, & reliquorum vires secum trahit, ac  
phlegmonem in altũ vsq; sanat, ac citò ad  
cutim recurrendo, secum quæ in alto sunt, à  
se tenuata educit. Crocus verò & succus mo-  
rorum vicissim contrahendo myrrham in-  
trò impellit, & eius ad cutim reditus celeri-  
tatem præproperam inhibet. Ob hæc virtus  
diamori longiùs peruenit deductis altiùs à  
myrrha astringentibus: hæc autem myrrha  
ab astringentibus impulsã mororum succo,  
croco, succo rhois, omphacio, rosis siccis, ba-  
laustio, malicorio, galla immatura, hypoci-  
sthide, & cæteris astringentibus vim dele-  
teriam non habentibus. prædicta enim mi-  
scentur, cùm vis diamori validior est faciẽ-  
da. Quo loco tenuia & crassa tanquàm da-  
re operas mutuas videntur, & alterum alte-  
rius actionem reddere meliorem.

*Li. 8. cõ.*

*ph. par.*

Præparatio item quædam per trituram,  
cribraturam, vsionem, lotionem, in pleris-  
que vt meliora fiat, magni est momenti, &  
etiam



eam ordo miscendi: vt si phlegmone in-  
 eruit, medicamenta potentius digerentia  
 obè trita & tenuissimè cribrata sint mi-  
 nima, vt costus, macer, animum, carda-  
 momum, pyrethrum, acorum, meon, di-  
 ammus, succus Cyrenaicus vel Medicus.  
 Si autem iniicienda, cum medicamen-  
 tum propè omnino coctum erit, aut etiam  
 solutè coctum.

Medicamenta componendo apta exactè  
 elaborada, vt facilius corporis meatus  
 pateant, ob quem transitu celerè si calida sunt  
 de morfu munere suo funguntur: si frigi-  
 da, celerius expectatum opus praestant.

Alcyonia vtraq; amygdalas amaras to- *Lib. I. c.*  
 cum corticibus vstas & nitrū crematum *pha. par.*  
 opocia adhibet Galen. vt tenuiorum sint  
 artium, & ob id ad imam cutim vsque pi-  
 urum radices penetrent.

Medicamenta quæ per venarum oscula *Lib. 4. fa*  
 promptè subire volumus, & in omnem cor- *nit. tuen.*  
 poris partem digeri & ferri (qualia quæ su- *in diaca-*  
 res, vrinas, menses mouent, obstructio- *laminthe.*  
 es liberant hepatis, lienis, renum, corporis  
 abitus) illa sunt curiosè terenda, & tenui-  
 simo cribanda, vt prorsus sint tenuissi-  
 ma. Sic Galenus calaminthen, pulegium,  
 mynum, petroselinum, fefeli, libysticum,  
 omen apij, piper graue simul tusa subtili  
 crib



cribro creta miscet compositioni diacab  
minthe, ad vacuandum humores acres  
rota carne cessantes.

Sic ibidem nitrum, cuminum, rutam,  
per tenuissimum & minutissimū, facere do  
cet, cum urinas multas mouere consiliu  
est: crassius verò id faciendū, quoties per  
aluus est deiicienda, ac huius præcepti  
omnium medicamentorum cōpositione m  
minisse expedit. Sic hodie nos rha barba  
rum negligenter terimus, cum aluus per  
ducenda est: curiosè verò tritū damus ur  
nas moturi.

*Lib. 6. c.  
ph. par.*

Aromata sunt miscēda ad finem coctio  
nis, aut ea iā absoluta, cum vas ab igne de  
posueris, quòd largior ipsoꝝ coctio ar  
maticis medicamentis vires adimit: contra  
verò lithargyros, molybdæna, & alia multa  
metallica coquendo meliora redduntur.

*Lib. 6. cō.  
ph. par.*

Succis stomaticis crassis mel statim a  
initio est miscendum, si liquidiores sint,  
succus nucum: percoqui debent antequā  
mel addatur. nam coctione tam longa  
stum amaricaret.

Multò plura de his quæ ad medicamen  
torum præparationē pertinent, leges libri  
tertio. Quæ hīc adscribere nō est visum, n  
idem bis dictum quisquā calumnietur, nul  
la neque vtilitate neque necessitate.

EC



Est quādo acris & mordens qualitas ex-  
igitur, vt in balanis & clysteribus per mel,  
echarum rubrum, hieram picram, mercu-  
lem, sales, id genus alia.

Neq; basibus ipsis solū addenda, quæ  
ipsam ad partem sibi familiarem deducant,  
sed etiā quæ ipsam in ea parte remorentur,  
si in hepate medicamentum morari diu-  
is volo, semen raphani stomacho grātum  
misceo, quod medicamentū distribui fe-  
nans retrahat & remoretur. Additur &  
multis opium, quod vires medicamenti per  
corpus distributi tot coctionibus resolui  
prohibeat, aliis ad sensus stuporem in vehe-  
mentissimis doloribus.

An verò multa medicamēta eadē facul-  
tate prædita misceri debeāt, tāquā cōposi-  
tum melius redditura, ambigi potest, cū  
multa fiat pluribus, quod paucioribus perfi-  
ci potest: tamen causæ quædā nōnunquā  
accidunt, vt docuimus, quæ nos ad id faciē-  
dum compellunt, nec factum hoc nostrum  
aret veterum imitatione: nam Galenus in  
compositione medicamētorum secundum  
partes idē pollentia sæpe miscet, vt ad diu-  
rnam & curatu difficilem alopeciā sim-  
plicia eiusdē facultatis euphorbiū, thapsia,  
sulfur viuum, elleborus alteruter cum oleo  
aurino, aut cicino, aut veteri miscentur.

*Libri.*

Opo



*Libro 2.*

Oprobalsamum, peucedanum, castorium  
& simul & priuatim seorsumq; singula  
veteri capitis dolore cum oleo & aceto na-  
scet Archigenes apud eundem, nec repi-

*Ibidem.*

henditur. Viticem, mentham, amygdala-  
mara, iridem, ana cum aceto & rosaceo.

*Libr. 6.*

In stomatico diuitum costi, amomi, ma-  
ceris, opij Cyrenaici vel Medici, vel alteri  
pauperum verò dictamni, cardamomi, ma-  
acori, sinapi, duorum, trium, vel omniū  
quantam voles mensuram, modò sint ta-  
tū horum drach. tres, aut drac. quatuor  
dimidia, pro libra mellis. Si autem quatuor  
aut quinque drach. miscueris, digerens mi-  
gis reddis medicamentum.

*Ibidem.*

Diamoro & aliis stomaticis diuitum m-  
scere potes vel corticis casia, vel nardi Ind-  
ca, vel folij malabathri, vel omniū triū an-

*Ibidem.*

drac. vnam, vel drac. vnā & dimidia. . . Pa-  
omphacio succus rhois, vel æqualis vtrius-

*Lib. 3. ad  
finem.*

portio diamoro miscetur. Chalcitin, m-  
fy chalcathum simul miscet Andromach-

*Ibidem.*

apud Galenū. Adipes leonis, pardalis, hye-  
na, anferis, vrsi propè eadē facultate præda-  
tos, si habes, omnes simul miscere oportet  
& ad horum partem vnā euphorbij ve-  
thapsia partem duodecimā, vel vtriusq; an-  
partem duodecimam, tūc q; fit valentiū.

Seminis eruce, & nasturtij, & nitri ana m-

scet



scet Heras ibidē. Medicamento stōma- *Libr. 6. c.*  
 tico dia gleucus miscet heminas tres rhus *ph. part.*  
 coriarij, vel culinarij, aut amborū simul ana-  
 heminam vnā & dimidiā, & etiā paulò am-  
 plius: & addit astringentia, si principium est  
 fluxionis: digerentia, si declinatio morbi:  
 ex fluxione nati. Quod si vnicū habes vel  
 astringēs vel digerēs simplex medicamen-  
 tū, illius quātitatem auge, vt expleat, quod  
 ab omnibus colligebatur. Quin ipsi dia-  
 gleucus & diacaryo omnia immittere licet  
 initio quidē astringentia, vt gallā imma-  
 turā, surculos molles rubi, vel canis rubi, vel  
 corni, mespili, sorbi, & fructū eius, & myr-  
 ram: rosam, glāuciū, cytinus, balaustia, om-  
 phacium, rhum vtrūq; prius aqua coctū, ta-  
 maricen, spinæ Aegyptiæ fructū, & cætera  
 astringentia, præter ea quæ pharmacœde, id-  
 est venenosam & noxiā facultatē habent, si  
 deglutiantur. Digerentia verò mediocria:  
 decoctū caricarū, furfuris, mulsam cui inco-  
 ctum sit origanū, hyssopū, thymū, calamin-  
 the, pulegiū, metha odorata. Fortiora sunt,  
 eaq; amplius coquenda, nitrū vstrū, nitri spu-  
 ma. valentius his sulfur viuum, pyrethrum.

Andromachus in diarhœo miscet cinna-  
 momi & casia ana drach. vnā.

*Libr. 6.*

Croci & crocomagmati ana drac. duas. *Ibidem.*

Alumen rotundū, fori, misy, chalcitis ad *Ibidem.*

oris



oris vlcera simul miscētur apud Galenum.

Generosissimæ oris collutiones in phlegmone gargareonis, vel aliarum oris partium incipiente parātur ex prædictis astringentibus, vel singulis per se, vel decoctis in aqua cum aliis. Mirum enim quanto ipsorum mistiones subinde vtiliores fiant vsu simplicium.

*In fine li.*

*1. c. ph. g.*

Emplastro cuidā albæ miscet cadmiæ, pōpholygis, cineris buccinorū, squamæ aris, calcis lotæ, chalcitidis vstæ & lotæ singulorum drach. quatuor, vel drachm. sex, si ex his tantum quatuor simplicia misceantur: vel drach. duodecim, si tātum duo tibi sunt ad manum, vt ex his quomodolibet iunctis drac. viginti quatuor. i. vnciæ tres iniiciātur.

Tamen si alitius spectes, hæc non idem pollent nisi genere, sed ratione maioris & minoris differunt: vt euphorbium violentius est thapsia, & hæc potentior nasturtio, vt libr. i. comp. ph. par. sic in aliis discrimen aliquod inuenias.

In arteriacis iisdem casia, cinnamomum, amomum, nardus Gallica & Indica, costus, schoenuanthos, malabathrum, & magma malabathri ponūtur. Itē thus, crocus, myrrha dispositiones coquentia iisdem miscētur: sic & glycyrrhiza, gummi, & tragacantha, quæ exasperata lauigant.

In



In diospolitico ruta, piper, cuminum, mel *Lib. 4. fa-*  
curiosè despumatū, nitrum, ad flatu discuti- *nit. tuen.*  
tiendos omnia efficacia. In medicamento  
dia trion pipereon tria piperis genera, zin-  
giber, anisum, thymum. In dia calaminthe,  
calaminthe, thymum, pulegium, apium, pe-  
troelinum, seseli, libysticum, piper graue.

Ex libris aliis Galeni exempla afferre pos-  
sumus propè innumerabilia, in quibus idē  
propè pollentia medicamēta simul miscen-  
tur etiam plurima. Vide tamē ne copia im-  
modica luxuriēs, magno saepe ægri dispen-  
dio, sed contentus esto simplicibus quā  
fieri potest paucissimis. Quò enim simpli-  
ciora sunt composita, si scopis nostris satis-  
faciunt, eò sunt præstantiora, præsertim quæ  
mox à componendo sunt vsurpanda. Quæ  
verò ex pluribus constant, longa omnium  
simul ceu fermentatione percoqui ferè indi-  
gent, per quam vis per sepe contraria prio-  
ri acquiritur, & forma quædam noua à sim-  
plicium formis diuersa, per solam experien-  
tiam cognita: vt theriace recens stupefacit  
(nisi cinnamomi præstantia coctionem e-  
ius accelerarit, vt in theriace audies) vetus  
calfacit, & opera præstat maxima, quorum  
vix vllum in recenti inuenias. Ob id exper-  
ta à veteribus & doctioribus cōposita medi-  
camenta sunt neotericorū compositis me-

B



lora: nisi siqua hi inuenerunt, quæ vsus iam multus optima probarit.

## CONSERVANTIA.

**P**ostremò cùm satis non sit medicamentum nos habere compositum in eum affectum efficax: cuius gratia composuimus, & addita esse à nobis ea, quæ sunt actioni optatæ non modò necessaria, sed etiam utilia: nisi idem compositum à situ & putredine seruetur non dies tantū aliquot, sed menses & annos, interdum etiam multos. Idq; ne frequenter idem componendi labor non necessarius sit sumendus, vel ne simplicium in id necessariorum nunc recentiu facultas tunc non sit, cùm medicamento erit opus: vel vt tempore vires acquirat medicamentum non solū valentiores, sed sæpe etiā prioribus contrarias: quod in theriace & mithridatio accidit, quæ primis mensibus stupefaciunt, postea calfaciunt.

Porro seruare possunt omnia, quæ siccant & humiditatē excrementosam putredinis authorem absamunt, vel per se, vt sicca: vel per accidens, vt calida. Ob id omnia seruanda medicamēta tam simplicia quàm composita corruptioni obnoxia (quedam enim per se diutissimè integra durāt, vt metalli



tallica, terrea, semina, fructus multi) siccamus vel sole vel igni etiam siccantibus adiectis, melle, saccharo, aceto tum per se, tum cum sale, qui solus tamen capparibus & carnibus seruandis, & oleo, & omphacio, & aliis multis sufficit, siccando & astringendo, ne calor externus vna putredinis causa eas subeat, aut internus foras exhalet, quē quia superfusum oleum intus cohibet, etiam solum succis multis diu seruandis sufficit, vt limonum, granatorum, cydoniorum. Eadem de causa aqua pluuia diacodio miscetur, vt medicamentum putredini minus sit obnoxium: habet enim hæc aqua in se aliquid astringens. Quatenus autem quodque genus medicamentorum compositorum sit siccandū, hic audire ne expectes. sed partim imitatione & experiētia discas licet: partim ex his intelliges, quæ in modo praparandi singula medicamentorum compositorum genera libro quarto scribemus.

*Initio lib.  
7. cō. ph. p.*

Sic hiera picra melle despumato excepta fit durantius medicamentū, & theriaca, & diacalaminthe, &c. Sic succus mororū coctione per se, deinde cum melle fit durantius diamoron.

*Lib. 7. me  
thod.*

Medicamentis compositis id iam adeptis cura nostra vt seruari diu possint, ad vrium custodiam ne exhalent, & ipsorum

*Lib. 6. cō.  
ph. part.*



*Lib. I. an-  
tidot.*

tutelam ab iniuriis externis, aëre, puluere, araneis, muribus, & id genus reliquis, loco est opus non solum communi, sed etiā proprio cuique quo seruetur: cum simplicia plurima si loco communi solo serues, nihil pecces. Reponantur autem composita ut simplicia in aëre sublimi, perflatili, sicco, non subterraneo, praesertim humido, ut in quo situs celeriter proueniat, qui medicamentum corrumpat. Succi tamen oleo superfuso tecti cellis vinariis, uti omphacium, melius seruantur, quo aëris externi magnis mutationibus aër ille minus sit obnoxius.

Tamen in magnis urbibus & frequentibus cum densa & angusta sint aedificia, & contignationes plerumque humiles, redimuntur iniuria apertis dies totos fenestris: praeterea siccitate ignis ad quotidianas compositiones necessarij. In his tamen officinis multo sunt praestantiores, ad quas scanditur, & à quarum area tabulatum abest longius. Praeterea quae aëri libero sunt apertae ac soli, modò is radio medicamenta composita non attingat. Nec improbandae, quae solem orientem aut etiam occidentem spectant, neque etiā in septentrionem apertae, modò sublimes, perflatiles, à cloacarum & aliorum inquinamentorum iniuria remotissimae.

Priua



Priuatius autem locus cuiq; medicamen-  
torum compositorum generi suus est, anti-  
dotis suus, trochiscis suus, su<sup>9</sup> & catapotiis,  
& aliis similiter. Is autē ferē vas est, idq; vel  
terreum, & id multiplex, vel vitreum, vel li-  
gneum, vel stanneum, quæ maxima turba  
est, contra Galeni decretum, vel etiam aliis  
metallis constans. Præter hæc quædam alio  
teguntur, vt catapotiorum massæ aluta al-  
ba colligatur. Sed de his fusiùs libro sequen-  
te, in pharmacopolarum instrumentis.

Omnia tamen operculantur, quædam  
simplici ex eadem materia tegmine, & eo  
interdum per ambitum picato aut cerato:  
alia subere, linteo, stuppa, membranis, co-  
rio, papyro, aut alia re quauis, nonnulla etiā  
cera, resina: quædam solo, vt diximus, oleo,  
quæ tamen & communi tegmine ex papy-  
ro aut alio obstruuntur.

Exemplo basim & cætera exerce in hiera-  
picra. Aloë sola in hiera prauos humores  
ex ventriculo vacuat, mastiche additur  
ceu apta stomacho & grati odoris, & ad  
frangendam vim aloës medicamentosam  
efficax.

Cinnamomum tenuissimarum partium,  
ventriculi tunicarum meatus aperit, humo-  
rum crassitiem tenuat, & lentorem terget,  
quos alioqui aloë nunquā traxerit ob im-



becillam vim purgatoriam. Ad biliofas autem in ventre dispositiones præstantissimū est remediū, vt multos stomachi vitio molestatos vno die frequenter sanauerit. Cinnamonū item alios omnes affectus ex prauis siccis contractos iuuat mistum: quia facultatem habet, qua prauas qualitates in naturalem statum reducit. Poterantque hæc duo sufficere, cum cetera sint partim apta stomacho, partim tenuia & absterforia, virtute tamē longē inferiora mastiche & cinnamonomo: genus autem facultatis idem habentia, lib. 8. comp. ph. part.

#### Q V A N T I T A S.

**H**Actenus qua methodo simplicium medicamentorum compositioni aptorum delectū facere oporteat, & quot vt paucissimis ad compositionem sit opus, abundē docuimus: nunc addamus quæ horum simplicium quantitas, id est, pondus aut mensura (dosim vocant) esse in cōposito debeat. si illa videlicet certis limitibus omnino circumscribi queat, quos ultra citraque cōpositi facultas optata esse nequeat. Nā in vnoquoque non modò medicamentorum, sed aliorum quoque omniū remedium genere quantitas sola est, quæ ad vnguem nec dici,



ci, nec scribi possit, sed coniectura tamē artificiosa. Medicus natura prudens, & multa Medicorū lectione exercitius ipsisque medicis operibus quātitatem excogitabit cuiusque legitimam, aut ei proximā ex affectus essentia, magnitudine, temporibus, situ: ex partis affectæ natura, ex simplicium denique ipsorum facultate vel valida, vel languida, non neglecta indicatione à forma medicamenti constituenda, ab aëris temperie, ab ægri habitu molli, duro, raro, denso, sensu tactus exacto, obruso, consuetudine huius vel illius medicamenti, aut insolentia. Affectus enim parvus, recens, superficialis, ob hæc curatu facilis mitiora postulat medicamenta contraria, quā qui in eodem genere est, sed magnus, inueteratus, profundus, proinde curatu difficilior: is enim valida requirit. Ut enim plantæ nouellæ etiam summis duobus digitis nulla vi euelluntur, ubi verò altius radicarunt, ligonibus, ascis, multorum hominum robore magno indigent, ut euellantur: sic morbi recētes leuiores, qui longa mora inualuerunt, valentiora etiam remedia postulant.

*Galina  
poplexia.*

Ad hæc superficialis & sublimibus corporis affectibus medicamēta viribus integris quia occurrunt, tanta esse debent, & sic efficacia, quanta eorū vi contraria affectus ipsi



vt profligantur indigent, & pars ipsa ferre debet. Ad profundos autem affectus penetrando vis medicamentorum obtunditur, quia alteratur, quia aliis etiam miscetur: ob id tantum ei virium cumulamur, & superdamus, quantum in via diminutum iri coniectamus, vt earum reliquum vincendo affectui sit æquale. Cætera hoc exemplo fient manifestiora, si ab affectu, vel affectibus variis sumpta indicatio, & quæ à temperamento partis affectæ, aut etiam totius, & ab aëre sumitur. Idem medicamenti genus suadet, vt refrigerans, medicamentum affectui contrarium est augendum viribus & quantitate, magis, quàm si singuli affectus hi seorsum consisterent. Vt affectui calido in temperamento frigido in aëre calido, refrigerantium vis maxima est adhibenda: quia affectus refrigerantia sibi contraria postulat, & aër quatenus insaluber est, quia intemperiem morbo habet similem, quæ ipsum fouet, & auget, temperamentum verò partis frigidum, similibus seruandum. Quòd si cutis est dura & densa, & sensus obtusior, non modò frigidiora, sed quæ tenuitate essentiaè promptè penetrent, vt acetum, succum corticis viridis nucum, præter hæc affectus requirit. Si verò hæc indicationes pugnent, & diuersum postulent medicamenti genus, quæ

*Lib. 3. san-  
nit. tuend.*

*Lib. 7. me-  
tho. & 9.  
& aliis.*



quæ numero & viribus vincunt, vim medicamenti augendam suadent, quæ vincuntur minuendam, magis & minus pro numero & dignitate indicantium. Si verò affectus multi sint implexi naturæ contrariæ, ut hydrops cum febre, vrgentiori maior vis remedium opponatur, non neglecto tamen altero: sic vbi causa morbi & morbus diuersæ sunt naturæ, ut pituita frigida humida causa febris quotidianæ calidæ & siccae dispositionis, vrgentioris maior est habenda ratio: pituitæ videlicet per tenuantia, incidentia, tergentia, coquentia, phlegmogoga eius generationem prohibentia: febris per refrigerantia, humectantia, putredinem finientia: si æquè polleant, prior & maior causæ est habenda ratio, ut quæ tollenda primo loco sit. In complexis enim affectibus cōsiderandum est, quis affectus cum quo, quis sine quo, quis post quem curandus vel non curandus est.

Si autem causa morbi & morbus eadem postulent remedia, ea sunt augenda ut tertiana febris calida sicca à bile flaua, putrente, calida, siccaque etiam ante putredinem, affatim refrigerandum est. Sed hæc simplicium facultatem intendendam potius probare videntur, quàm ipsorum quantitatem augendam: quāquam aucta quantita-

B 5



te facultas etiam intenditur: vt si pro cinna-  
momo duplum casie cinnamomo longè  
inferioris ponitur, quantitas ipsa casie au-  
cti cinnamomi vires repræsentat. Item quò  
plus & maior quantitas simplicium calfa-  
cientium vel refrigerantium, vel aliud quid-  
uis efficiendum miscetur, eò valentius est  
id medicamentum, vt in diospolitico tan-  
tum nitri quantum singulorum aliorum,  
purgatorium ipsum red sit: & dia trion pi-  
percon est medicamentosius & valentius  
anisi, thymi, zingiberis ana drachmis sex-  
decim, quàm drachmis octo: & hiera pi-  
era valentior cum drachm. aloës 120. quàm  
cum drachm. 100. vel paucioribus: & sic in  
reliquis vires magnas habentibus compe-  
ries.

Item si natura id est, temperatura partis  
affecte & corporis totius est eadem, maior  
sit quantitas, & vis medicamenti cum natu-  
ra partis & totius consentientis, ob id sicca  
magis adhibe vlceri partis natura sicce, si  
totum quoque corpus est siccum: contrà autem  
siccandum minùs simile vlcus, in parte præ-  
humida toto etiam corpori præhumido:  
nam vis medicamenti tunc nature partis in-  
commoda est ac contraria.

Si verò partis & totius natura est diuersa,  
adhibe medicamentorum parti & toti con-  
sentien



sentientium portionem equalem, vel medi *Lib. 3. &*  
 camenta inter vtriusque naturam media: vt *7. metho.*  
 si corpus humidum, pars sicca, misce humi-  
 da cum siccis æqualiter, vel humido sicca  
 temperata simplicia: non oblitus tamen in-  
 dicationis, quam vlcus omne insinuat, scili-  
 cet siccandum se esse, eoq; magis, quo est  
 ipsum humidius, & eo minus, quo est in  
 parte natura humidior.

Ex dictis igitur apparet, quòd affectus ipsi *Lib. 2. cõ-*  
 prædiorũ genera nobis indicant, mensu- *ph. part.*  
 ram verò cuiusq; remedij, & particularem  
 in materiis differentiã, suggerit præter af-  
 fectum pars ipsa affecta, ægri temperatura,  
 ætas, vis vitalis, æris temperies, vt li. 2. com-  
 posi. ph. part. docet Galenus: vbi Apollo-  
 nium reprehendit, multa capiti abiectu vel  
 casu dolenti remedia componẽtem, nullius  
 tamen simplicis expressa mensura.

Quantitas verò huius, vel huius simplicis  
 in composito, nec maior, nec minor cur sit  
 imposita ratione non caret eorum qui pri-  
 mi ea miscuerunt: quòd si paulò vel plus vel  
 minus eorum quorundam miscuissent, for-  
 tasse nec illegitima fuisset compositio, sed  
 quia vñ longo bona est comprobata, eam  
 ne mutauerimus. Cũ enim exquisitè af-  
 fectum (quibus præcipuè medicamenta  
 componuntur) natura cognosci non possit,  
 neque



neque fortasse simplicium, coniectura quadam artificiosa collegerunt maiores nostri, simplicia his viribus utcumque cognitis: hunc affectum coniectura tantum sanatura.

Quantitas autem simplicis eius maior ferè miscetur, cuius facultate ad morbum profligandum magis egetur, siue illud simplex sit, siue compositum, quo præter cætera morbum oppugnare Medicus proposuit: ferè addidi ob id, quòd quæ basès magnarum sunt virium & periculosarum, parciores miscètur. Sic in theriace, minor est portio pastillorum theriacorum, quam scilliticorum: in scammoniatis medicamētis parcum inest scammonium, ob valètem facultatem eius actionem. Item quæ densa, sunt, parciora miscentur quàm rara.

Prætereà cum multa facultate eadem, ut colorifica & roborante prædita, si in remedium aliquod miscentur, ut xylaloë, mentha, absinthium, cariophyllum, mastiche, in stomachi epithema parciora miscebuntur, quàm si singula tantum imponerentur: quòd quantitas mensuræ vel vnius vel plurium, totius effectum intendit, quod cassia duplex, aut carpesium multum pro cinnamomo planè declarat: quòd illa imbecilliora tamen quantitate sua huius qualitatem propè adæquant.

Quan



Quantitatē igitur & mensuram miscen- *Lib. 1. cō.*  
 dorum medicamentorum simplicium, est *ph. par.*  
 quando primum coniectura tantum meti-  
 tur, etiam facultatis simplicium peritus. Vbi  
 verò expertus est affectum ab eo medica-  
 mento in corpore relictum, seu medica-  
 menti opus, considerat ex eodem si quid à  
 scopo deficit, idque sufficit: ut psilothrum  
 corpori semel iusto tempore admotum, si  
 satis egerit in aliis partibus continua: sim-  
 minus, auge vim simplicium pilos auferen-  
 tium, ut calcis, arsenici, sandarachę: si nimi- *Lib. 2. cō.*  
 um egerit, ut vrat & vlceret, vim illorum *phar. gen.*  
 remitte, minuta ipsorum mensura, & aucta  
 portione aliorum vim istam frangentium.

Si quidem exactē simplicis alicuius mi-  
 scendi, aut compositi medicamenti atque  
 adeò reliquarum causarum salubrium quan-  
 titatem, nemo ante experiētiā inuenerit:  
 coniectura tamen sic antè iudicat & expen-  
 dit, ut nullus multum improsper succedat  
 euentus. Vbi igitur à tutissima in singulis *Li. 5. sanit.*  
 mensura inceperis, & quod ex ea sequutū *tuend.*  
 est æstimaris, potes quotidie vel addere vel  
 detrachere, & quod omissum est corrigere.  
 Sic in dia cnico, cnici ponitur & caricarum  
 par modus: sed prout se habere id ad su-  
 mentis naturam experieris, aliàs plus, aliàs  
 minus cnici immitte, lib. 5. sanit. tuenda.

Præter



Præterea simplicium miscendorum facultas imbecilla vel valida, magni est momenti ad cuiusque iustam quantitatem limitandam: infirmioris enim dosis potest tuto augeri, ut duplū casia pro cinnamomo, duplū radicis panacis vel radicis peucedani pro succo radicis alterutrius. sic omnia reliqua imbecilla misceri possunt largiora, nisi quid veter, ut quantitas totius immoderatio, vel forma constituenda vitietur, vel nisi futurum sit imbecillius tãra imbecillorum portione quàm postulet affectus. Pro cuius portione augenda vel minuenda medicamentorum purgantium, digerentium, astringentium, vel alia facultate præditorum vehementia.

*Lib. 6. cõ.  
ph. par.*

*Lib. 3. cõ.  
pha. par.*

Quæ verò sunt vehementiora, ut ellæborus alteruter, scîmonium, colocynthis, opium, quantitate parua sunt miscenda, & cum præmeditatione. Sic quibus est aurium dolor ex inflammatione vehementissimus, opium castorio pondere æquali multò antè miscendum est: si autem mitior est dolor, duplicato castorio, ambo in sapa ex musto dissoluta, quia dolores magis lenit, quàm vinum dulce.

Facultas quoque remediorum in duris corporibus augetur, ut prædiximus. Ob id Galenus cuiusdam achoribus chartã vstam  
ex



ex aceto illenit, quòd eum vim medicamenti ob carnis duritiem facillè toleraturum consideret: & ita euenit, eòq; remedio paucis diebus perfanatus est.

Adhæc quibus sensus est acrior, mitiora: quibus obtusior, valentiora ferunt remedia: sic Galenus in hemigrania veteri à causa frigida auribus sensu tactus acri, ac exquisito prædictis instillabat oleum euphorbiatum, id est, quod libra vna olei habeat euphorbij drachmas tres incoctas: si autem obtusior earum est sensus, habeat olei librâ vnâ euphorbij validi, & recentis vnciâ dimidiâ: si autem sit inuolidum vetustate drachmas quinque, aut plus accipiat.

*Lib. 2. cõ.  
ph. part.*

Item quæ medicamentum gratius faciunt augenda vel minuenda pro aliorum qualitatis natura: vt si stomatica fiant ex insigniter astringentibus, vt succo cornorum, duplum aut triplum mel postulant. Mitiores verò succi, vt mespillorum, pyrorum, & multorum fructuum æqualem mellis portionem, aut saltē quàm prædicta minorem. In stomatico digerente aromatum drachmas tres, aut quatuor & dimidiâ: ad summum quinque drach. miscet lib. mellis Gal. lib. 7. comp. phar. part. Libræ mellis aut sacchari maiores pulueris vnc. tres miscebant in ant



in antidotis efficacioribus, quàm quæ nunc parantur cum vnc. tantum duabus, vt sint iucundiora, præterquàm in quibusdam. Aromata item hyeme augenda, æstate saccharum largius miscendum.

Quantitas etiam quorundam simplicium variat temporis ratione, quo ex iis compositio fit: vt si ceratum Galeni facis hyeme, minus ceræ postulat, quod etiam oleum frigore hyberno valenter concreseat non sola cera, habeatque duritiem lapideam ceratum, æstate verò largiorem ceram accipiat, quod sub illius æstu etiam cera semisoluta mollescat. Ratione est eadem vtendum in cæteris ceratis & emplastris, & aliis, quæ ceram, resinam, aliâque à frigore concrescunt, à calore liquescentia recipiunt. Aestate etiam minus olei miscemus emplastris & vnguentis, quàm hyeme, quia illius calore solutum id, vnguentum reddit perliquidum: vt hyemis frigore concretum etiam multum, crassius vnguentum efficit. Ob id Alexander Tral. emplastro phæniceo palmarum vnc. decem, addit olei vncias æstate tantum octo, hyeme vndecim. Auicennas quinto canone vnguento apostolorum miscet olei libras æstate duas, hyeme tres.

Addere quod prædicta fingimus liquidiora, quando eis sicca alia, vt æruginem, cal-

cem,



cem, cadmiam, farinas, pulueres sumus mis-  
turi: duriora verò primùm componimus,  
si succos aliquos sunt post recepturi. vt cùm  
ceratum Galeni aceto & aqua rosarum, vel  
alio dum frigescit, misces quantum bibere  
possit.

Rerum etiã miscendarum natura quan-  
tatem immutat: quæ enim sicca & rara  
sunt coquenda, largiorem humorem postu-  
lant, quàm humida densa.

Sic Galenus modium seminum abietis  
iniecit olei libris quinque & viginti, quia  
maceratum menses aliquot multò planè  
minùs redditur. Modium verò florum po-  
puli nigrae iniicit libris olei viginti tātum,  
aut etiam quindecim, quòd hi flores cùm  
sint humidiores minùs olei macerando etiã  
per æquale tempus ebibant.

Sic syrupus ex seminibus, radicibus & a-  
liis simplicibus siccis raris coquendus, plus  
aquæ aut liquoris alterius idonei requirit,  
quàm in cōtrariis: quod in compositis me-  
dicamentis abundè leges. Plus item liquo-  
ris postulat, qui ob simplicium naturam vel  
formam constituendam longiore coctione  
humorem halitu dissipante, indigent, nisi  
liquor ea sit natura, vt ægrè vaporet, cuius-  
modi est oleum.

*Lib. 7. ccc.  
ph. part.*

Est quando quãtitas remediorum scru-

C



pulchrius à maioribus est ascripta, quando scilicet à maioribus compositionibus parciore diuidebant, vt Andromachus arteriace 15. thuris drachma vna, obolus vnus, myrrhæ, croci ana drachma vna, oboli duo, succi glycyrrhizæ drachma vna, oboli tres, aut radicis glycyrrhizæ drachma vna & dimidia. Quæ ponderum dissolutio frequens est in compositionibus quarto libro scribendis, quas Mesues ac Nicolaus ex aliis plenioribus descripserunt, quales habet multas antidotarium Hadriani, & antidotarium magnum Nicolai, quod Græcum Romæ audio esse, & Græcum affirmat Nicolaus pharmacographus, vt suo loco leges. Vbi interdum mensuras aut pondera minimū auximus, vel minuimus cū scrupulosius diuiderentur: sed id tantū fecimus in simplicibus virium parum efficacium, & à quorum quantitate vel aucta vel minuta nulli, aut minima totius mutatio fieret. Quod à nobis rarò licet factum nemo accuset, cū etiam in veteribus quibusdam compositionibus nonnullorum quantitas circumscrip̃ta nullo prop̃e inditio inueniatur. Nam thuris drachmam vnā, obolos quatuor scribit Andromachus in arteriace 13. cū licuerit scribere thuris drachmā vnā & dimidiam, vel drachmas duas

Lib. 7. cō.  
ph. par.



duas (neq; enim tanta est vis in thure) præfertim cum aliorum multò valentiorum sit magnum pondus, ut nardi, myrrhæ, croci, costi ana drachm. quatuor: cum item in arteriace 12. scripserit croci drachmam vnam, mirrhæ drachmas quatuor, thuris vnc. vnâ: quidam tamen negât licere magnarum antidotorum compositionem: vel augere, ut Veneti, vim maximam theriacæ & Mithridatij simul coquunt: vel minui, quod prædictis exemplis audisti, quod in maiorum pondere & mensura vis quædam insit, & meliùs illorum mensura paratur. Si tamen non magnus fiat recessus, parui refert: nam duas libras aut circiter theriaces, si quis fecerit, non percoquetur à suo calore nativo, & citò vanescet, ut vinum paucum in paruo dolio: in magno autem feliciùs seruatur: sic theriace quanta à veteribus dicta, lagior autem ægrè paratur, cōmiscetur, coquitur.

Quin & quantitas ipsa interdum incerta ipsis etiam authoribus fuit, ut in stomachico Critonis, *διὰ γλέωνος* rhus coriarij drach. vna, alij drach. duas: gallarū drac. quatuor, alij gallas triginta: croci drachmas duas, alij drachmā vnâ: aluminis scissi drac. duas, alij myrrhæ drach. vnam. Sic in stomachico Andromachi ex gallis triginta, & aceti albi

*Lib. 6. cē.*

*ph. part.*

*Ibidem.*



sesquicyathos: alij scribunt cyathis nouem rhus obsoniorum cyathus vnus: aliis cyathi nouem, mellis cyathi duo: aliis sesqui cyathus scribitur.

Hanc verò ambiguitatem soluit Galenus, vt aceti & rhus ana cyathi nouem ponantur, tuncque amplior fiat coctio, qua gallice tenerescant: id quod multò est præstantius, quàm ponere vtriusque ana sesquicyathum, tunc verò partiùs est coquendum.

Coctio ergo longior, breuior humoris in quo est facienda quantitas nobis insinuat.

*Lib. 4. secundum tuēdē.*

Sic in acopo *δι ἀνδρῶν* modum florum populi nigrae immittit quindecim aut viginti libris olei.

*Lib. 7. cō. 1. h. part.*

Numerus etiam simplicium ad quantitatem refertur, quem alij aliū in iisdem etiam compositionibus sequuntur, vt in arteriacis & hippoglottidibus: alij tria, alij quatuor sufficere putarūt, alij in maiorem numerum extenderunt. Est tamen quando numerum non mutamus, vt in tetrapharmaco, in theriaca diateffaron.

*Lib. 1. cō. 1. ph. gen.*

Non multum differt, siue ceterum drachmis metallicorū, siue sex & nonaginta duæ olei cotyle misceantur ad emplastrum: in re verò magni momenti drach. quatuor ad iicere aut demere magni refert.

FORM



## F O R M A   C O M P O S I T I.

**P**ostremò formæ compositi vel utilior  
 fini proposito, vel gravior agro, vel ser- *Libr. 6. c.*  
 uando medicamento aut utèdo accommo- *pha. pars.*  
 datior, suadet huius vel huius medicamen-  
 ti copiam vel largiorem vel parcio- rem: ut  
 si os volo colluere lacte cum tritis foliis  
 pruni, liquet multo lacti pauca folia mi-  
 scenda: si volo illinere, contrà paucò lacti  
 multa pruni folia trita miscebo.

Collyria oculi astringentibus præsertim  
 metallicis præpollentia, multo liquore sunt  
 dissoluenda: crocus, myrrha, castoriū, thus,  
 lycium, in quibus vincunt, multò parciorē  
 liquorem requirunt, crassiusq; medicamen-  
 tum faciūt: si linimentū cuius parti paras,  
 ceræ pars sexta oleo miscenda, nisi sicca etiā  
 quædam misceas, tunc enim minuēda esset  
 cera: si ceratum liquidius fingis, quarta pars  
 ceræ: si solidius tertia: si in formā emplastri,  
 secunda miscenda est. Cætera ad formam  
 compositi pertinentia quæ simul ad definiē-  
 dam simplicium quantitatem pertinent, mox  
 audies. Interdum nulla ratione forma cō- *Li. 4. san.*  
 positi variatur, sic diosporicon, dia trion *tuend.*  
 pipereon, diacalaminthe, vel sicca, id est, in  
 puluere vsurpat Galenus, vel melli admista.

Sic Andromachus cū medicamentum  
 ad coxendicum dolorem scripsisset ex ruta



*Li. 10. cē.  
ph. part.* vtraque, abrotano, silphio, baccis lauri, aphronitro colocynthide, cardamomo, amigalbano, opopanace, sulfure viuo, vt emplastrum ex ipsis faceret, addidit picem, resinam terebinthinam, ceram, adipem.

*Libro 7.  
method.* Est quando mutatur, quo sit efficacius medicamentum: sic hiera picra sine melle cum aqua sumpta magis roborat ventriculum: & succos vitiosos in ventriculi tunicis contentos vtilius extrahit: melle autem despumato excepta, minus ventrem roborat, & magis deicit, minus ob hæc utilis prædicto affectui.

Sic pro fotu, ex oleo vnguenta, cerata, emplastra formamus, vt parti materiæ diutius hæreant, vel alia materia in aliis partibus sed crassiore substantia, si diu hæreere volumus. Contra verò finibus liquida *Lib. 2. ad  
Glaucōnē* omnia iniicimus, vt quaquauersum spargantur, & nullam finis partem quantumvis angustam relinquunt intentatam.

Sic liquidiora expectorandæ à pulmonibus & thorace crassæ & lentæ materiæ formamus medicamenta. Sic lauissimè terminus, quæ vrinas, sudores, menses mouere volumus, prætereà ex liquore purissimo & tenuissimo non crasso, lento, turbido damus. Si clysteres nunc maximè aquosi, quando solum est eluendum: crassi magis & lenti, ex  
adipi



adipibus, butyro, vnguentis, muccaginibus, cremoribus hordei, tritici, orizæ, & similiū, quando intestinis immorari diutius, & hæ-  
rere tenacius volumus.

Adhæc forma hæc compositi medica-  
menti à nobis constituitur alia atque alia,  
pro morbi, partis affectæ natura, figura, &  
situ, proprietate ægri, & modo præparatio-  
nis simplicium ad formam aptam necessa-  
rio, & medicamento componendi differen-  
tia.

Phlegmone enim externa contactum  
emplastrorum, & aliorum similiter durorū  
sine noxa non feret, vti nec vlcus siue sim-  
plex sit, siue cauū, sed omnino liquida po-  
stulat: illa fœtus, linimenta, cataplasmata,  
cerata mollia: hoc, emmora & soluta oleo  
vel liquore alio emplastra linamentis im-  
ponenda, vel etiam instillanda, & iniicien-  
da in sinus ipsos. In quorum fundum sola  
liquida permeare possunt, si decliues sint &  
recti. Si verò anfractuosi & ascendentes etiā  
iniectione vix fundum vlcis illa liquidio-  
ra attingent.

Linamenta, item turundæ, splenia pro vl-  
ceris figura & situ fiunt: adhæc etiam turun-  
dæ frequenter cannulatæ (vt vocant) fiunt,  
id est tubum aliquem argenteum, ferreum,  
plumbeum complexæ, per cuius meatū pus



largum continenter effluat, ne mora in parte rodat, & vlcus augeat.

Amara & id genus alia nobis ingrata venterculus cum nō ferat, ea catapotiiis vel alia forma concludimus, vt integra deuorentur, nec sensum sui deglutendo præbeant: aliquo propterea iucundo etiā teguntur, melle, saccharo, pomorum, prunorum, vuarum carne molli, inuoluta interdum foliis auri vel argenti, vel alio simili.

Tali item vel tali forma debet constare medicamentum, vt partem affectam attingat: hinc sunt inuenti à medico pesssi color uteri affecto, balani intestino recto (quantis ei ad excretionem irritando hodie frequentius seruiant) clyster crassis intestinis magis quam tenuibus.

Sic stomatica, & arteriaca, & stomachica fiunt forma & consistentia mellis seu crassi & liquidi media nonnihil tenaciorrhina liquida, aut puluisculi: apophlegmatismata in nodulo, vel aliter solidiora.

Catapotia itē aut bolos formamus, cum à longinquis partibus trahendum: potiones potius, cum vias alimenti primas inanire studium est. Medicamenta tenuissima & cum tenuissimis mista & ferè liquidissima, quæ ad vterum, renes, vesicam, articulos, cutim volumus penetrare.

Quæ



Qua in re est ægri consuetudo naturâq; consulenda: ut in opsoniis & cibis aliis inueniendū experientia est, quod cuiq; est optimum (aliud enim alij secundum naturæ proprietatē est melius) sic in medicamentis quod cuique sit non modò gratum, sed etiā optimum inuenire tentandum est, rogando si quando vñ sint medicamentis ut purgantibus, & quibus, quantis, quando, in quo affectu, qua parte anni, & quomodo eos habuerit. Quidam enim à medicamentis in totum abhorrent, quibus iusculo, aut portione dulci, aut sapore alio ipsis iucundo medicamenta tegimus, ut inscij sumāt: alij possunt quidem medicamentum deuorare, sed vel portione tantum, vel bolo, vel catapotiis, vel forma alia. Sic in admotis quidā emplastra ferūt, linimēta cataplasmata nō ferūt, alij contrā. Sunt qui emori malint, quàm clysterem recipere, quibus per epōphalica est succurrendum, si ne per sumpta quidem licet. Capitis dolori veteri calido aut frigido, raso ipsi in formam emplastri aut cerati admouenda sunt tōso ad cutim, aut capillis aliter breuib; liquida adhibe. Succus ex corticibus nucum expressus, quia substātia est tenuior quàm stomatico conuenit, & coctus est à Galeno & mel additum, ut mellis consistentiam stomaticis idoneam haberet.

Lib. 6. cō.  
pha. par.



Est tamen quando simplicium præparationis modus ad aliquam te formā impellet, ut ex infuso siue macerato rhabarbaro, bolum, aut catapotia, aut formā aliam solidam non feceris, uti neq; ex herba virēte, fructibus mollibus, resinis recentibus puluerem. Ob id considerandū tibi est, quam formā hæc medicamenta, vsta, lota, assata, cocta, infusa, trita, destillata magis requirāt, & in qua melius seruentur, & felicius agant in affectus & commodius possint applicari. Tamen si multa formamus in figuras quasdam sub quibus raro in vsum veniunt, ut trochisci forma sunt solida: ad oculos autē liquore aliquo in cote medica solvuntur. Pulveres in alias atq; alias formas nunc siccas, nunc liquidas, nunc medias abeunt.

Formæ huius vel huius cōstituendæ gratia non pauca medicamentis componendis miscemus, quæ potestatem aut nullam aut exiguam admodum medicamento parando afferunt, sed materiæ commoditatem præbent, ut vel emplastri vel cerati speciem per ipsorum missionem consequantur.

*Libr. I. c.  
ph. g.*

Qua sola causa lithargyros emplastro dia chalciteos miscetur, quia nec calida, nec frigida, nec humida est, & parum sicca, ut ad primum gradum, nihilq; aliud vehemens habet.

Eid



Eidem emplastro dia chalciteos misce- *Ibidem.*  
tur cera; quod sine hac, alia eius emplastri  
simplicia ad talem consistentiam non per-  
uenirent.

Eadem cera aliis emplastris & vnguētis  
quibusdam & cerarum miscetur, ut materiæ  
commoditatem afferat, potestatem nullam  
aut exiguam afferat.

Sic adipēs, olea, gummi, resinæ addun-  
tur, nunc ut spissius, nūc ut liquidius medi-  
camentū reddant: quæ tamen sæpe miscen-  
tur, ut materiæ rationem habeant, & pote-  
statem medicamento tradant: ut si ex ruta  
utraque, silphio, baccis lauri, abrotano, aphro-  
nitro, cucurbita sylvestri, cardamomo, sul-  
fure viuo, & similibus ficcis nec glutinosis  
volo facere medicamentum ischiadi admo-  
uendum, quia per se non hæreret, addo præ-  
dictis glutinosa, picem, resinam terebinthi-  
nam, adipem, ceram. Addere possum ham- *Zi. 10. c.*  
moniacum, bdellium, galbanum, opopa- *ph. par.*  
nax, & similia quæ emplastica sunt, & em-  
plastri compositioni conferunt, & emol-  
liunt, & quantitatem picis, & similium mi-  
nuendam ostendunt.

Eadem ratione terebinthinæ, aut eius lo-  
co larici & abietinæ puluerem glycyrrhizæ  
miscemus, ut in bolos veniat, licet glycyrr-  
hiza etiam renibus tergendis modicè con-  
ueni



ueniat, potentiùs hac rhabarbari puluis læuissimus cū illis resinis mistus renes vacuat, & faciliùs sumitur. Alij vel alterutrum vel vtrunque ex cicerum decocto multum calente malunt sumere.

De his non pauca in vsu recto medicamentorum, quadam libro tertio, plurima libro quarto in singulis propè compositis medicamentis animaduertere poteris.

### DE RECTO VSV MEDICAMENTORVM.

**H**erophilus dogmaticorū medicorum doctissimus, præclare dicebat, medicamenta vt cætera medicorum præsidia per se & sola nihil esse, nisi rectè vtentem habeāt, quando demum ea veluti deorum manus rectè dixeris: iuuāt enim plurimum, vbi his vsurus est natura prudēs ac industrius, & in rationali methodo exercitus. Propterea etiā rectè Asclepiades medici officium esse dixit, vt tutò, vt celeriter, vt & iucundè curret. Ante hos prudenter nos Hippocrates hortatur, omnia medicæ artis opera sic perficere, vt iuuent, vel saltem non offendant. Quam rem Galenus his omnibus posterior libr. 12. methodi, & locis perquàm multis inculcat, quòd res ea magnarum sit virium, non

*Celsus c.  
4. lib. 3.  
Libr. 1. c.  
ph. 2.*



non modò vt medicus calumnia vacet, sed etiam culpa: cùm proximè secūdum Deum hominem adiuuat, & cui morborū magnitudo, complexus, malignitas perniciem extremam minatur. Hinc medicus ceu terrenus quidam Deus affulgeat, consiliū & auxilium afferēs saluberrimum, cuius beneficio aut vitam ærumnosam calamitosamq; aut impendētem exitiū facile æger vitauerit. Non abs re igitur nobis visum est, huc rectum medicamentorum vsum adscribere, tantò certè præstantiorem prius scriptis omnibus, quantò finis ipse omnibus his quæ præ se antecellit. In quo nostro studio si quid desiderabitur, ex libr. composi. phar. & methodo medendi sufficere cuius paruo negotio licebit.

Medicatio consistit in medicamentorū affectui contrariorum, & ob id idoneorum copia & horum vsum congruo, contrarietatem ex affectus natura & magnitudine ac medicamēti facultate affectui recessu equali contraria, sumēdam nemo ambigit, & id abundè in scopis componendorum medicamentorum explicauimus: vsum iam congruum inuentorum methodo remediorum affectui contrariorum dicēdus est, qua methodo perficiatur. Vsum medicamentorū congruus sumitur ab affectus præter naturā causa

*Libr. 7.  
metho.*



causa praesente, essentia, magnitudine, tēporibus: ab aegri, partis, aëris medicamēti natura planè cognita. Affectui enim calido multum, ut ordine secundo, frigida secundo recessu: calido modicè frigida mediocriter conueniunt, siue talia sint per se, siue id per accidens praesentent (modò nullū hoc incommodum sequatur) sic ut excessus omnis æquali cōtrario excessū expugnetur. Eodem modo in reliquis intēperaturis tam simplicibus quàm cōpositis, & tam nuda qualitate cōstātibus, quàm cum materia coniunctis. Item in pituitoso affectu, quæ pituitam incidunt, tenuent, tergeant, vacuent, gigni prohibeant, rectè exhibentur, & in aliorum humorū vitio ad portione: sic in incōmoderatione & solutione continui. Morborū quoq; alia sunt atq; alia remedia, pro temporum tam vniuersalium quàm particularium ratione, ut pōst fusiūs dicemus.

Aegri temperatura, commodatio, vniuersitas partium, quæ fuit ante morbū, scopus est quò tendimus, siue intemperatūrā corrigimus, siue morbum organicarum partium proprium, siue solutionem continui. Natura enim calidior similibus medicamentis feruatur: sepe etiam læditur à similibus suæ intēperaturę causis, praesertim si calidis multum & frequentibus utatur: modico autem  
contra



contrariorū vſu iuuatur ac emendatur. Cō-  
suetudinem tamen per morbum mutare ne  
tentaueris, ſi Galeno auſcultas, quia tūc na-  
turam morbos victurā expugnaueris. Qui  
corpore item ſunt raro, minus opportuni  
ſunt purgationibus, & aliis vacuātibus præ-  
ſidiis: quemadmodum etiam puerilis ætas  
per inſenſilem tranſpiratū continēter mul-  
tūm vacuata, quod humor in ea promptē  
multo calore tenuatus, cōferim diſſipetur.  
Qui nunquam medicamento ſunt vſi, cum  
maiore præmeditatione medicamentis ſunt  
tentandi. Roganda item cuiuſque naturæ  
proprietas. Sani quoq; corpore medicatio-  
nes grauiter ferunt.

Qui vētriculo aut hepate ſunt calidiores,  
a medicamētis calidis, qualia ſunt purgātia  
omnia, vt cæteris ſumendis calidioribus le-  
duntur. Medicamēta valentiora & tenuiora  
lōgē diſſitis partibus, aut profundis, & ſen-  
ſu obtuſo præditis debentur: ſublimibus ve-  
rō & facile ſentientibus, & quibus propin-  
quis medicamentum viribus integris oc-  
currit, mitiora & craſſiora ſufficiunt, niſi  
alia ratione valens & tenne exigatur.

Sub cane & ante canem difficiles medi-  
cationes: æſtate item per ſuperiora magis, ſi  
facile vomant, purgandi: hyeme per infe-  
riora purgationes potiùs deligendæ: quia

*Aph. 5.  
li. 4. & ſe-  
quētib;*

eo



edò natura vergit, & locus est cōferens, vt in melancholicis quoque & tabidis.

Medicamentis præsertim valentibus raro, & cum multa cautione vtendum est.

In singulorum medicamentorū vsu explorandum, quomodò ægros habeant: si enim plus commodent, quàm obsint, toleranda: si contrà, tollenda: vt in ozæna si à medicamento morsum sentit ager, coniectandum est, quod simplex in eo mordet, idq; tollendum, vel abluendū, vel minuendum, vel alio obtundendum, vel in eius genere mitius capiendum: vt si acetū erat peruetus & valde acre, capiendum est acidum magis & ætate mediocri, aut saltem vinosum, vel eius loco vinum dulce vel austerū, si affectus requirit. Sic & in aliis vlceribus & morbis reliquis, effectum medicamenti est diligenter obseruandum, vt intelligas an in eius vsu tibi sit perseverandum, an totum mutandum, an simplex in eo aliquod sit augendum, vel minuendum, vel obtundendum, vel mutandum.

Quapropter ei qui rectè vult medicamenti vti præter ægri & morbi naturam, medicamentorū tam simpliciū quàm compositorum vires ad vnguem callere debet, & ex his semper optima ac probatissima deligere. Cū enim affectū aliquem certò finans



nans habes medicamentum, & quod nunquam successu prospero te frustratur, graue est ac iniquum, certioribus remediis in presens omisissis, noua tentare, curiosæ alicuius experientiæ gratia. ob id cum Gale. ad rabi *Lib. I. cō.*  
 dorum canū morsus habere medicamentum *ph. gen.*  
 omnino probatissimum *Διὰ τῶν κερνίων,*  
 & præter id alia multa, sed parū certa, nunquam voluit in hos morsus alia tentare, aut albam Heræ emplastron id promittentem experiri: quia an id præstare posset, dubitabat, cum similis sit Attalicæ albæ myrrha solum & adipe ceruina & cera alba Pontica larga adiectis. Quod si hæc morsum in quibusdam naturis sanat, & cum non ita magnum, neque cum spuma adeò maligna, omnem tamen morsum in omnibus naturis totius substantiæ proprietate non sanat, ut *Διὰ τῶν κερνίων.* Quæ res sæpe fecit, ut Medici quidā Empirici pharmacis quibusdā se primū adeò feliciter gesserūt aliquando, ut in admirationem sui alios perducerent, ipsi tamen in aliis euentu prospero frustrati, sunt irrisi. Non vtenda igitur tibi medicamenta, neque alia præsidia, nisi quæ omnino profutura certò scias, vel saltem nihil prorsus nocitura: aut si nocitura minimum sint, noxam illam faciliè tollendam maiore commodò compensent. Pos-

D



*In fineli.* sem aliarum quoque observationum (quas  
*II. metho.* indicationes appellamus) exempla ex Ga-  
 leno proferre plurima, nisi prolixitate dis-  
 plicere metuerem: tamen quædam postea  
 afferemus, & potest quisque nullo negotio  
 ex ipso locuplete Galeni promptuario pro-  
 ferre.

*Gal. in the* Ad rectè utendū medicamento non sa-  
*riaca ad* tis est nouisse simplicium id constituentium  
*Pisonem.* vires, sed etiam totius compositi facultas ti-  
 bi est noscenda, & ab his qui sæpe eam sunt  
 experti discenda. In medicamentis enim  
 compositis singulorum quæ miscentur vir-  
 tus & qualitas non amplius conseruatur, ita  
 ut eadem maneat, nec mutetur, nec in vllam  
 qualitatem transeat: sed aliqua omnium fit  
 vnio, tota ipsorum temperie per tota mista:  
 & vna quadam alia virtute ex illis sic mi-  
 stis profecta ut in ænomelite exactè per co-  
 ctionem temperato, neque mellis, neque vi-  
 ni saporem omnino deprehendis, sed diuer-  
 sum quiddam. Sic in theriaca & cæteris cõ-  
 positis cuiusque mistorum vis & qualitas  
 non manet, sed vbi omnia omnibus sunt  
 confusa, & in vnitatem quandam natura-  
 lem concreta, vna diuersa quæ ex omni-  
 bus simplicibus medicamento natura crea-  
 tur.

*Lib. I. c. c.*  
*ph. gene.*

In compositione simplicium medica-  
 mento



mentorū inter se contrariorū facultates omnino corrumpi quibusdam visum est, vt aqua feruētissima cum frigidissima mista, neutra illarū qualis erat prius permanet, sed tertia quardam, ab vtraque diuersa gignitur. Non solum tamen cuiusq; *Lib. 2. cō. ph. gen.* compositi facultatem expendas, sed prius simplicium medicamentorum naturam, vt communem compositionis viam ac vsum intelligas, & tuo Marte possis conficere similia, & quæ à veteribus citra distinctionem sunt tradita, cognoscas qualem habent potestatem, vt nos in vtilitate & necessitate componendi medicamenti docuimus.

Aduerte prætereà vires compositorum tempore mutari etiam in contrarium, vt in theriace docet Galen. libr. 1. Antid. & in Philonis antidoto, libr. 12. Methodi: hæc enim recentia stupefaciunt, antiquata theriace calfacit.

Vsus prætereà medicamentorum vt cæterarū causarum salubrium idoneus, est in ipsorum quantitate & qualitate idonea, & tempore apto, quod interdum Galenus o- *Cap. 85. artis med.* mittendū censet, continerq; quantitatis & qualitatis rationē. Si enim (inquit) tali & tanta re adhibita corpus egeat, nemini dubium est, quin opportuno tēpore afferatur.



Occasio siquidem temporis inde ortum habet, quod fluxile ac facile mutabile est mortale corpus, & pro transmutationis modo aliis alio tēpore auxiliis indiget, ob quam causam ad docendū tempore tanquam tertio quodam uti consuevimus, licet reuera tertium præter duo dicta non sit. In libris igitur ad sanitatē tuendam pertinentibus, & methodo medendi passim aliis duobus: seu tertia additur tēporis occasio, quæ præ omnibus est cognitu difficilis, ac Medicos etiam celebres plerunque fallit, quia præcepta ipsa est, ut Apho. 1. docet Hippoc.

*Initio lib.*

*1. ad Glau*

*conem, &*

*Aph. 17. &*

*19. lib. 1.*

Est quando utendi modum velut quartum addit: de quibus quatuor quatenus in medicamento utendis Medico sint obseruanda hinc agemus, cum reliquarum causarum salubrium usus abunde à Galeno dictis libris & aliis sit absolutus.

Cum autē medicamenti dandi ac etiam adinueniendi quantitas, qualitas, tēporis occasio, utendi modus ad rectē medendum magnoperē conducant, sint verò hæc cuique morbo ac agro sua ac propria: nihil autem proprium possit sermone explicari, communia de his docebimus, ex quibus possis proximē ad proprium cuique agro medicamentorum usum accedere. Illa autem cōmunia faciliē intelliges, si non ignoraris.



taris, quæ sanis secundū naturam communia sunt, scilicet pulsum naturalē cuiusque nature, ætatis, habitudinis, partis anni, ac reliquorum: adhuc tēperamentum cuiusque natiū vel acquisititiū, præterea proprietates naturarū ex ægris rogandas, denique morborum omnium naturam & magnitudinem, & reliqua curanti necessarium aliquid aut vtile indicantia.

Quoniam autem quantitas & qualitas exhibendi medicamenti, & cōponendi ex iisdem sumuntur scopis & indicationibus, ex ipso sermone prius habito nobis de cōponendi ratione tibi sunt repetenda, quæ quantitatem atque qualitatem medicamenti tibi definiant. Nam causæ morborum adhuc præsentis, magnæ, inueteratæ, expulsi difficili, valētiora, aut largiora, aut frequentiora medicamēta sunt necessaria, similiter & morbus magnus, veteratis, curatu difficilibus, si ægri vires, ætas, corporis habitudo, consuetudo, aëris natura consentiāt. Quod *Lib. 7. method.* si morbi sunt complicati, vrgentioris seu *Triplex* eius à quo maius impendet vitæ periculū, *morbō* maior habenda est ratio, & ad id præcipua *magnitu-* curātis sollicitudo dirigi debet, non negle- *do.* ctis tamen aliis. Vbi itē causa morbum efficiens adhuc in corpore adest, prima est tollenda, deinde morbus si quis adhuc superfit:



adhuc affectus hic primus est curandus, qui alterius curationem impedit, ut phlegmone ante vlcus est percuranda, si ambo in parte aliqua coierint. Quod si omnes cōplexi affectus remedia eadem postulant, ea sunt intendenda, modo nulla alia repugnet indicatione in qua pugna quid faciendum, leges in fine libr. 8. Methodi.

Præterea ut in componendo medicamento magni est momenti quantitas medicamentorum valentium: parui fit autem portio imbecillorum, etiam si largior iniiciatur. Sic in medicando valentibus cum magna præmeditatione utendum est, ut cum morbus extremus est aut acutissimus, nullasque dat inducias, si vires, ætas, aër, & cætera non repugnent: mitioribus autem etiam larga quantitate si utaris, aut nullum, aut minimum inde periculum ægro accedet.

Ut autem paucis rem in memoriam reducam, medicamenti tam fumendi quàm admouendi qualitas à morbi natura sumitur, ut calidum sit morbo frigidum, frigidum calido, &c. Laxans tenso, densans raro, & in cæteris cōtrarietas: indicationibus etiam ab aëre, natura totius, partis, consuetudine, habitu non neglectis. Quantitas verò à causæ & morbi magnitudine præsentis vel  
imp



impendente, partis affectæ situ, figura, habitu, sensu, ægri natura, viribus, consuetudine, medicamento facultate, & substantia tenui, crassa, familiari, noxia obseruatis, ut morbo magno, profundo, longinquo, inaccesso, in parte densa, obtusè sentienti, in natura forti, fortibus assueta, aëre temperato, valentibus, tenuibus uti licet medicamentis: mitioribus in contrariis. Paucis tamen exemplis te exercere in purgantium tanquam usu periculosiorum quantitate non pigebit: si prius vnum addidero, quod ad medicamento qualitatem ac speciem pertinet: ne scilicet vno aliquo præsertim purgante delecto, id ipsum perpetuò vsurpemus, sed varia sunt vicissim vtenda, siue scopus idem permanet, siue alius etiam subortus est. Cui nanque assuefacta erit tempore sumentis natura, eius vim contemnet, quòd usu longo familiare sit factum, & ei quadamtenus affinis reddita sit natura: quod de mercuriali, brassica marina, crico, terebinthina, in senibus varianda quanuis à Galeno dictum est, verum tamen est etiam in cæteris maximè purgantibus. In quibus experientia inueniet quisque mensuram legitimam ex naturarum proprietate, cum veter aliis magis, aliis minùs his medicamentis sit obediens.

*Lib. 4. sanit. tuend.*

*Ibidem.*



**Diosc.** Aloë *αλωετινὰ* seu *ἐκκρωστικὰ*, id est, aluum ac stercus deiciens, est à tribus obolis seu drach. dimidia, ad drach. vnam. Perfectæ autem purgationis gratia tribus drachmis, sumitur aliis purgātibus medicamentis admista. Eius per se vsus hodie est rarior: hieræ verò *ἡ ἀλὼς* seu picræ, creber, de qua in cōpositis. Hic enim magis statui simplicium sumendorum modum definire. Eadē ab aureo vno ad drach. duas bilem & pituitam purgat Mes.

**Li. 6. simplic.**

Agaricus datur drachmæ vnius pondere vel à scrupulis duobus ad drach. vnam: Mesuæ verò bilem & pituitam vacuat, si pulvis eius datur à drach. vna ad drach. duas. In coctione autem à drach. duabus ad drachm. quinque. Actuario dantur drachmæ duæ cum aqua mulsa, vel aceto mulso ad bilem & pituitam: stomacho aduersatur, quia ob leuitatem innatat.

Colocynthis Mesuæ bilem & pituitam vacuat data à filiquis quinque ad filiquas, id est, *καρῖα* decem: frequentior eius est vsus hodie in hiera dia colocynthidos.

**Lib. 5. secundum tuendum.**

Cnici semen phlegmagogum Mesuæ datur à drachm. quatuor ad aureos quinque, seu ab vncia dimidia ad drachm. sex. Galenus id cum pari modo caricarum mistum dat duarum triumve caricarū magnitudine.



ne. Actuarius pulpe seminis eius drachmam  
vnam dat iëtericis in catapotiis: in iure au-  
tem galli drach. tres pituitā purgare addit,  
non tamen sine molestia. Cnici semen *Li. 13. me*  
cibis admixtū, & vrtica, & mercurialis, & *rhod.*  
epithymū, & polypodium, & cætera quæ  
modicè aluum deiiciūt, iecoris taurum per  
ventrem vacuant. Flos eius à drachma vna  
ad aureos duos Mesuæ idem pollet.

Epithymum datur drachmis quatuor cū *Libr. 14.*  
fero lactis aut mulsæ ad purgandum humo- *method.*  
rem melancholicum. Mesuæ verò ad hu-  
mores adustos melācholicos, pituitam da-  
tur pulvis à drachm. tribus vsq; ad septem:  
decoctum autem à drachm. quinque vsque  
ad viginti datur melācholicis: & pituitosis  
ad oxybaphi mensurā ad drachm. quatuor.  
Actuario autem scrupulorū quinque pon-  
dere. Quantum verò variet Græcorum *Dioscor.*  
& Arabum epithymum libr. primo dictum  
abundè est.

Scammonium Mesuæ cholagogum da- *Dioscor.*  
tur à granis quinque ad grana duodecim,  
aluum resoluit duobus obolis sumptum:  
drachma autem vna aut obolis quatuor  
cum aqua vel mulsæ sumptū per inferna bi-  
lem & pituitam extrahit. Modus scammo- *Actuar.*  
nij scrupuli duo, plus paulò, aut minus pro  
virium ratione.



Polypodium cū gallina aut piscibus co-  
ctum datur ad aluum soluendam, & bilem  
atram pituitamq; detrahendam Dioscoridi:  
non expresso tamen pondere, vti nec Gale-  
no libr. 13. Methodi, qui in simplicibus pur-  
gatorium non facit. Mesuæ datur ad bilem  
nigram & pituitā crassā à drach. duabus  
ad drach. sex: senis scrupulis cum mulla da-  
tur Actuario.

*Actuar.*

Veratrum nigrum vtranque bilem va-  
cuat scrupulis tribus, aut paulo pluribus, vel  
paucioribus. Mesuæ etiam vacuat pituitam  
præter vtranque bilem, à siliquis sex ad par-  
tem tertiā drachmæ vnius, vel ad drachmā  
vnā, qui modus Actuario consentit, licet  
magnum sit interuallum in hoc simplici à  
scrupulo vno ad scrup. 3.

*Mesua do-  
ses recen-  
tiū medi-  
camētōrū.*

Rha barbarum cholagogum & phleg-  
magogum datur puluere à drachm. dimidia  
ad drach. vnā & semissem. Infusum verò à  
drach. vna & dimidia ad drach. duas: vt mē-  
dosus sit locus hic Mesuæ à drach. vna & se-  
missem ad drachmas decem: sic enim nūquā  
scripsisse videtur.

Casia fistula ab vncia & dimidia ad ses-  
cunciam.

*Mesues.*

Tamar Indi cholagogi ab vnciis duabus  
ad vncias quinq; ob imbecillā eorū actionē.

Manna cholagoga ab vncia vna ad vn-  
cias



cias tres nobis: Mesuræ à drachmis sex ad sescunciam tantum datur, fortè quòd nostra sit imbecillior, aut etiam adulterata.

Turbith phlegmagogum Mesuræ datur puluere à drachma vna ad duas: infusione autem à drachmis duabus ad drachmas quatuor.

Cassia cholagoga & phlegmagoga datur à semuncia ad sescunciam, modum eius Mesues præterit, opinor quòd innocentissima est etiam largiore mensura.

Senna bilem adustam & melancholiam vacuat ab aureis tribus ad vnciam vnam Mesuræ. Lapis stellatus seu cyaneus idè pollet, & Armenus nõ lotus à semidrachma ad sesquidrachmam: lotus à drachma vna ad drachmas duas Mesuræ & Alexand. Trall.

Hermodactylus phlegmagogus ab aureo vno ad duos.

Quæ alia scribunt Dioscorides, Mesues, purgatoria partim sunt clementissima, partim ob vehementiam hodie à Medicis damnata: quæ omnia fusiùs & doctiùs explicauit Ioannes Tagautius commentario secundo in Mesure simplicia, quæ causa facit, quò minùs diu hìc immorandum existimè: præsertim quòd ex his quæ vires habèt minùs vehementes, neque corpori noxias, mēsuram si paulò vel augeas vel minuas, nihil  
pec



peccabis, siue medicamentum componis, siue exhibes iam compositum aut simplex. Valentioribus verò aliis rarissime vtamur: cucumere agresti, rithymallis, & lactariis aliis, quibus multis vim purgatricem tribuunt Dioscorides & Mesues, quæ per censere scientes omittimus. De his aliàs plenius dicturi, cum simplicia solis pharmacopolis explicabimus, non etiã medicis. Quæ labor post hunc secundus mihi est propositus, vt ea scilicet fusissime declarem: quæ ad pharmacopœorum artem magis pertinent, ea supprimã, quæ illos nouisse est sapenumero perniciosum, dum in messem Medicorum falcem suam mittunt, & pharmaceuticen iniquissime exercent maxima mortaliū perniciē.

*Li. 7. met.* Hydromeli cui incoctum sit absinthium tenues succos in ore ventriculi contentos, commodè deorsum impellit.

*Li. 6. sim.* Empetron ad solas pituitæ & bilis purgationes videtur esse accomodum.

*Lib. 6. sanit. tuend.* Absinthij coma pota bilem ex ventriculo deturbat vt aloë: pituitosum verò succū ventri magis affigit, cum detergendi vim non habeat absinthiū insignem. Nec aloë valde his conducit, quod ei bilis trahendæ sit facultas: ob id salubriter excogitata est compositio hiera picra, quæ acrimonia calor



calore cinnamomi, & aliorū quæ continet  
crassos & lentos succos dissecat ac deterget.

Ius galli veteris pituitam & melanco-  
liam magna mensura sumptum ad lib. tres.  
Mesuræ, cui nullus vētricus suffecerit. Eius  
parandi ratio est apud Alexand.

Therebintina resina fumitur aliquando *Lib. 5. sa-*  
nucis ponticæ, idest, auellanae magnitudine, *nit. tuen.*  
aliquando duarum triūve: hodie à drach-  
ma vna ad drachmas quatuor, vel quinque  
exhibemus, vel bolo cum puluere glycyrrhizæ,  
vel cum pulueris rha-barbari drach-  
ma vna, quando drachmas resinae tres raro  
exce- limus, vel potu ex decocto cicerum vel  
eius loco aquæ illius aut olei destillando  
separati vnciam dimidiam cum vino albo  
propinamus nephriticis, purgatis prius ve-  
nis primis & ventre reliquo.

Diacnicum fumitur, vt dixi, duarum *Li. 5. san-*  
triūve caricarum magnitudinis modus, *tuenda.*  
quem legitimū in omnibus talibus ex ipsa  
experientia inuenies, cum venter aliis ma-  
gis, aliis minus sit medicamenti obediens.

Mensura diacodij siue cum sapa ad som- *Lib. 7. cō-*  
num cōciliandum in catarrho acri & tenui, *ph. par.*  
siue cum melle ad sputum promouendum,  
que mediocris est duorū cochlearium iu-  
stæ magnitudinis, augenda & minuenda  
pro ætate, regione, parte anni: vt si hinc fri-  
gidu



gida sint, minus eius detur: si calida, plus & ad defluxionis quantitatem & qualitatem respiciens: plus minus exhibe. Quod præceptum præsidii omnibus est commune.

*Li. I. ant.*

Non easdem vires habent antidota, si ante deleteria & post ea sumantur. Ob id si quis quotidie ad præcautionem sumat antidoti theriacæ, vel alterius similis fabæ Aegyptiæ quantitatem, sufficit: post sumpta autem deleteria quadruplo aut quintuplo aucta detur, & bis quotidie, non tantum semel.

*Li. II. sim.*

Aeschryon morsis recenter à cane rabido dabat per dies quadraginta, quotidie cineris cancrorum fluuiialium vstorum cochlearium magnum: iamdiu autem morsis duo cochlearia.

*Li. th. ad.*

*Pisonem.*

Quantum tribus digitis capi potest milui pulvis cum aqua potatur. Aliorum tam simplicium quam compositorum mensura, pondus, numerus adscribi hic posset, nisi infiniti propè esset operis, & parum necessarij, præsertim cum in compositis libro quarto horum partis maximæ dosi declaranda sit: & cuius liceat ex probatis autoribus exempla plurima proferre. Numerum autem in remediis quibusdā, ut catapotijs, ramis exquisitè obseruari ridet Galenus: quod addunt nonnulli volentes auxilium agere non temperamento, sed mirabili quodam natura

rae



ra consensu hominibus incognito. Quem consensum in his quæ tota substantia agunt, cum Galeno recipimus, sed constitutum in elementorum mistione nobis sola experientia cognita, non in numero.

TEMPVS SVMENDI, VEL  
ADMOVENDI MEDICA-  
MENTI.

**D**Vo igitur nobis præcipue supersunt declaranda, ad usum rectum medicamentorum necessaria, utendi modus, & temporis occasio. Quæ cum magnarum sit virium, non in remediis tantum medicis omnibus, sed aliis etiam cunctis in rebus, ut poetæ ac philosophi fide bona testati sunt. Pro dignitate nobis est tradenda, ut intelligat Medicus, quibus sibi sit opus ad recte utendum temporis occasione in medicando, & si vis, in cæteris quoque remediis.

Finis usus medicamentorum est, ut affectum è corpore præter naturam profligetur, siue morbus sit, siue causa morbi, siue symptoma, siue duo ex his, siue omnia simul, siue morbus omnino factus est, siue nondum gigni coepit, sed in præcinctu ut fieri incipiat, siue partim genitus, partim adhuc in gignendo, & partim generandus, siue is affectus sit intemperies  
aliq



aliqua, aut incōmoderatio, aut solutio continui. Cū igitur medicamentorum vi siue purgante, siue alterante, siue glutinante, vel aliud quiduis affectibus præter naturam curandis necessarium præstante, affectus ipsos ex corpore ægro vel neutro expulimus, finem vsus medicamentorum iam consequuti sumus: modò id fecerimus nullo aut saltē quoad fieri potest, minimo viriū incōmodō, quas ostendunt integras aut minimū lãsas substantiæ triplicis nostræ spirituosæ, carnosæ, solidæ iusta quantitas, & proba qualitas, actione inculcata æstimanda. Ne scilicet nobis probro obiiciatur, morbum quidem sanatum esse, sed ægrum aut mortuum, aut mortuo simillimum esse redditum, aut in alium incidisse affectum ex nostra curatione lethalem, aut priore peiorem, vel non minorem: cū Medici munus sit, vt dixi, citò, tutò, iucundè curare: aut si omnino curare non possit, saltem leuiorem reddere morbum, aut non augere, neque contrarium affectum inducere. Quod his sæpe accidit, qui nulla methodo curant affectus planè nondum cognitos, ignorata etiam parte in eo affecta, ne addam per remedia, quorum vires omnino ignorant: in vitium enim ducit vitij fuga, dum caret arte.

Perr



Porro affectus præter naturam e corpore citius, tutius, minore agri molestia pelluntur, vel cum nondum radicauerunt, vel cum iam victi à natura fuerunt: quomodo plantæ omnes ortu primo etiam parua digitorum duorum vi promptè euelluntur: vbi autem radices altius egerunt, ne multa. um quidem manuum violentiæ diu urnæ cedunt: sic principio morbi remediis clementibus tolli possunt, nisi ea sint natura, vt etiam principio ardeant, & fluuant. Vbi autem in naturam nostra diutius egerunt, remediis quantumuis generosis non vincuntur, vt sæpe ferro sit opus & cauterio. Quomodo item cum agricola omnes magnas arboris radices concidit, terra ligonibus effossa, fessus is vires interdum alterius requirit exiguas, quæ arborem prosternant: sic victo à natura morbo, nondum tamen ob lassitudinem ipsius profligato adiutrices Medici manus postulat. Quæ alioqui solet quem vicit morbum per se profligare, vt arborator arborem: quādo autem certamine aut longo vt vehementi contra morbum longum, magnum, malignum, ipsa etiā prius haud ita valens, fuerit fracta, tunc auxilio eget nostro, nisi antè succumbat, etiam nobis eam adiutantibus, sed planè victam, cadibundam, & moribundam.

E



*Aph. 2. et**23. et 25.**Lib. 1. et**Aph. 2. et**3. Lib. 4.*

Cum autem purgatio sit humorum sua  
 qualitate molestantium facta vacuatio vo-  
 mitu, aut potius deiectione, si talis humor  
 vel à natura, vel à Medico eius imitatore va-  
 cuetur, qualem abundare indicat morbi  
 non modo præsentis, sed aliorum quoque  
 consuetorum natura, ægri ætas, temperatu-  
 ra, vitæ conditio, habitus, consuetudo, vi-  
 ctus ratio, pars anni, regio, præsens cæli sta-  
 tus, cōfert talis vacuatio, estq; egro toleratu  
 facilis: vt si bilis flaua calidis siccis prædictis  
 moranibus, pituita iisdē frigidis humidis va-  
 cuetur. ab his igitur ipsis & aliis humorē in  
 corpore redundantē demonstrātibus (quæ  
 in semæotice latius docuimus) qualis humor  
 sit purgandus, coniectabis. Qualitatis signa  
 hæc sufficiant nobis ad eligendū qualem  
 noxium humorem nos vacuare oporteat.  
 Quantum autem sit vacuandum humoris  
 eius noxij, tolerandi facilitas nobis indica-  
 bit: & si talia deiiciantur, qualia deiici o-  
 pus est, quod scilicet superabundante va-  
 cuato humore, æger seipso fiat leuior, &  
 morbum melius ferat. Si enim humor ali-  
 quis nature adhuc familiaris vacuetur, vires  
 soluantur & læduntur. Item si plurima &  
 repentina fiat vacuatio, etiam corruptæ ma-  
 teriæ, nam omne nimium & repentinū na-  
 turæ est inimicum. Antè tamen coniecturatur  
 quæ

*Aph. 31.**Lib. 2.**Aph. 27.**Lib. 6.*



quadam artificiosa ex morbi ac causæ eius magnitudine ægri natura, proprietate, viribus, ætate, habitu, consuetudine, aëris tēperie, & medicamento viribus præsumendum est, quanto purgante remedio ( vt idem in cæteris auxiliis intelligas ) tali vt catholico, cassia in tali tempore, morbi talis, à tali & tãta causa, in hoc aëre, hoc corpore sit opus. Quam coniecturam feliciorem tibi reddēt probatæ iamdiu doses, & mensuræ dandorum medicamentorum, tam simplicium ( de quibus paulò antè ) quàm compositorum ( quas lib. 4. dicemus. ) In his enim minimā & maximam medicamentorum mensuram inuenies: illam omnibus dictis causis paruum requirentibus vacationem: hanc contrariis, in vtriusque medio collocatas causas pro vicinia aut recessu extremarum coniectabis: in omnibus tamen tutius est à minoribus incipere, & pro effecto augere vel minuere.

Aliarum autem vacationū, vt eius quæ phlebotome fit, quātitatis idoneę signa præter hæc sunt alia, vt coloris sanguinis mutatio in phlegmonis sectæ venæ propinquis, pleuritide, synanche: vt animi deliquium ex multa vacatione in maximis phlegmonis, in adurentibus febribus, in vehementissimis dolorib<sup>9</sup>, si vires prius erāt integre & valētes.

*Lib. 9. me**thod.*



*Aph. II.  
et 19. li. I.*

**A** Limentum quoque, alioqui naturæ amicum ad suas vires tutandas, prohibetur in accessionibus, & aliquandiu ante accessiones, nisi viriū imbecillitas adsit (tūc enim omni tempore cibandum) multo magis per ea tempora à medicamentis naturam omnino alterantibus & inanientibus, ob id plurimū infirmantibus, est abstinendum, si tamen febris sit aut cōtinua aut intermittens, sed cum longissimis accessionibus, tempus est deligendum in accessione mitius, aut aliquandiu ante accessionem, vt alimento dando, sic medicamento exhibendo. In febribus verò intermittentibus si vnum saltem diem cessent, eo purgandum est, non die accessionis: si duos dies, obseruandæ sunt vires, quæ reliquit accessio præcedens, & accessioni succedens per sudorem vel aliud vacuatio. Si enim fractæ multum videantur priore illo die sunt reficiendæ, postero vacuandum: sin erunt robustæ, & nulla post accessionem insignis facta est vacuatio per sudores, vrinas, vel aliter, neque accessionis vehemētia immodicè naturam alterauit, priore intermissione die purgandum, vt simul accessionis præcedentis



is reliquias vacues, quæ febrile in corpore aliquid fouent, & accessiones anteuertere cōpellunt, & sequuturis accessionibus materiam adimas.

Tempus autem idoneum dandi medicamento præcipuè ostendunt, motus naturæ (leuiora enim plurima à quibusdam traduntur) vel morbi, vel vtriusq; , adhæc ægri vires, & aëris conditio, & quæ præcesserunt, vel adsunt, vel impendent spontinæ vel nostræ vacuationes. Cū nanq; natura integrè ac perfectè crisi ipsa non vacuauit, vel non vacuat noxiam materiam, quo deficit adlet medicus vel medicamētis, vel aliis remediis, ne à reliquiis ipsis recidiua excite-  
*Li. 9. mes.*  
*Aph. 20. libr. 1.*  
*Ap. 12. libr. 2.*  
*Ap. 21. libro 1.*  
 tur: vacuabit autē naturæ motū imbecilliorē adiuuās, si is per partes idoneas vacuabat, vt per nares hæmorrhagia, si ex nare fluat lateris dolentis, si quod fortè dolebat: per intestina, fluore, alui: per vterum, per hæmorrhoidas venas, per vrinarium meatum, per poros cutis, promouendo ad has partes vacuanda. Si verò natura deprauatè mouet excrementa, vt ad pulmonem, thoracem, cor, vel aliam patem principem, vel effluxu libero carentem, tunc quia maius damnum est sequuturū, hunc naturæ motū prohibebimus, & ad cōtraria trāferemus & auertemus. Deprauatus etiam est naturæ motus, si  
*Ap. 22. libro 1.*



ante coctionē symptomaticē vacuat : nam  
concocta medicari oportet : si verò etiam  
iusta crisi immodicē moueat, motus eius est  
inhibendus, in contrarium repellendo.

*Ap. 24.* Morbi quoque motus vel celer in acutis,  
*lib. 1. &* vel errabundus etiam in aliis, in principio  
*Ap. 10.* crudam adhuc materiā vacuari interdum  
*lib. 4.* permittit : in acutis enim morbis rarò & cū  
*Ap. 22.* præmeditatione, sed in principio medica-  
*lib. 1. &* mentis purgantibus vtendum, in aliis verò  
*li. 8. com.* concocta medicari oportet non cruda, nec  
*ph. p.* in principiis, modò non turgeant : si enim  
*Ap. 29.* turgeat materia, & ad excretionem tendat,  
*lib. 2.* vel in nulla parte firmam habeat statio-  
*Ap. 30.* nem, etiam initio purganda, non expecta-  
*lib. 2.* to eius in partem aliquam decubitu, quem  
*Ap. 29.* postea vincere non fuerit facile. Dum enim  
*lib. 2.* tales morbi inchoant, vacuanda est hæc ma-  
teria, sed clementiore medicamento : nec  
minùs in principiis morborum salubrium,  
si magna est cacochymia, vacuandum est,  
vt reliquam materiam parciolem facilius  
natura percoquat. Huc pertinet quòd sym-  
ptomata etiam vires prostermentia circa  
morborum initia, vt etiam in declinatione,  
sunt mitiora.

Eadem verò quia in morbi vigore sunt  
valentissima, & vires multum prostermen-  
tia, ob id dum morbi consistunt, à purgan-  
tibus



eibus medicamentis abstinendum est. Non  
 modò autem in vigore vniuersali à medi-  
 camentis abstinendum, sed etià in particu-  
 lari, atq; adeò particulari principio: si enim  
 est in accessionibus ab alimèto, vtpote no-  
 cituro (quia naturam à coquenda morbi  
 causa ad alimenti coctionem auocaret) ab-  
 stinendum multò magis à medicamento.  
 Potius enim die est intermissionis vacuan-  
 dum, quòd si accessio vel longissima sit, vel  
 continua, medicandum, vt paulò antè dixi,  
 quando morbus est mitior: si autem sit fe-  
 bris homotonos aut anabatica, initio po-  
 tius medicandum, viribus adhuc integris, &  
 materiæ coquendæ copia naturæ subtra-  
 henda. Tunc enim dandum est medica-  
 mentum, cum vires validæ id in actum du-  
 cere possunt, & materiam nondum fixam *Aph. 2. 3.*  
 expellere ad medicamentũ attrahens, & ta- *et 25. 4. 1.*  
 lem ac tantam vacuationem ferre, qualem  
 hoc est, cuius humoris scilicet noxij, &  
 quantam medicamentum hoc facturum  
 coniectura per experientiam longam fir-  
 mata, colligimus. Deiectiones enim non *Aph. 3.*  
 multitudine sunt æstimandæ, sed si talia *lib. 4.*  
 deiciantur, quæli pro morbi natura, æra-  
 te, parte anni præcedente victus ratione de-  
 iici oportet, & ægri facillè tolerant. Neq;  
 enim semper optatiora sunt medicamenta,



*Ap. 51.*  
*lib. 2.*  
*Ap. 27.*  
*lib. 6.* quæ multam faciunt etiam noxiæ materiæ  
vacuationem, nisi æger tantam vacuatio-  
nem facile toleret. Plurimum enim atq; re-  
pentè vacuare, vt replere, malū: quòd omne  
nimium & repentinum naturæ sit inimi-  
cum. Ob id etiam Hippocrates empyis ipsis  
pus, & hydropicis aquam vniuersim eua-  
cuare per sectionem vel vstionem thoracis  
& ventris cavit, quia alioqui omnes moriū-  
tur. Ab aëre autem sumpta indicatio medi-  
camenti hoc tempore dandi vel non dan-  
di post à fusiùs tractabitur, & antea obiter  
est perstricta.

*Ap. 30.*  
*lib. 2.* Cum igitur circa initia & fines morbo-  
rum symptomata, accessio, vigiliæ, dolor, si-  
tis, cibi fastidium sint imbecilliora, vt mor-  
bus horum causa est mitior: cum verò mor-  
bi in suo vigore consistunt, dicta sympto-  
mata sunt fortiora, & tunc natura coctioni  
materiæ vacet. Purgandū aut initio mor-  
borum est, aut sub finem vniuersalem mor-  
*Ap. 10.*  
*lib. 4.* borum, aut vtroque etiam tempore: Initio  
quidem, vt minorem iam redditā materiam  
possit natura faciliùs coquere.

*Ap. 24.*  
*lib. 7.* Medicari etiam in valde acutis, si mate-  
ria turgeat, eadem die: tardare enim in tali-  
bus malum est.

Item in acutis morbis si materia turgeat,  
ta est in principio purgāda, cum maius cō-  
mod



modum huius materiae febrem committē-  
tis vacuationē sequatur, quā incōmodum  
ex aucto calore per medicamēta purgantia,  
quae omnia sunt potestate calida: si verò  
multus illis crudus succus inest, vel crassus,  
vel lentus, à quo hypochondria inflentur ac  
tendantur, vel immodicè caleant, aut sit vi-  
scerum inflāmatio, in his periculosa est pur-  
gatio in morborū acutorū initio, sed prius  
humores noxij, crassi, lenti sunt tenuādi, in-  
cidendi, tergendī, ad fluxū parādi. & liberā-  
dæ sunt obstructions, aperiendīq; meatus,  
per quos est humor à medicamēto purgan-  
te trahendas, & transmittendus, faciendāq;  
vacuatio, ut in morbis lōgicæ tales causas se-  
quentibus fieri consuevit, & quibusdā acu-  
tis: nā acutissimi nō dāt horū auxiliorū in-  
ducias. Corpora enim cū quis purgare  
volet, oportet fluida facere, citra quā operā  
si purgare vomitu aut deiectione coneris,  
difficilis sit purgatio cū torminibus, verti-  
gine, multo fastidio, pulsu malo, dissolutio-  
ne viriū & difficultate, ac rosione ibidem.  
quia omnes succi crudi sunt pigri, & ad mo-  
tum inepti, ob crassitudinē & frigiditatem.  
Quo fit, ut vias omnes angustas etiam ob-  
struat, per quas id quod medicamentū dei-  
cit, ferri ad aluū debeat, ac ita nec ipsi educā-  
tur, & aliis sint impedimēto, li. 4. fani. tuēd.

*Aph. 9.  
lib. 2.*

E 5



- Ap. 22.*  
*lib. 1.* Concocta nanque medicari & purgare oportet, nō cruda, nec in principijs, nisi turgent; plurimæ verò materiæ non turgent, sed firmatæ sunt in parte aliqua, quas ante coctionem neque medicamento, neque aliter mouere expedit: vbi autem cocta erit, vacuanda, quia tunc naturam habemus euacuationi adminiculantem: hæc enim coquendo secernit, postea excernit superflua, & crises facit, quas si perfectè agit, linenda est: si imbecillius, iuuanda, & quod de legitima noxijs humoris vacuatione deficit, à nobis supplendum medicamento purgare, humorem sibi proprium trahente, & natura eundem expellente, aut alia vacuatione feliciter à natura incepta, & per loca conferentia, sed non absoluta. Eam autem vacuationem absoluimus, quia quæ ex morbis post crisin relinquuntur, materiæ humorum noxiorum in corpore, recidivas febres facere consueuerunt. Cùm enim alieni sint à natura, nec nutrire possint, corrumpuntur & putrent, idq; celerrimè, quòd sint in loco calido, ante verò putredinem appetentiam prosternunt: si in ventriculo collecti sint, aut corroborari corpus, etiam si alimentum idoneum assumat, qui ex morbo illo reuauit, prohibent, & quò plus alimenti sumit, tantò peius habet, quod corpora non pura  
quan
- Ap. 21.*  
*lib. 1.*
- Apho. 8.*  
*lib. 2.*
- Ap. 10.*  
*lib. 2.*



quantò plus nutries, tantò magis laedes.

Ex quibus apparet, initio morborum purgandos esse noxios humores, vel qui ventriculi spatium occupant & intestinorum, & si vis primarum venarum, modò impacti eis valentius non sint (qualis multis est harum regionum frigidarum hominibus voracissimis) vel qui motu errabundo huc illuc per corpus incitati feruntur. Tales enim ambo facilè à medicamèto etiam clemente, vel decuntur, vel trahuntur: ut neq; contingat dicta prius symptomata difficilium purgationum, vertigines, tormina, lipothymia: neque morbus augeatur. In id enim blandioribus, ut cassia nigra, hiera picra, & similibus utimur, quorum vis ultra hepar non fertur, aut non multò ultra.

Purgandum secundo in fine status vel declinatione morborum, còcta iam materia & coëpta à natura expelli, sed ob virium eius laxatæ imbecillitatem nondum omnino expulsa. Quam vacationem etiam tentare licet, simul dum natura crisin mouet imbecilliter, ut geminatis motibus, naturæ & medicamenti, perfecta tunc fiat noxiæ materiæ vacuatio, eaque per loca conferentia.

Sic hiera dat Galenus in phlegmone ventriculi post ipsius declinationem, nullo phlegmo

*Lib. 8. cõ.*

*ph. p.*

*gmo*



gmones ipsius tempore, modò non turgeat materia, neque ad excretionem impellatur, & nullam adhuc firmam inclinationem ad ullam partem habeat, aut stationem.

Purgantia autem succos crassos & tenaces vt pituitã & melancholiã, faciliùs paulatim & sæpe purgât, interea tenuatos, incisivos, deterfos, quàm affatim: sic enim corpus exagitur, & solùm tenue & aquosum vacuatur: Alexander Trallianus in cephalalgia à crassis & lentis & frigidis humoribus, & iterum in podagra phlegmatica.

*Libr. 7.  
meth.*

Sumpto autem medicamento purgante modicè corpus ambulatione mouendum, vt celerius descendat, quod sumpta hieracæ præcepit Galen. & sumpto elleboro, Hippocrates Aph. 14. & 15. lib. 5.

*Lib. quos  
med. pur.  
oportet.*

Postquàm autem assumptum est medicamentum purgatoriũ præsertim validum, ptissanæ cremorem sorbendum dat Hippoc. lib. 2. rat. vict. acutorum, vt quæ portio medicamenti gulæ & stomacho adhæsit, tergeatur, & deorsum trahatur, & alteratio à medicamento in dictis partibus facta corrigatur. Vbi autem fieri inceperit purgatio, negat dandam ptissanam, ne vis medicamenti exoluatur. Hodie quoq; quod lauatoriũ vocant, ferè horis tribus à sumpto medicamento exhibet, hora circiter vna ante pastũ,

*Si*



Si verò medicamentum vel nihil egerit ob naturæ ægri proprietatem, aut medicamenti imbecillitatem, aut portionem exiguā, aut intestina stercore duro per clysterem prius vacuando obstructa, aut magnū naturæ imperum celeriter medicamentum deturbantis, vel non reducentis in actum, vel ob causas cōtrarias immodicē mouerit: singulorum remedia habes in canonibus Mesuæ. Quod si retineatur, & clemens fuerit retentum, præterquā corpus nō laedit, animalis sit alimentum. Valentia verò lædunt si retinentur, & in qualitatem delecteriam & venenosam vertuntur.

Purgantia vomitu interdū ieiunis dantur: sic Philotimus & Praxagoras crudorū succorum copiam ex ventriculo & primis venis vomitu vacuabāt, data largiore mulsā cui incoctum erat hyssopum, qua etiam hi succi crudi ante vomitum sunt tenuandi & coquendi, & si qui etiam post vomitum supersunt: modò cum crudorum succorum copia, neque humor mordax sit extra venas lassitudinem vlcerosam faciens, neque alius affectus vomitum illum impediens: nam eo acres humores per halitum digerendi intra venas in corpus intimum traherētur. Vomitus etiam impediūt hyems, Aph. 6. lib. 4. phlegmone vētriculi & partium vicinarum

*Li. 4. s. nit. mend.*

*Li. 1. loc.*

*affec. &*

*Aph. 6.*

*& 7. lib.*

*4.*



*Lib. 5. v-  
sus par-  
tium.*

rum, phthisis Aph. 8. li. 4. dolor capitis, quia  
id vomitus replet, ob id dānatus Asclepia-  
di: si quis item ægrè vomit, non est cogen-  
dus, aut paulatim ad vomendum victu hu-  
meante est parandus, vt Aph. 13. lib. 4.

*Sic folum  
aque cali-  
da in pun-  
ctura ner-  
ui dānat  
Gal. li. 6.  
meth.*

Vomitum etiam purgantur corpora post  
cibū, nō quemuis, sed falsum, amarū, acrem,  
seu incidentem, tenuantem, tergētem: oxy-  
melite autem cū succo raphanidis misto,  
& multò largiore quā potus, aut deiection-  
is gratia sumpto, facilius & promptior fit  
vomitum, adhuc efficacior: nam qui ex aqua  
tepida vim retentricē ventriculi dissoluen-  
te, & corpus eius à frigido concretum velut  
resolvente fit vomitus, etiam si vinum dul-  
ce superbiberint, tantum vacuat, quæ in eius  
capacitate innatant, non etiam quæ tunica  
eius internæ hærent, multò minùs quæ al-  
tri in tunicas ipsas recepta sunt & impacta.  
Ad quæ vacuanda, hieram picram Galenus  
docet esse efficacissimam.

Vomendum etiam bis in mense Hippo-  
lib. de somniis ægrorum.

*Li. 6. sa-  
nit. ægr.*

Post vacuatum ventriculum vel bilē fla-  
ua in ipsum confluentē, vel etiam in ipsius  
tunicas altius imbibito excremento, illa per  
comam absinthij, hoc per hieram picram,  
ventri admove foris vnctiones modicè a-  
stringentes, vt melinum æstate, nardinum  
hyem.



hyeme, mastichinū vere, id enim medium est inter mehnū, quod frigidū est, & vnguentum nardinum, quod calidum, potissimum cū amomum liberaliū immistum habet. Qui locus etiam indicationem ab aëre ad vsum rectum, medicamentorū conferre declarat.

Astringentia primis epulis sumpta aluū cohibent, post cibū ingesta aluum soluunt. Causa huius est libro 6. sanit. tuendæ, & 1. libr. & 2. alimentorum. Qui verò thorace sunt angusto, & ob id pulmone contracto inepti sunt vomitoria purgationi, præsertim per elleborū album. Vas enim vomendo sibi ruperint in aliquo respirationis instrumento. Quod si alius elleboro purgandus est, cibo & quiete corpus antè humectetur, & vomitu assuefiat.

Fiunt quoq; purgationes vti & phlebotomæ interdum ad præcautionem morborum impendentium, non presentium curationem: vt cū quis vere ineūte corpus vacuet, vt à vernis morbis aut æstiuis sit liber: vt autumno, vt vitet autūnales morbos ac hybernos. Eadem ratione si quis in spontanea lassitudine morbum aliquem præ-

*Aph. 5.  
libro 2.*

nuntiante vacuet, morbum perfici prohibet. Item si quis noxiōrū humorū ex morbo præcedente reliquias vacuet, vt recidiuū

morbo



morbum prohibeat, vt prius dictum est: sic dum plethoricum & optimū corporis habitum vacuamus vt corpus ipsum nutriri rursus incipiat, & ne calor natiuus suffocetur, aut vasa præ copia rumpantur.

*Aph. 3.  
lib. 1.*

Alias sanos ipsos nunquam medicamur, quia medicamenta difficulter ferūt, & vertigines ac tormina patiūtur, & egrè his purgatio procedit, & celeriter exoluuntur.

*Ap. 36.  
37. li.  
2.*

Phlegmones initio sola repellentia, augmento miscenda coquentia, statu digerētia, quibus solis in declinatione vtendum. Eadem ratione in morbis aliis à fluxione prodeuntibus, nisi fluxio eruperit in partes principi alicui parti, vt cerebro, cordi, hepatis, vetriculo propinquas: aut nisi materia sit venenosa & pestilens: aut nisi materia crassior, glutinosior, impactior, profundior, vt in pleuritide, ischiade. In horum enim affectionum initiis anodynus vtimur, post coquentibus & digerentibus, habita prius ratione totius corporis, si vacuatione egere videbitur.

Hæc de tēporibus vniuersalibus & particularibus morborū, quibus medicamenta sumi vel admoueri possint, sufficiant, reliqua ex methodo reperantur.

Tempus aliud quoque spectandum est in recto vsu medicamentorum, non morbi quid



quidem, sed motus primi mobilis respectu,  
quod propriè & absolutè tempus dicimus,  
& ab eo partes anni & diei.

Cùm morbus dat inducias & delectu ha *Lib. 7. me*  
bito purgamus, siue morbi initio, siue cocta *thod.*  
iam materia ( vt diximus ) ferè purgatoria  
damus medicamenta, cùm ventriculus he-  
sterno cibo est vacuus, hoc est, manè. Quod  
tempus intellexit Galenus, cùm dixit, hie-  
ra picra dabitur solito purgantium medica-  
mentorum tempore, quanquàm in libro  
quos medicamentis purgare oporteat, &  
qualibus, & quando, temporis huius non  
meminit, nisi in ea operis parte, quæ deside-  
rari videtur, id addiderit. Quem verò librū  
de compositione purgantium medicamen-  
torum promisit libro i. comp. phar. part. ad-  
huc desideramus. Cumq; catapotia dedit ex  
aloë & hieram diacolocynthidos bis initio  
lib. i. comp. ph. part. temporis huius nul-  
lam facit mentionem, tãquam id omnibus  
notissimum esset, prætermittens. Id tem-  
pus etiam hodie seruamus, quoties siue ad  
curationem, siue ad præcautionem corpus  
est purgandum potione, vel bolo ( vt vo-  
camus ) vel tesseris saccharatis & scammo-  
niatis.

Si verò catapotiiis purgandum, magna  
ex parte media nocte leuissimè cœnatis, aut

F



post primū somnum ea dantur, vacuo iam  
(vt videri potest) ventriculo, vt in eis ad  
actum reducendis solis occupetur. Quæ res  
ei est difficilis ob crassitiem & duritiem, ob  
id orobi magnitudine & molliora facimus,  
cū citò vacuare libet, & minore ventricu-  
li molestia. Nam crassa & dura, vt diutius  
agant, vtq; potentius à corpore toto attra-  
hant, si ea vi sunt prædita, tamen crassitie &  
duritie, & mora longiore ventriculo mole-  
stissima esse consueverunt.

Cū verò tantum ventrem inferiorem,  
ventriculū, intestina, ac venas primas pur-  
gare libet, etiam hora vna ante vel post epu-  
las, damus leuiora quædam cathartica, vt ca-  
taporia Rufi, & mastichina, & ex aloë, &  
quæ ante cibum vocant à consuetudo vten-  
di tempore: item cassiam nigram. Quæ e-  
tiam minore mensura largius purgare vi-  
dentur, quod secum cibū propè omnem ac  
potum deturbent. Quibus item alius natu-  
ra aut euētu aliquo est astrictior, his succur-  
rimus datis duabus drachmis cassiæ huius,  
aut circiter paulò ante tres pastus, idq; sin-  
gulis hebdomadis, si opus est, repetere sua-  
demus magno ægrorum commodo.

Quibus hepar est calidius, his hora vna  
ante matutinum purgantis medicamenti  
vsum propinamus, ptissanæ vel alterius si-  
mili



militer refrigerantis & humectantis cyathos duos, ut pars in melius alterata minus à medicamento mutetur: & horis quatuor à prandio uncias duas syrupi rosati, vel similis exhibemus, praesertim aëre calido: aut ante coenam, aut horis duabus vel tribus à coena medicamentum idem damus, hepaticam per alimentum temperato. Qua ratione iisdem exercitationem (si qua aut celeris, aut robusta, aut vehemens est obeunda) ante coenam suademus & venerem, si sint vxorati, innocentiores eis paulo ante coenam aut ante mediam noctem cum praedixissemus, experientia verissimū comprobant: & salsa aromatāq; summa mensa vinumq; generosius & meracius innocenter magis ferunt, quam primis epulis. Hac de causa enim quietem, hoc est, leuiculam mutationem, qualis est ambulatio, calidae naturae praecipit Hippoc. Hac opinione Venetiis & Italiae magna parte, & calidis aliis regionibus medicamenta scammoniat praebent vel paulo ante coenam, vel horis duabus à coena, ut cibo potuque vis eorum vehemens inducta mitescat, & secum quae in ventriculo & primis venis pigre cessant, trahat. Quam rem largissime deiectiones sequantur, & parua agri molestia, quam profecto calidae siccāq; naturae maio-



rem experirentur, si in vacuum ventriculū hepar, venas calētissimū id medicamentum feratur.

In his verò frigidis regionibus & pituitosis maxima parte naturis nō ab aëris natura modò, sed inexplēta ingluvie, à purgātibz scammoniatis ventriculo hesternā cœna vacuo non timemus, quòd in eo largā adhuc pituita & fluitet, & hæreat, & altius imbibita sit. Ob id ferè matutinū tempus purgationi destinamus, horasque duas, tres, quatuor inter medicamentum & epulas interponimus pro medicamenti facultate & ægrī natura. Nam scammoniata nō multò post quā sumpta sunt, vacuant, egentque primū iusculo, quod ipsa celerius per intestina deiiciat, & noxā partibus impertitā eluat. Rha barbarum verò cū tardius agat, longius sibi tēpus postulat ad trahendum, neque citò de corpore pellendum: quia tantum abest, vt visceribus obsit, vt etiam sua vi astrictoria (quam cum purgante coniūctam habet in diuersis scilicet substantiis) firmiora reddat.

Vbi autem morbi non expectati violentia vrget, quocunq; tempore is vacuationē postularit, si ea perfici possit, & vires ferre queant, à nobis imperatur etiam vehemēs, quòd extremis morbis extrema exquisita  
remed



remedia sint optima: & in talibus morbis à vehementissimis sit incipiendum, non quomodo in clemētoribus à leuibus remediis curatio initur. Quomodo vlcus omne remedia siccantia morsus expertia requirit: quæ verò maligna sunt vlcera & putrida, acris egent, & ignis modo exedentibus, misy, chalciti, arsenico, calce, sandaracha.

Partes quoq; anni temporis appellatione venientis aliquid etiam ad purgationes vtile indicant: ob id veris initio pituitam siue bilem flauam, & autumno atram, ad vitandos vernos, æstiuos, autumnales, & hybernos morbos purgare, & venam secare consuevit Galenus, non æstate nec hyeme: nam æstate corpora calidiora & ficciora, & ab aëre ambiente dissoluta, medicamentis purgātibus & sanguinis vacuatione maxime læduntur, quòd illa calfacit, siccatur, infirmat, ac dissoluit, hæc inanitione virium substantiam dissipat: hyeme verò excrementa concreta ad motū pigra medicamento trahent dum non parent, lucta in corpore torminosa fit & molestissima, cui etiam lipothymia sæpe succedit. Phlebotome verò aëre frigido dum calorem natium multum vacuat, & eius pabulum subtrahit, extinguendi reliqui caloris periculum affert ab ambiente frigido. Ob id etiam æsta-

*Lib. 2. ad*

*Glaucon.*

*Lib. quæ*

*medi. pur.*

*oportet.*

*Lib. de cu*

*rat. morbi*

*per phleb.*



*Aph 5. li.* teraris utimur medicamentis purgantibus,  
*bro 4.* præsertim sub cane & ante canem, vel simi-  
*Aphor. 4.* lem aeris statum, iisque cholagogis potius  
*libr. 4.* & vomitu magis purgantibus, quod eo bi-  
*Hippo. de* lis tunc largior magis repat. Hyeme phleg-  
*natur. ho-* magogis vel melancholiam vacuantibus  
*minu.* utimur magis, & his deiectoriis non vom-  
*Alb. 4. &* toriis.

*6. & 9. li.* Aliud etiã tempus, astrorum ortu & oc-  
*4.* casu varium spectare iubent astrologi in  
 usu medicamentorum apto, quod tamen  
 hodie Medici propè omnes negligunt, quod  
 id Galeno observatum non legimus, nec  
 observandum putamus, longa experientia  
 & ratione optima persuasi. Tamen recipi-  
 mus spectandas Medico magnas in aëre fieri  
 solitas mutationes circa ortum & occasum  
 magnorum quorundam siderum, de quibus  
 multa Aëtius lib. 3. cap. 174. Alexander item  
 libro 4. in podagra medicamentum Tra-  
 chij Philosophi dat veris initio, sole Pisces  
 ingrediente.

Est præter hæc tempus observandũ, diei  
 pars matutina, meridiana, vespertina, no-  
 cturna, ante cibũ, post cibum, vel alia qua-  
 dam remedia, vel mox à cibo, vel alio re-  
 medio, vel multò post. Cuius magna vis est  
 in quibusdam, quorum postea aliquot exē-  
 pla leges.

Ad



Ad tempus quoq; referri potest affectus *Lib. 7. me*  
 prior curandus, qui est alterius causa: vt si *ihod.*  
 fluxio à capite in oculos est, caput primùm  
 est curandum, deinde oculorum firmitati  
 est prospiciendum, vt eorum quæ confluunt  
 minus promptè quicquam recipiant. Aliud  
 præterea tēpus ante morbi generationem,  
 dum præcauemus & morbo iam gigni cœ-  
 pto, aut etiam genito, quando curamus: ad  
 præcautionem enim minor quātitas reme-  
 diorum requiritur, quā ad curationem. Ob  
 id theriaces fabæ Aegyptiæ quātitas ad præ-  
 cautionem semel die sufficit: venenato au-  
 tem, vel alio affectu cui hæc medetur, affe-  
 cto & largior & crebrior danda. Et Ae- *Li. 11. sim*  
 schrion plus pulueris *Διὰ καπνίσματος*, dabit *plic.*  
 iam diu moris, minùs recenter moris. Et  
 Galenus picrocolis, quibus quod per cutim  
 quoti die transpirat, est acre, lauare semel in  
 die & modicè cum paucò oleo dulci frica-  
 re sufficit, cum valent: vbi verò stipata cutis  
 est ab astringentibus, aut emplasticis, aut  
 ficcantibus, sic vt iam inæqualitatem calo-  
 ris horridam sentiant, vel etiam inde iā fe-  
 bricitent: soluta accessione bis & ter lauat,  
 oleo sabino pinguius & molliter vberius *Lib. 8. me*  
 fricat, pro causarum magnitudine & mul- *ihod.*  
 titudine.

Quedam nullo discrimine ante cibū vel



post cibum sumuntur, vt catapotia ante cibum vulgò dicta, quæ etiam post cibum accipi & dici possunt.

*Li. 4. san.  
tuenda.*

Diospolitici puluis cremori ptissanæ, vel aliis aptis inspersus, vel ipsum cū melle optimo & curiosè despumato mistū, sumitur ante & post cibū ad flatus discutiendos, & aluū soluendam, præsertim si nitri tantum habeat, quantū cumini, piperis, & rutæ, quibus 4. simplicibus constat.

*Ibidem.*

Medicamentum dia trion pipereon datur ad flatus discutiendos, & iuuandam coctionem non semel, bisve quotidie, sed etiam sæpe: siquidem manè & ante cibū, & post, etiam cubitū euntibus cochlearij pleni mensura, & eius quidem parui in paruis corporibus, maximi in maximis, in mediis ad portionem. Vbi indicationem quantitatis medicamenti sumit etiam à quantitate corporis.

*In fine li.  
6. sanita.  
tuenda.*

Diacydonio datur ieinnis mediocris mystri mensura, nec à cibo sumptum lædit: commodè etiam datur ante cœnam post prandium. Detur autem duabus aut tribus horis ante cibum.

Sic cōdita electaria, pulueres, & id genus alia roborando ventriculo idonea, modò ante cibum, modò post sumi iubemus.

*Li. 4. san.*

Quæ verò ad alimenti in corpus distributio



butionem vehementiorem faciunt, ea sunt sumenda manè: quòd si per ea vacuationem eorum quæ in carne cessant, molimur, post frictionem matutinam, ante exercitationē & balneum sumantur: quando Galenus dabat diacalaminthen in lassitudine vlcerosa cum cocta cruditate primarum venarum.

Quæ hepar obstructum liberant incipientia, tenuantia, tergentia, vacuantia dāda sunt eo tempore, quod inter surgendum à somno & lauandum interuenit, postquam scilicet iam confecta sunt, quæ ex ventre ad hepar reddūtur, & temporis aliquid eorum operi ante cibum sumendum dari non inutile fuerit. *Lib. 6. san. nit. tuend.*

## D E M O D O V T E N D I M E D I C A M E N T I S.

**V**Tendi modus superest dicendus, cuique propè medicamento suus, cuique item parti suus propemodum. Sumitur autem à partis natura, figura, situ, cōnexionē, magnitudine, sensu obtuso vel acri: affectus natura, situ, figura, magnitudine, duratione: egri natura, ætate, cōsuetudine, viribus: aëris tēperie, medicamenti denique viribus, consistētia, & cæteris prius in compositionis methodo dictis. *Initio lib. 4. cō. ph. p.* Quæ enim methodus est



*Lib. 6. c. c.  
ph. part.*

componendi propria partiū medicamenta, eadem his vtendi. Ipsa nanq; compositio veluti vsus respectu efficitur, dum illi spectant, qui medicamenta conficiunt, vt ipsorū vsu aegris auxilientur. Tamē in multis partibus non opus est solū, qua methodo remedia sint inuenienda scire: sed etiā quomodo inuentis decenter vtendū sit: vt in affectibus capitis, aurium, oculorum, nariū, oris, & ceteris post leges, si prius familiaribus exemplis prædicta breuissimē declarauero. Partibus natura frigidis, vt capiti, oculo, etiam si morbo calido laborant, actu vehementer frigida, qualia sunt narcotica, adhibere veremur: licet ab aestu calfactis olea etiā niue refrigerata capiti affundimus: & oculis calētibz aquam frigidissimam applicamus.

Quia capiti rotundo & probē sphærico affusum oleum nō coheret, ex alto per mediocrem lanæ modum sincipiti affunditur. In partes cauas, vt aures, nares, os, & reliqua ei connexa, vterum, meatum vrinarium, sedem, sinum, medicamenta impelluntur, vel attrahuntur, vel recipiuntur corpore in id figurato: in aures enim otenchyta, id est, oriculario clystere vel strigili infundūtur: in nares flatu per tubū impelluntur, vel inspirando attrahuntur, vel turunda immittuntur. In os imposita nūc gargarizantur, nunc per



per foramina palati expiratu propelluntur, nunc deuoratur, nunc paulatim deglutiuntur, nunc faucibus retenta sensim inspiratu transeunt in pulmones, nunc ore retinentur, ut ventriculum vel cerebrum roborent, ut fluxiones acres temperent, cogant, reprimant.

Cauitas narium, & sedis, & vteri, & quorundam sinuum deorsum spectat, ob id vel corpus in contrariam figuram constituendum, vel liquidis materiis in hos meatus iniectis, bombace, turunda, pello est opus, vel alio operculo, ne materia ressuant.

In os & fauces recepta, foraminibus palati, gutturi & gulæ communia sunt: in illa autem efflatu, in asperam arteriam inspiratu, in gulam deglutitione feruntur, quæ ipsi, vel ventriculo, vel hepati, vel lieni, vel tenuibus intestinis, vel venis mesaraicis, atque adeo toti corpori per venas & hepar coniuncto cum ventriculo salubria esse volumus, ut in crassa intestina per sedem, in capacitatem vteri per collum vteri, in vesicam, per meatum urinarium, in sinibus caernosis & fistulosis pro cuiusque figura, situ, & connexionione iniectiones fiunt nunc hæc, nunc illac.

Quæ hepatis foris imponuntur linimenta, vnguenta, cataplasmata, emplastra, sint latiora, quam lieni, quam alteri reni:

minora



minora quàm ventriculo, & ventri reliquo.

Quę capiti magno epithemata, cucuphæ nobis dictæ, vel emplastra, vel alia remedia applicantur, sint maiora quàm paruo: & quę cruri circumponuntur maiora, quàm tibiæ: & quę sedi imponuntur pertusa cornua (cannonēs buxeos vocamus) in puero minora sint: & pessus in recens fœta, quàm in grauida sit maior.

Clyster largior magno, vacuo, quàm paruo & pleno, siue ab hydrope, fœtu, stercore, siue à flatibus, cibo, & aliis. Item parciore vtero & vesicæ iniectio fiat, quàm intestinis, quàm ventriculo: etiam potio immittitur, nisi recens fœta sit mulier.

Quę partes sensu tactus carent, vt glandulæ, ossa, cartilagines omnium remediorum vim ferunt etiam causticam sine dolore. Quę sentiunt, qua parte magis sentiunt, vt dens interior, musculi caput & tendo, oculi cohærens tunica, os ventriculi, palma manus, & internum digitorum: hæc mitiora postulant remedia, & minus mordacia, quàm si affectus est in alia ipsarum particula minus sentiēte. Et qui sunt delicati, mulieres, pueri mitiora postulant: rustici, fossiores, baiuli, nautæ valentiora in simili affectu remedia ferunt, siue sumenda, siue admouenda, facienda, educenda sint.

Morbus



Morbus calidus alia, quàm frigidus: humidus contraria quàm siccus remedia postulat: & calidus primo recessu alia, quàm calidus secundo aut tertio aut quarto: & interperies sola solis alterantibus pariter contrariis corrigitur, quæ verò cū materia est, aliis quoque vacationem ad sui curationem indicat. Intēperies simplex alia quàm composita, & pro vario compositionis modo aliis atque aliis remediis utēdum, & rebus aliis sunt vsui, alia veteratis. Præterea modus est alius sanādi intēperiem, alius incommodationem, alius unitatis solutionem, & in quoque horū genere modus alius, atque alius utendorum remediorum pro varia horum specie. Aliter enim fracturam curamus, aliter vulnus, & vulnus recens aliter quàm vetus, & simplex aliter quàm traumaticum, & sordidum aliter quàm purum, & æquale aliter quàm cauum, & putridum ac malignum aliter quàm salubre. Intēperies sublimis mitiora requirit remedia quàm profunda, vlcus, aut tumor superficiarius admotis remediis idoneis cedunt. Internæ etiam sumptis ægrè vincuntur, vlcus intestinalium, vteri, viarum vrinalium, oris: & aliarum partium præhumidarum, & calidarum immodicè ægrius vincuntur. Vlcus etiam rotundum haud temerè ad cicatricem



tricem peruenit, fractura in modum rapha-  
 ni ægrius alligatur, sinus ægrius curantur  
 quam alia vlcera. Magno vulnere non  
 sufficiunt vt paruo partes commissa & de-  
 ligatura, sed ferè futura aliqua opus est.  
 Magnæ phlegmonæ si non sit sanguis mis-  
 fus, & remedia alia idonea sint adhibita, su-  
 peruenit gangræna & sphacelos. Magnus  
 dolor dentium, coli, & aliarum multarum  
 partium vires deiecit, & sæpe est lethalis.  
 Magna febris seu quia est acutissima, seu  
 quia actiones principes multum proster-  
 nat, ferè est lethalis, & extremis exquisitè reme-  
 diis eget. Achoribus, alopeciis, cepha-  
 lalgis, & aliis affectibus veteratis, ob id  
 sanatu difficilioribus valètiore opus est re-  
 medio. Febribus diuturnis vel aliis affecti-  
 bus natura longis, post coctionem etià cle-  
 mentiora remedia sufficiunt, ob id quoti-  
 dianas & hecticas initiò blādè tractandas  
 imperat Galenus, veteratas etiam solus aër  
 vernus aut æstius persanat. In delicatis  
 tertianam exquisitam pleniore victu curat  
 Galenus, in aliis si vires valēt, tenuiore. Iis-  
 dem purgātium vim liquori delicato trās-  
 mittimus, eum colamus, saccharoq; & vul-  
 gari cinnamomo condimus, aliis ipsorum  
 substantiam totam exhibemus: assuetos vni  
 purgantiū generi aut formæ ad vtēdi mo-  
 dum

*Lib. I. ad  
 Glauco-  
 nem.*



dum alium trahimus. A medicamentis ab-  
horrētibus ea iusculis incoquimus, aut ali-  
ter alimēto, vel re iucūda tegimus, ne pur-  
gari se cognoscant, priusquam facta iam sit  
vacuatio. Sic phlebotomen formidanti ve-  
latis oculis secamus, aut aluū largius deiici-  
mus. Quibus partes infernæ laborant, pur-  
gationes supernas si faciles iis sunt, & con-  
suetæ imperamus: cōtrā quibus aliqua su-  
teriorū pars laborat, vt tabidis, cephalalgi-  
cis, deiectiones molimur nō vomitus. Qui-  
bus ventriculus est imbecillus, adeò vt me-  
dicamentum ferre nequeat, vel antè robo-  
ramus, vel acri clystere vacuamus. Fluen-  
te aluo immodicè ad vrinas sudores, vomi-  
tus retrahimus: obstructo hepate, liene, reni-  
bus, aut inflāmato, aliis atque aliis vtimur  
medicamentis pro causarum ratione. Nam  
si multum excrementum est, secta prius ve-  
na si omnia consentiunt, postea clementer  
purgamus: si crassum, tenuamus, si lentum,  
incidimus, & tergemus, potionibus, apoze-  
matis, electariis, id genus aliis.

Senes, spadones, & multæ mulieres, & qui  
alij gula sunt angustiore, catapotia etiam  
orobi magnitudine ægrè deuorant, potio-  
nem facilius. Florentes a tate, genus o-  
mne medicamenti quauis propè forma  
sumunt, nisi proprietas naturæ obstat, aut  
à me



à medicamentis offensi ipsa refugiant.

Quomodò consuetos labores faciliùs ferimus, etiã si imbecilli simus ac senes, quàm non consuetos : sic & medicamēti formam nobis consuetã faciliùs toleramus, quanuis ratione ac minùs sit efficax, vt pote nobis iam tempore familiaris reddita, vt imbecilibus venam cubantibus Medici secant : sic imbecillis mitiora & forma maximè iucunda exhibent medicamenta. In robustis minùs sumus solliciti de viribus medicamēti & de forma.

Potiones hyeme calidas imperam⁹, æstate frigidas, nisi affectus aliquis repugnet, vt vētriculi intemperies illic calida, hīc frigida. Aestate capillum audenter rondemus & radimus, cū affectus postulat : hyeme vix audemus, nisi vrgeat morbi magnitudo.

Catheretica in hyperfarcosi larga adhibemus, eadem summa specilli lata parte puluisculo parcissimè vlceri cicatrice tergendo inspergimus. Valentia purgantia vstionibus, lorionibus, trituris, aliorum misionibus meliora effcimus & salubriora, exhibemusque cum his quæ viribus eorum obstant.

Caustica cū adhibemus, vndique munimus cera, vel alio, ne vis eorū latiùs serpat. Galbanum medio emplastro imponimus.



nimus, quando ad eam partem quam ipsum tanget, largiùs trahendum est.

Crassiora medicamenta vt emplastra, quia phlegmonas sua duritie ledunt, aliquo aptiore liquido molimus, & liquidiora missis crassioribus corpulentiora reddimus, vt diutiùs hæreant.

Quorundam ex prædictis scopis ad modum vtendi medicamento obseruandis exempla aliquot ex Galeno maximè proferamus : nam omnium fuerit prolixius, & fortasse parum vtile.

Pilos auferimus vel nouacula, vel psilothro à parte, cui emplasticum medicamentum imponimus, & à toto corpore in picatione ad renutritionem, aut picationem inter duo lintea facimus, vel picem oleo aut butyro, aut simili minùs tenacem reddimus.

*Lib. I. cõ.  
ph. par.*

Pueris, eunuchis, mulieribus & cæteris *Ibidem.*  
cute & carne molli præditis, digerētia adhibe mediocria, si ex corpore illorū, vt ex cute capitis in alopecia dissipandū est: ex talibus enim prauī humores faciliè discutiuntur. In vlceribus eorundem medicamenta morfu carentia vtenda sunt: hæc enim vel sine molestia omnino agent, vel nihil nocent. Quæ verò parem noxam commodo afferunt, non sunt tentanda, vt quæ po-

G



*Libro 10.  
method.*

*Li. 1. ant.*

*Li. 11. sim.*

lypodas efficaciter purgant, si eos exacuunt non sunt adhibenda. Multo minus quæ plus nocent quam profunt, nisi noxa sit corrigi facilis: ut noxa ex balneo frigide per calfacientia in hecticis mox tollitur.

Antidota ante deleteria parua quantitate semel quotidie sufficiunt: post illa vero quadrupla aut quintupla, & bis quotidie sunt sumenda. Id quod etiam ad modum medicamenti refero, ut Galenus semel aut bis, aut frequentius cibum dare in morbo retulit. Aph. 17. lib. j. Sic Aescrion morsis nuper à cane rabido dabat cochlearium magni pulueris. vstorum cæcorum, iam diu morsis cochlearia duo quotidie.

*Libr. 1. cõ.  
ph. part.*

*Lib. 1. cõ.*

*ph. par.*

*Ibidem.*

Cum singulis medicamentis validis utimur, initio clementiora ipsa offeremus, mistis his quæ vim eorum validam obtundunt, ut oleo, cera: cum autem in inbecillibus utimur, ut thure, amygdalis amaris in alopecia, post usum primū & secundum, obserua affectū à medicamēto in corpore relictum, pro cuius varietate medicamēti vires vel augebis vel mitigabis. Valētissima igitur non statim ab initio adhibenda, sed à mirioribus incipiendum est, nisi affectus sit maximus.

Quoties simplicia aut composita facultatibus contraria miscemus, initio purum eius quod est generosius miscendum, secundum



do & tertio usu augendum, si successerit: ut in diurno capitis dolore ab intemperie calida, cum spiritu flatuoso, in primo transgressu ad calida polygonium cum pauca ruta vel serpillio miscendum.

Plethorico corpore in arthritide sanguis primum mittatur, mox deinde fiat purgatio. Ex successu remedij loco affecto prius ad moti vel etiam sumpti cōiecta an eodē sit, perseverandum, vel ad aliud transeundum consilio Hippocratis, Aph. 52. lib. 2.

Quæ sunt polychresta: id est, multi usus *Lib. 3. cō.*  
feu multis simul partium aliquarum, ut au- *ph. part.*  
rium dispositionibus accommodata medica-  
menta, neque multum opitulantur, neque  
obsunt, si perpetuo ipsis utamur.

Quæ verò uni tantum dispositioni con-  
veniunt, illam optimè curant, alias inter-  
dum præterquàm quòd nihil iuvant, etiam  
exacuant.

Medicamenta media omnibus partis di- *Lib. 4. cō.*  
positionibus conveniunt, tamen his quæ *ph. par.*  
leviora aut valentiora requirunt, neque bo-  
num neque malum magnum afferunt.

Ob id polychrestum, id est ad multas dis-  
positiones utile medicamentum nullum  
potest optimum inveniri, sed quòd singulis  
est proprium, id melius est.

Polychresti autem compositio utilis est *Lib. 8. cō.*  
*ph. part.*



ei, qui vnum medicamentum ad multos affectus mediocriter idoneū habere cupit.

*Lib. 4. cō.  
ph. par.  
initio.*

Partibus laborātibus vt capiti, oculis topica ne adhibeas, nisi vacuato prius toto corpore per phlebotomē, purgationem. In oculis autem etiam caput prius per apophlegmatismos vacuandum est, errhina enim ad oculos trahunt. Quod si emplastica oculis prius adhibes, vehementem excitant dolorem, dum fluentem materiā extra vasa vacuari prohibent, ob idque tunicæ horum distenduntur ob copiam affluentium humorum, & nonnunquam rumpuntur vel eroduntur. Nec solum his vacuationibus oculum, vel aliam parti idoneam ad curandum reddimus, sed etiā reuulsionibus, vt in oculo primum ad inferiora corporis: deinde ad occiput & cutim capitis: interdum & in his arterias incidimus transuersas post aures. Post hæc genitam in tunicis oculorum dispositionem curamus, quæ etiam bonum sanguinem affluentem per venas in oculum corrumpit. Curamus autem per deficcantia sine morfu humorem in oculo noxium, qui quod influit corrūpit. Astringentia autem nec ficcant eiusmodi dispositionem, & mordacis saniei effluxum cohibent: acria verò & mordacia succorū qualitatem augēt: laxantia & digerētia vacuāt qui

*Lib. 4. cō.  
ph. part.*



quidem hanc saniem, vlcus autem cicatrice non tegunt, nec affluxum reprimunt, vt nec coquētia thus, crocus, myrrha, quamuis dispositiones coquere non mediocre bonum est. Acida & amara rodunt, & tales dispositiones exacuunt, & his magis nitrosa, falsa, austera: sola igitur medicamēta rosionis expertia sanant vlcus cum acri fluxione, longiore temporis spatio vitiosum affectæ partis humorem consumentia: vt collyrium libianum, quod Paulo libanium dicitur, cygnus à colore albo, ex multa cerusa Rhodiana, terra Samia, amylo.

Per tempora morborum varia dantur remedia, vt per initia phlegmones, & vehementes influxus austeriora, per statū dolēte multum phlegmone mitigatoria, laxantia, coquētia. Quod si aliquid phlegmones reliquum durefcens & solutu contumax euaserit, à repellentibus ad digerētia paulatim est transeundum. Si verò habes medicamentum vnum excellens, vim eius exolue misto alio: si imbecillum, intende. *Lib. 6. cō. ph. part.*

Oleū lētiscinum recens in vase duplici est reperfaciēdum, ad sedandum dolorē phlegmonarum in gingiuis, tunica linguæ, cute totius: quia citra molestiam & asperitatem repellit, quam habēt plurima austera, & citra rosionem discutit.



*Lib. 1. cō.* *ph. part.* *locus va-* *riis.* *Ibidem.* Assidua fiat rasura in alopecia ante medicamenti impositionem. Rasa cutis nitro tergitur ante digerentium applicationem, postea cutis derafa fricatur linteo subaspero, aut foliis fici, ut per rarefactam eam ad radices imas pilorum melius penetrēt medicamenta humorem prauum digerentia. Medicamentum in alopecia metasyncriticum, id est, ex alto euocans, admoue in aëre calido, & si potes in sole æstiuo: hyeme autem in laconico.

*Lib. 2. cō.* *ph. par.* *in fine.* Ceratum Gal. *δι'υπογαστριου* in hemicrania frigida veteri, aut ischiade frigida ante balneum semel illitum statim affectui medetur, sic ut ager sanus post balneum omnino euadat.

*Li. 8. met.* Capiti ab æstu immodicè calenti ( vnde febris diaria nasci solet ) rosaceum niue refrigeratum ex alto per hapsum lane impingitur.

*Lib. 2. cō.* *ph. par.* In dolorificis capitis dispositionibus calidis aut frigidis sed diuturnis remedia adhibentur idonea, emplastri vel cerati modo confecta, capiti derafo: liquida verò eadē tōso ad cutim, seu breuissimos habenti capillos.

*Lib. 3. cō.* *ph. part.* In dolore aurium ex inflammatione vehementissimo, opium æquali portione castorij multò ante vsum miscendum est, ut vis eius frangatur: ambòque. sapa ex musto sunt disso



dissoluenda, quia dolores magis lenit, quam vinum dulce.

Si quid auribus infundendum est supinis, liquore idoneo resoluatur in consistentiam, quæ per auricularem clysterem immitti possit, ut trochiscus ex opio & castorio cum sapa coactus, sapa dissoluatur. Castorium per se bene tritum cum opio in sapa dissoluto misce, & fac pastillos, quos tempore usus sapa resolue ad eam consistentiam, quæ per otēchyten, id est, auricularium clysterem in aures phlegmone detētas possit infundi, vel potius specillum lana mollissima inuolutum liquore prædictomersum in aurē dolētē blādē immisillum eas foueat, & liquorem sensim demittat, & cetera. Quæcūq; applicatur auribus & oculis, ut lac muliebre, albumina ouorum, mediocriter calfacta esse oportet.

*Ibidem  
initio.*

*Lib. 3. cō.  
ph. par.*

*Initio lib.  
3. c. ph. p.*

Pastillus & collyrium diaglaucium & diacrocū ex aceto in core medica læuigatis & calfactis auri infundendus est.

In vlcere aurium glaucium ex aceto infundendum: si verò cum fluxione sit, aut pure, pastillus primū Polyidæ, post hūc Andronis, deinde Bitbinus. Cui similis est, aut etiam melior pastillus Galen. diachartu, ut à leuioribus incipiamus.

Ad dolorē dentiū remedia in aurē lateris nunc dolentis, nunc oppositam infundit

*Libr. 5. c.  
pha. par.*



Archigenes. Auris initio prius tergenda, ne pinguedinē habeat, quā infundas medicamentia narcotica, referantia, coquentia laxantia, digerentia.

Quæ auribus instillatur, mellis aut mellis tenuis habeant spissitudinem, siue ex sapâ, siue ex aceto, melle, vino Cretensi, mulso, lacte muliebri, albuminibus, sanie expressa ex carne bubula parum super prunas assata Asclepiadi, succo perdicij, marrubij, conizæ, cæpæ, porri, spondilij infundantur. tepida autem sunt infundenda.

*Lib. 3. cō.  
ph. part.  
Ibidem.*

In nares etiam pulvis continenter potest inspirari polypo vel ozæne idoneus, quia perpetuo humorum affluxu eluitur, quomodò & in lippientibus oculis.

Linamenta & spongiæ, & alia quæ naribus sanguine fluentibus immittuntur, lino per acum dato deliga, vt retrahi possit.

*Lib. 4. c.  
ph. par.*

In quibus oculorum collyriis astringentia præpollent, copiosissimo liquore opus est, paucissimo medicamento astringente, præsertim si id astringens est metallicum.

In quibus verò collyriis eorundem crocus, myrrha, castorium, thus, lycium superant, crassiore medicamento vtendum est.

Quæ moderatè influxus in oculum repellunt, ocularibus remediis indita iuuant: quæ verò vehementer repellunt, dolorem  
aug



augment, tunicas exasperando magis quàm influentium impetum reprimunt. Vtilissima igitur lippitudinibus & aliis omnibus in oculum defluxionibus, vlceribus, pustulis, quæ modicè astringunt, vt rosarum folia, flores, succus, ericæ fructus, spica nardi, crocus, lycium, hypocisthis. Eadem medicamentis visum acuentibus mista contrahendo & constringendo oculorum substantiam iuuant.

Collyria oculorum in cotibus nonnulli rerunt, ex mammis lac boni succi instillantes, vel liquorem tenuem oui, vel si vlcus est decoctum fœnigræci: id enim nonnihil terget, liquor oui nihil, lactis serosi pars magis, sed cum morfu, ob id noxia. Nam quæ vlcera replent, tergent sine morfu.

Quæ oculis adhibentur, exactè trita esse *Libro 3.* oportet, & horum quædam inuersa palpebra specilli parte lata illinuntur. *metho.*

Oculi inflàmati foueantur decocto meliloti & fœnigræci ex spōgia semel aut bis *Libr. 4. c.* in die, si parum dolent: si multum, ter, quater, præsertim longis diebus æstiuis. *pha. part.* Quædam horis omnibus adhiberi possunt, vt xerocollyrium Galeni.

Phlegmonæ oculi albumen oui crassum & lentum sine morfu est anodynum, & diu *Initio lib.* adhæret. Si in ictero oculi manent palli- *9. c. ph. p.*



di reliquo corpore perfanato, trahere in balneo naribus cochlear vnum aceti acerrimi, & multum biliosæ substantiæ defluet. Quia ex naribus, gutture, gula facile medicamenta ab humoribus per has partes descendentibus ex cerebro vel aliunde eluuntur, continuè sunt applicanda collyria liquida, vel sicca stomatica, vel stomachica, vel arteriaca, siue ozanas, siue polypus, siue vlcera narium, vel etiam alios dictarum partium affectus curas.

*Lib. 5. cō.  
pha. p.*

Datis apophlegmatismis vel à dente trahentibus medicamentis, ore hiet æger, & deorsum spectet, vt post medicamenti vsum humor facile defluat.

*Initio lib.  
7. c. ph. p.*

Si affectus est in aspera arteria, vel musculis laryngis, vt lassitudo motoria phlegmonodes ex vociferatione, siue sumuntur cibi, vt lac, amyllum, chondrum, oua: siue arteriacæ & hypoglottides eiusdem cum arteriacis facultatis, vt ex vino thereo, gummi, tragacantha, glycyrrhiza, lenta sint & emplastica, vt partibus quas attigerint, hæreant, asperitates læuigent, reliquias inflammationis coquant & perfanent: tuncque medicamenta lingue subdita dum paulatim liquefcunt, larynx quod in eam defluit, excipiat, æger autem oborienti rufsi resistat, & se contineat, vt medicamenti aliquid in laryngem & arteriam deflu



defluat. Eclegmata quoq; vt decoctum hyssopi, ireos, ficuum, nucleorum pineorum sorbemus, vt cum inspirato aëre etiam portio decocti in asperam arteriam trahatur, aut id calidum quantitate parua dum faucibus continemus semisupini, aliquoties inspiramus, aut paulatim deglutimus saluæ mista.

Stomaticis tribus modis vtendum est in laxata vna: primo cum aqua præsertim per initia, vel cum mulla, vel cum chylo, & cremore prissanæ. Secundo modo medicamentum stomaticum purum, vel digiris vuæ illinendum est, vel cochleari attingendū & apprimendum. Tertio vuam foras ad linguam educendo, id quod maximè confert, vt abscedat à rectitudine, quā vt plurimum ad fauces habet.

In affectibus partium oris, vt inflammata aut laxata columella Asclepiades per fistulā expirat, & flūdo expellit medicamenta in partem affectam, aut inspirari iubet. Quod meritò damnat Galenus, nam bona ipsorum portio in gulam & asperam arteriam delabitur. Præstat igitur siccis columellam ex cochleario attingere.

Si vlcera sordida in ore puerorum tãgis medicamento valente, specillo lana inuoluta in medicamentum intincto tangatur  
pars

*Lib. 6. cõ.  
pha. part.*



*Libr. 4.  
metho.*

pars, ita tamen figurato puero, ut non deuo-  
ret: post collue decocto lentis aut rosarum  
mellito: ut in vlcere intestinorum crassorū  
clystere iniiciuntur medicamenta ei vlceri  
idonea: in vlcere ventriculi bibuntur: in vl-  
cere tenuium, vtrinque dantur: in vlcere gu-  
læ non semel, nec totum simul sumendum,  
sed paulatim & assidue. Nam ex transitu &  
contactu his vlceribus vtilitas accedit, non  
ex continendo & diutius adhærendo, ut vē-  
triculi vlceribus: tamē crassiora & glutino-  
sa ex gulæ figura & situ facere ea didicimus:  
hæc enim cibi & potus est transitus: ob id  
medicamentis æger, quæ hæreant, vndique  
quasi concrecant & agglutinentur, non  
eluantur & defluāt promptè. Crassa autem  
promptè concrecant, lentè agglutinantur,  
ob id his tragacātha & gummi miscentur.

*Ibidem.*

Vlceribus gulæ & cæteris internis adhi-  
bentur hypocisthis, malicorium, balaustiū,  
cytinus, acacia, succus rhus & rosarum, aster  
famius, sigillum lemnium, & cætera vlcus  
interdum sanantia, & nullam noxam infe-  
rentia visceribus. Dantur autem ex decocto  
summitatum rubi, myrti, vitis, lentiscī, ma-  
li cydoniorū, vel vino austero, si phlegmo-  
ne absit. quæ si vlceribus gulæ applicas,  
gummi misce, & tragacantham.

Purgantia damus nunc potione, cū ce-  
lerio



leriore & parciore vacuatione opus est, aut cum in alios meatus facienda est vacuatio, ut mox in hieræ exemplo audies: nunc bolo, ut vocamus, cum diutius ventriculo immorari medicamentum volumus, ut minus sit vomitorium quibusdam, vel à longinquis plus attrahat: aut catapotiis, cum diutissima in ventriculo mora opus est. Alia item forma aliis multis de causis damus, ut in compositis patebit, & ante hæc ac post, vino vel alio liquore grato os abluimus, vel anisum conditum, vel rhodofacchar, vel simile sumimus, & illa tegimus umbra, vase denso, foliis auri, carne & cute fructuum coctorum, pane azymo: siphone etiam prælongo fauces attingente quidam sic deglutiunt, ut linguam saporum indicem nec attingant, nec afficiant.

Sic hieræ picræ drach. vna Asclepiadi vel Galeno cū aquæ cyathis quatuor sine melle, quia stomachum euertit, datur tardè coquētibus, aut vomentibus, aut aliter fluente vētriculo afflictis, & cum declināt phlegmonæ internæ aut cum vis mouere vrinā vel mēses cū hydromelite, aut potiùs cum vino, aut potiùs cum œnomelite. Sic enim ex ventriculo eius distributionem iuuabis & delationem ad vrinas, & quæ vtero inhærēt, dissolues & incides, & robur addes partib



*Lib. 8. cō.  
pha. par.  
Abidem.*

tibus, per quas trāsitur, & calorem partium per quas fertur augebis: qui etiam multum confert ad fundēdum & vacuandū humores inhaerentes. Ex quibus apparet magnū interesse, quae medicamenta cū quibus sumantur vel admoueātur. Ob id in vfu asteris stomachici liquorem dispositioni cōuenientem requirit Asclepiades. Asterē egregiū in cephalalgia fronti idem illinit cum aceto: ad aurium verò dolores perdicij succo diluit: ad sanguinis eruptionem, cum vino myrteo: ad sanguinis screatū, dysenteriam, choleram, cū succo Polygonij: ad tussēs, cum vino Thereo aut passio: ad phthises & empyemata, cum succo marrubij: ad serpentis ictum, cum rutae decocto: ad menses, cum succo arthemisiae: ad stranguriam & vuluae strangulatum, cum mulso: ad arthritidas, cum decocto gentianae.

Sic emplastrum diachalciteos ex contrariis compositum, vt in cōpositis audies, vlceribus glutinandis & cicatrice tegendis, & phlegmonis curādis accommodū redditur, aliter atq; aliter factum & liquatū. Si enim phlegmone magnum parti dolorem affert, oleum & adeps recentia sint magis blanda & mitia: eadem vetusta minū dolenti & diuturnae phlegmonae conueniunt: haecque quō diuturnior & contumacior, hoc magis  
vete



vetera illa profunt & sola curāt, modò amplius nihil affecta parti affluat: si quid verò affluit, compositum diachalciteos conuenit mista facultate præditum digerente quod influxit, & repellere quod influit: paucæ verò phlegmonæ sunt diuturnæ, quibus nihil affluat, cum diuturnæ esse soleant ob affluentes in ipsas humores. Cum autē phlegmonæ incipiunt, & augentur, refrigerantium & astringentium virtus præpolleat, emplastrum igitur tunc soluitur vino vel aceto, vel aqua, vel oleo crudo, vel Hispano, vel Histrico, vel, si validius erit astringendum, myrteo & melino, vel dulci aliquo, ut sit anodynum.

Phlegmonarum in artubus initio spongia imponitur ex aqua frigida, vel ex oxycrato: phlegmonis autem hepatis calida applicanda, melinū, myrteum, mastichinum, nardinum, lentiscinum, absinthites, & cataplasma item calidum. *Libr. 13. metho.*

Phlegmonæ irritatur à duris, qualia sunt multa emplastra: nisi hæc oleo vel alio simili molliantur. *Ibidem.*

Quāuis astringentiā etiā sola phlegmonas initio iuuent, id quod influit repellēdo, & etiam interdum aliqui humoris in parte inflammata contenti exprimendo ad venas particulam nutrientes, tamen quod va- *Libr. 5. c. 6. ph. p.*  
leat



lentius astringit, tātū abest vt phlegmonas iuuet, vt etiam dolorē partibus inflammatis intendat eas velut contundendo, & substantiam earum violenter contrahendo: sic valenter digerentia sua acrimonia quid erosioni simile in parte excitant. Quæ verò modicè digerūt, augmento phlegmonarum & statui conueniunt, dolorémq; leniunt: moderatum igitur vtrunque est præstātius quàm immoderatum. Tamē si dētes dolent citra gingiuarum phlegmonen, siue in ipso corpore dentis, siue neruo sit causa doloris humor aut flatulentus spiritus, medicamētis acerrimis opus est, siue repellere, siue digerere causam doloris libet. Ob id plurima ipsorū ex aceto acerrimo parātur.

*Libr. 10.  
metho.  
Ibidem.*

Ceratum Galeni refrigerans nō maneat super ægram partem, donec manifestē inca leat, sed assiduè subinde mutandum: imponendum autem parti primò affectæ & refrigeratione egenti, vt cordi, hepatis, renibus, non autem toti thoraci propter cor, nec toti ventri inferiori propter hepar vel lienem vel ventriculum, ne partes refrigerationem non postulant, tamen refrigeratæ cogant te ante tēpus à refrigeratione partis primò affectæ cessare.

*Li. 11. metho. & c.  
21. libr. 5.  
simpl.*

Ad vētriculi & hepatis robur absinthiiū ponticum oleo incoctum est salubre, nisi à calor



calore & siccitate laborent, quia qualitas absinthij amara præit, & viam astringenti facit.

Contra morbum, qui generosè ex arte *Li. II. me* pugnat, terminus ei fit, vt tutò medicetur: ei *thod.* verò, qui dolorem mitigat, virium totius aut partis custodia terminus est, cùm vtendum est narcoticis, præcipuè in calido corpore & affectu: nam in crassis & glutinosis succis alienissima sunt narcotica. Oleum quia tædium affert, post actionem ab eo editam tergendum, lib. 8. in diariæ à stipatione, curatione in bilioso homine.

Oleum phlegmonis oculorum vel oris *Li. 12. me* non infunditur: infunditur rosaceum etiam *thod.* cum aceto phlegmonis incipientibus aurium non oculorum. Contra diæmorum & stomatica alia oris phlegmonis incipientibus *Li. 13. me* conueniunt, nō aurium vel oculorū, quan- *thod.* tūm genere sint ex his quæ indicantur.

Fomēta & penicilli, & alia id genus ven- *Lib. 8. me* triculo & stomacho abundè calētia impo- *thod.* nantur: nam tepida vētriculi firmitudinem dissoluunt.

Neruis vulneratis aqua calida est inimi- *Lib. 6. me* cissima, cùm præsertim eorū substātia ex re- *thod.* frigerata concretaq; humidiorē materia sit condita: omnis enim talis cōstitutio per ea quæ simul calfaciunt & humectant, resol-

H



uitur ac putrescit.

*Lib. 8. method.*

Vnguenta vt nardinum ad roborandum fomento ventriculum & stomachum, soleo calfacere in vase duplici utiq; cōiecta prius in vas maius aqua feruente: nam aliter calfactis vitiatur eorum facultas.

*Lib. 9. cōph. part.*

Vteri, & vesicæ vlcera iisdē medicamētis siccantibus egētia, requirūt prēterea instrumenta quæ intrò ea liquore aliquo soluta transmittant, vt crocum, myrrham cū succo plantaginis vel simili mistū: siphonibus, aut catheteris, aut metrenchytis infundimus.

*Lib. 1. cōph. gene.*

Vlceribus quæ ad cicatricē veniunt, multis consequenter diebus pharmacum epuloticum immanere debet, quò melius & citius ita cicatrix ducatur. Ob id medicamentum ex aqua & oleo copiosiore & lithargyro coctum donec liquetur & alteretur: tam sit glutinosum, vt ne à lotis quidem decidat. Vtile autem est epuloticum teneris corporibus, pueris, mulieribus, grādioribus, cute cādida mollē corporis habitum testante præditis, si vlcera habent parua sed praua, & dysepulota ob vitiosum ipsorum succum.

*Lib. 2. cōph. gen.*

Sinibus implendis emplastrum diachalciteos, vel aliud idoneum oleo largo solutum, per cornu rectā perforatum cum vesica porcina clysteris modo infundendum. Ex rosaceo autem solvatur, si parux phlegmones



mones suspicio adhuc adsit: si paulò latius est foramen sinus, clystere infundendum, utendūque piulcis, id est, pus attrahentibus instrumentis, quales sunt nostrę clysterum syringes. Quę enim sunt substantia crassiore, ut emmota, infundi sinibus nequeunt. Contrà in superficie caua vlcera *Ibidem.* crassioribus egent medicamētis, quòd liquida statim defluunt, & linamentum siccum relinquunt. Ob id in iis ceratis validè tergentia miscētur in sinibus oleo, ut dixi, largiore soluantur.

In sinibus item & fistulis splenium ex- *Ibidem.* scinde, ut excernendo humori liber sit exitus: hic enim mora in parte eam exedit, & vim medicamenti obtundit. Eadem causa cannulatas turundas, hoc est, pertusas, ex solidiore aliqua materia penna, plumbo, argento, auro, iisdem immittimus, ut puris emissarium perpetuò sit liberum. Vbi *Li. 13. method.* vlcus erit penitus repletum & planum & æquale, nec quicquam illi cauum manebit, ipsis vlceris oris specilli mucrone imponendum siccum epuloticum medicamentum: super reliquum linamento dato, quod imbutum sit aliquo medicamento confidentia humido ex his quę cicatricem inducunt.

Eodē pertinentia exēpla perquàm pluri-



ma potest proferre, qui vult ex libr. 3. 4. 5. 6. Methodi, vt exempla rectè vtendi medicamentis intemperaturas curantibus, & morbos partium organicarū proprios ex libris aliis Methodi, & lib. compo. ph. part. & gen.

*Lib. 10. c.  
ph. par.  
& alibi.*

Repellentibus initio chiragræ & podagræ vt aliorum affectuum à fluxione pendendum vtimur: ischiadis autem initio vt pleuritidis mitigatoriis non repellentibus, quia sanguinē ex vasis ambientibus & muscularis in ischion & thoracis partē affectam protruderent.

*Lib. 9. cō.  
ph. part.*

Ambientis temperatura rectiorem quorundam medicamentorum vsum facit, ob id prius alopeciiis medicamenta docuimus adhibenda in aëre calido, vt sub sole æstiuo, vel hyeme in laconico. Item in ictero oculorum acetum in balneo naribus trahendū, & psilothra in balneo tentanda. Quæ res magni est momenti, vt apertis à calore poris, humores ab eodem liquati promptè trahantur.

Emplastrum liquidum ex farina fœnugræci, sinapi, māna thuris, myrobalanu pyefmate, spuma nitri, oleo cedrino decocto, applicatur lieni scirrhuso, quandiu id pati potest: deinde in balnei solium ducto homine fascia in aqua soluitur.

*Ibidem.*

Malagma ex fœnugræco, calce viua, nitro,



tro, melle impositum lieni scirrhuso aut ischiadi, donec mordeat, si tunc ductis in balneum auferatur (alioqui ægrescerent) sani balneo exeunt. Archigenes apud Galenum.


Herbæ iberidis (quam nonnulli lepidū vocant, alij nasturtium sylvestre) radicem tusam adipe suo excipe, emollitā emplastri modo applica ischio ad horas tres, deinde ī balneū dimitte. Eadē etiā vetustos capitis dolores liberat vice sinapismi & thapsiæ.

Si in ictero oculi manent pallidi reliquo corpore per sanato, trahere in balneo naribus cochlear vnum aceti acerrimi, & multum biliosæ substantiæ defluet. *Lib. 9. cō. ph. part.*

Medicamentū in alopecia metasyncriticum, id est, ex alto euocans, admoue in aëre calido, & si potes, in sole æstiuo: hyeme autem in laconico, id est, prima domus parte, quam stuphas vulgò vocamus. *Initio lib. 1. cō. ph. p.*

Ceratū Gal. dia euphorbiū in hemicrania frigida veteri, aut ischiade frigida ante balneū semel illitū, statim affectui medetur, sic ut æger post balneū sanus omnino euadat. *Lib. 2. cō. ph. part.*

**D E L I M I T A T I O N I B V S A D**  
*rectum medicamentorum & aliarum*  
*causarum salubrium vsum*  
*necessariis.*

 *Ἰσχυρὸς* Latinis distinctio, limitatio, determinatio est, definitio ac declaratio.



*Libr. 1. cō.  
ph. part.*

tio facultatis remedium, cui affectui differentia, à qua causa, in qua natura, quo aëre idoneorunt: citra quas cum quid absolute pronunciat Galenus, ad naturam temperatam in aëre temperato referri vult: ut cum scribis remedia ad achoras, id est, tineam, vel alios affectus, adscribe ad quales & quantos, & quo affectu tempore illa sint salubria. Si vino quoque intus aut foris utendum erit, ad rem mergendam vel diluendam, quale velis distingue. Nam multae eius differentiae facultatibus etiam contrariae, quamvis interdum ex scopo medicamenti potes vini genus inuenire, ut austerum, si astringendum: acre, si digerendum: sic in ceteris differentibus, aut virtutes contrarias habentibus, observa quem scopum medicamenti compositio habeat, ut scripta absolute & sine limitatione distinguas. Et in reliquis remediis similiter.

Porro limitationes ad recte utendum medicamenti non mediocriter conducunt: neque sunt recipiendi, qui medicamento-ram usus citra distinctiones scripserunt, dicentes: ad dolorem idoneum est hoc medicamentum, non addentes, à qua dispositione & causa ortum dolorem intelligant.

Rectius hi qui dispositionem, doloris causam exposuerunt, ratione nixi: vel etiam experientia, quae signa euidenter apparentia se-  
qui



quitur: qualia in oculo dolente fuerint affluens sanguis largus, paucus: rodens, rosionis expers: rubor maior, minor. Venæ plenæ sanguine multo, paucò, sed vaporoso.

Phlegmone oculi tumor, maior, minor.

Color eius præter naturam varius. Lipitudo in angulis oculi crassior, tenuior: largior, parciore, seu maior, minor. Dolor & doloris species ab ægro nobis declarata, tēsius, rodens, pulsatorius, cōprimens, & contrahens, & quassans, & contundens.

Non manifestè verò apparet, an internis vel externis cranij partibus fluxio fiat, multò minius an per venas, vel per arterias: ob id distinctiones ab his sumptæ parum sunt efficaces. Specta igitur differentias dispositionum dolorem excitantium, secundum quas scribendæ sunt tibi distinctiones, ut libro 13. Methodi in oculorum affectibus à Galeno scribuntur. Ad frigidas & pituitosas dispositiones, si albæ sint: ad melancholicas, si liuent, & melancholici humoris malitiam prodant: ad calidas, & igneas dispositiones inflammatorias quidem, si rubent: erysipelatodes verò, si flauent: ad dolorem mediocrem, vehemētem, tendentem, grauantem, pungentem, pulsanter. Ad vlcera simplicia, caua, plana, sordida, sinuosa, pascentia, phagadenica, chironia,



Telephia, cacoërthea, dysepulotica, cū phlegmone, cum erysipelate, vel sine his.

Ad aphthas albas, nigras, depascentes, citra depastionem, depascere incipiētes, & ob id multam saliuam reddentes.

*Lib. 6. cō. ph. parti.* Ad affectum quenuis incipientem, auge-  
scentem, vigentem, declinantem, exiguum,  
simplicem, mitem, magnum, mediocrem, a-  
liis complexum, malignum, putrem.

*Initio lib. 2. cō. ph. p.* Qui cephalalgiae remedia citra distin-  
ctionem scripserunt, plus noxae quā com-  
modi attulerunt his, qui fidē ipsis adhibue-  
runt. Cephalalgia enim omnibus non acci-  
dit ob vnam corporis dispositionem, sed ob  
plures causas, quibus singulis propria est cu-  
ratio. Aliae etiā distinctiones ex particula-  
rum affectarum natura sumuntur: aliquan-  
do enim extra cranium, aliquando intra, ali-  
quando utrobique causa doloris est, aliquan-  
do in venis, vel arteriis, vel nervis, vel mē-  
branis, vel cerebro, vel cute, vel quibusdam  
horum, vel omnibus simul. Difficillimum  
igitur est locum affectum in his inuenire,  
nisi Medicus sit doctus, & multa ægrorum  
inspectione exercitus.

Species igitur affectus est explicanda, cui  
utile auxilium dicimus, siue ea sit morbus,  
siue morbi causa, siue symptoma, & in ho-  
rum trium singulis specialissimū est expli-  
candum,



candum, vt ad febres, biliofas, melancholicas, pituitofas, & à qua bilis alterutrius, aut pituitæ specie sint. Ad diariam à tali vel tali causa externa, nisi remedia sint omnibus diariis communia, vt balneum aquæ dulcis in declinatione. Ad febres easdem clementes, recentes, vel malignas veteratas. Ad phlegmones principium, augmentum, statum, declinationem, in hoc vel illo corpore, in tali parte.

In infantibus, adultis, senibus alia atq; alia vsurpanda sunt medicamenta, vt etiam reliqua auxilia. In pueris item, mulieribus, eunuchis, & cæteris molli carne præditis: vel contrà in agricolis, fossoribus, nautis, baiulis, & cæteris duræ carnis hominibus hoc, illud vtendum adscribas, quod ab ætate, temperamenti ratione, & virium, & à corporis habitu diuersæ sumuntur indicationes limitationibus exprimendæ.

Frequenter vnica sufficit limitatio, vt à *Lib. 3. cõ.* tẽpore, vt ad incipientes alopecias: sæpe non *ph. part.* sufficit, vt butyrum benefacit parotidibus incipientibus: addendum enim est mitioribus, modicè dolorificis, paruum abscessum facientibus. His enim sufficit butyrum, præsertim in molli corpore, vt pueri, eunuchi, mulieris, & reliquorum molli carne præditorum: nõ sufficit autem vehementioribus

H 5



cum dolore magno & pulsatorio, & cum vigiliis, & cum magno abscessu.

Distinctio etiam fuerit sufficiens, si dicas remedium ad capitis dolorē à tali vel tali causa vel affectu, & sine febre, vel cū febre. Item ad achoras incipientes, sine malignis corporis totius humoribus, aut saltem sine his copiosis, vel ad inueteratos cum copia humorum prauorum.

Quidam suis medicamentis limitationes adscripserūt, sed generales tantum, aut si particulares, non integras, & in quibus multas adhuc requiras: ut qui scripserūt remedia cū his titulis, ad auriū affectus, ad aurium dolores, ad vocem abscissam: & adhuc alij generalius, ad vocē læsam non significantes quā offensa, & à qua dispositiōe seu causa læsam vel abscissam vocem intelligāt: cum tamen quævis causa, & ab ea dispositio in corpore relicta, remediū flagitet sibi proprium. Scribendum ergo fuit ad aurium dolorem, grauem, pulsatorium, &c. à tali vel tali causa.

*Initio lib.*

*3. cō. ph. p.*

Ad stomachicos Andromachi & hieræ limitatio est, sed confusa nimis: quia cū stomachicorum significatio latè pateat, nō addūt ad quos stomachicos sua remedia velint efficacia: ob id ea quibusdam profunt, quibusdam nocent plurimum, ut cætera indistinctè scripta.

Est



Est tamen quādo promptissimū est cuius  
in simpliciu facultatib<sup>us</sup> versato, & affectuū  
naturas callēti, dicere vim medicamenti ali  
cuius compositi, etiā si eam titulo nō expri  
mat, & inuenire qualenā ex his vel illis indi  
stinctē scriptis qui partis huius dispositioni,  
& quali & quātā idoneū fuerit præsidium,  
& quo tēpore: quæ qui ignorat, maximam  
sæpe noxā ex usu indistinctē scriptorum in  
fert. Quia tamē id discernere nō omnes pos  
sunt, neq; in omnibus possunt, commendā  
di maximē sunt, qui limitationes integras  
medicamenti nō solum generales, sed etiā  
particulares maximē adscripserunt. Inter  
quos primas iure meretur Herophilus per  
petuò iubēs, vt Medicus sciat, quæ, qualis, &  
quāta sit morbi causa, & quod cuiq; potissi  
mū sit remedium, vt singulis congruā cura  
tionē moliatur, lib. 3. cōp. ph. part. Non sunt  
recipiēdi, qui diminutē scripserūt, multò mi  
nūs qui absoluto sermone sine limitatione  
scripserūt, vt ad vlceratā arteriā, vel asperatā  
vel vocē abscissā aut raucā. Multæ enim pos  
sunt esse causæ vocis abscissæ vel rauæ, vt  
destillatio vet<sup>us</sup> à capite, empyema, tabes, vo  
ciferatio multa, īspiratus aēr frigidus, potus  
frigidior, raucitatis sunt causæ. Qualia pluri  
ma ī li. Archigenis, Herē, inuenias: & quod  
mireris ī li. Apollonij Herophilei, cū tamē  
Herop



Herophilus omnium maximè distinctiones cōmendarit: Appollonius autē eas alicubi sequitur, est vbi malè negligit, vt ad auriū dolorē cum scripsisset remedia, subiecit calida, frigida, humida, sicca, & omnibus propè secūdis qualitatibus diuersa, libr. 3. comp. phar. part. Debit enim diffinire, cui auriū dolori, & à qua causa singula remedia sua sint vtilia. Sic enim scriptis indistinctè qui fidem adhibent, non mediocriter decepti ægros plerunque offendunt. Ex quibus apparet, parum probandam medicamenti compositionem, nisi dispositio indicetur, in qua eo medicamento sit vtendum.

*Lib. 7. cō.  
ph. par.*

*Lib. 4. cō.  
ph. p.*

Sed ne fallare, omnibus citra iudiciū ne credideris. Nam multa medicamēta titulo magna promittunt, opus autem eorum interim nullū est, interim valde exiguum apparet, vt ad suffusiones disterendas myrrha, stacte, & collyriū ex felle scari piscis, inuailida enim deprehendes. Expende igitur vires simplicium, & totius, & quid affectus huius, hæc illa differētia, ab hac vel alia causa procedens, in hac corporis natura, ætate, cōsuetudine, in hoc aëris statu pati ab hoc remedio queat: tum demum te in consilium adhibe, & si potes, peritos, an tali remedio sint vsi, & in quo affectu, & corpore, & in quo successu.

Sine



Sine periculo non imitamus eos, qui in- *Lib. 3. cō.*  
 distincta scribunt remedia, nam pro varia *ph. part.*  
 causa sunt mutanda, ut aurium dolori à fri-  
 gore, statim medentur calorifica. Eadem ta-  
 men dolorē capitis pulsatorium ab inflam-  
 matione aut acrimonia mordaci exacer-  
 bant: quanquàm ea ipsa inflānationes me-  
 diocres & non pulsantes sanant, ut acetum  
 mistum rosaceo exactè & calfactum. Archi-  
 genem reprehendit lib. 5. compos. phar. par.  
 quòd absinthium, hyssopum, origanum ad  
 suggillata scripserit admouenda, nec addi-  
 dit, coctāne an cruda vellet adhiberi. Ad-  
 hæc quòd voluit illa applicari aut seorsum,  
 aut cum melle, aut cum aceto, aut cū aqua,  
 perinde ac si hæc viribus essent similia, aut  
 proxima cum aqua, nec cutim nec vlcera  
 mordeat, acetum ambo mordeat, mel so-  
 lum vlcera.

Malè item Appollonio apud Galenū scri-  
 bitur, lithargyros cū oleo laurino vel albo,  
 id est, communi, quod malè ceu simile lau-  
 rino adscribitur, & à laurino ex aduerso di-  
 stinguatur, cū tamē à laurini virtute mul-  
 tū absit. Idem malè loco lithargyri ce-  
 rusa utitur, & mergit eam oleo myrteo, vel  
 laurino, medicamentis multū differenti-  
 bus: nam illud repellit, aptum igitur inci-  
 pientibus: hoc admodū calidum & dige-  
 rens.



rens, vrile est cū humor achoras gignens  
infixus est ac firmatus, vt prædiximus.

Absurda similiter est scriptura, si ad aliquem affectum scribis cataplasma, vel alia remedia viribus diuersa, aut etiam cōtraria: vt si scribis ad affectum aliquem, fiat cataplasma ex blito cum oleo laxigato, vel ex semine melanthij cum oleo ricinino: nam eidem affectui ambo conuenire non possunt, nisi distinguas, vt illud quia imbecilliter refrigerat, humectat phlegmones initio, & affectibus calidis attribuas: hoc quia calfacit, siccatur phlegmones declinationi, & affectibus frigidis magis minus pro vi remedij & natura partis.

Neque solū ad rectum medicamentorum & aliorum remediorum vsum valent hæc limitationes, sed etiam ad rectam medicamentorum compositionem sunt necessaria. ob id si rutā scribis, adde vtrū siccā an viridē velis: illa enim quā hęc multo est calidior & acrior. Quod si indistincte scriptum legis, coniecta ex viribus & scopo in quem affectum potius vtra sit vtenda. Sic serpillum acre & calidum magis quā viride, sic mentha. Ob id malè scribit Archigenes, menthæ viridis aut siccæ, & rosarum viridium aut siccarum, vt malè ad achoras scribunt quidam apud Galenum oleum rosatum

*Lib. 2. cō.  
ph. par.*



satum, vel vrina tauri aut cameli acerrima. Illud enim minima virtute præditum repellendi incipiētibus achoribus auxiliari possit, hæc vrina admodum ealens & digerens utilis est, cum humor achoras gignens ibi est infixus ac firmatus.

Limitationes in compositione requirunt facile ostēdit vinum miscendum, cuius qualitates & tempus sunt adscribenda. Multum enim interest, an acerbum, austerum, acidum, dulce vel acre sit vinum, crassum item an tenue, & album an rubrum vel nigrum, & an oligophorum vel valens & vinosum, & an recens aut vetus. Quod enim calidæ naturæ & vetus digerit, acerbum & austerum repellit. Tamen inveniuntur composita vt simplicia, quæ siue à tota substantia, siue causa alia ignorata ad omnes sunt affectus efficacia, vt hepaticum admirabile Pharnacis herbarij apud Galenum libro 8. composi. pharmac. part. quantæ eius promissa licet Galenus nō reprehendat, falsa tamen mihi videntur. Cum enim aromatum catalogo constet, qui calidos hepatis affectus iuuare possit? Galeni theriace omnes à pestilentia seruat, quæ si corrupti fuerint, omnes euadunt vsu theriaces, qui fuerunt sanabiles: sic quæ à tota substantia agere diximus. Tamen in his etiam quæ



quædã limitationis necessitas videtur, aut  
 cur Aeschrion recens morbis à cane rabido  
 dabat semel in die cochlearium magnum  
 pulueris *ἀπὸ καρχήδων*, iamdiu verò morbis  
 dabat cochlearia duo. Cur item Galenus  
 ad præcautionem mitius remedium suffice-  
 re ait, ad curationem largius & valentius,  
 etiam si id tota sua substantia agit, vt alyf-  
 son in morso à cane rabido. Hæc tamẽ quæ  
 tota sua substantia seu suæ totius substantiæ  
 proprietate vel similitudine vel qualitate,  
 aliquem affectum profligant, hoc est, ele-  
 mentorum 4. mistione simili si trahunt: con-  
 traria: si pellunt, sed vtraque nobis nulla ra-  
 tione, nullaq; coniectura comprehensibili:  
 sola enim experiẽtia, vt antè docui, cogno-  
 scitur diuina illa rerum quarundã proprie-  
 tas nobis indicibilis & incomprehensibilis.

Ex his patet, quantam vim habeat ad ar-  
 tis medicæ constitutionem distinctio medi-  
 camentis ad partium affectus varios in scri-  
 ptis adhibita: contrà autem quãtum noceat  
 confusio & indistincta verborum series,  
 qualis toto propemodũ Dioscoride, Celso.  
 Scribonio, Apuleio, Actuário, Simeone,  
 Psello, Celio, Plinio, & aliis propè infi-  
 nitis, qui medicamẽtorum vel simplicium,  
 vel etiam compositorum facultates descri-  
 bere tentauerunt. Quibus carere fortasse  
 æquius



æquius ac præstantius fuerit, quàm vestigia  
sequi, nisi quis Galeni methodis exercitus  
ex natura affectuū & facultate medicamen-  
ti cognita, facile inueniat, cuius talis affe-  
ctus speciei, & in quo tempore, & an recenti  
aut veterato, & in qua parte, & in quali cor-  
poris habitu, virtute, ætate, consuetudine,  
viribus, sensu tactus, hoc illud medicamen-  
tum tantū, sic sumptum & admodum, cum  
his, post illa, ante illa est idoneum. Verissi-  
mum enim est, quod Galenus usurpare con-  
suevit: Curatio agnitionē & prænotionem  
sequitur. Recte namque is solus curabit, qui  
omnium nunc dictorum vires tanquàm ip-  
sas literas cognoscet, & qui præuideat, qua-  
le & quantum ab his vel ab illis remediis  
effectum proficiscetur, ut si modera-

tius est futurum, prohibeatur: si

inferius quàm opus sit,

intendatur: si pro-

ut rei proposi-

tæ conue-


nit, fina-

tur.

✱

I





DE SIMPLICIVM  
MEDICAMENTORVM  
AD COMPOS-

*tionem prepara-  
tione,*

L I B E R I I I.



MEDICAMENTA compo-  
nēdi methodo à nobis abso-  
luta, compositionis modum,  
exemplāq; varia sed celebra-  
tiora trademus, si prius pauca  
quedam docuerimus, partim prædictis affi-  
nia, partim sequuturis nō vtilia solūm, sed  
etiam necessaria. Ad medicamentorum si-  
quidem delectum (de quo multa libro supe-  
riore diximus) nō minimū pertinet scire  
simplicium verorum & natiuorum signa,  
quibus à nothis & adulteratis probe fecer-  
nātur. Adhæc cū nomen vnum multis est  
simplicibus commune, quod ex his nomine  
simpliciter pronuntiato, intelligendum sit.  
Postremò cū simplex aliquod compo-  
sitioni necessarium desideratur, quò in  
eius loco substituisse liceat. Ad ipsū ve-  
rò compositionis modum felicius obuen-  
dum



dum, necessaria est simplicium quorundam delectorum præparatio per ignem, lotionem, trituram, solutionem *χύλωσις*, id est, ut sic dicam, succationē, muccationē seu mucilaginem, purgationem, & quam vocant, clarificationem, quæ ad purgationē referri potest, uti & colatura, clarificationi necessaria. Cuius præparationis etiam in theriaca meminit Galenus, & alibi passim, præparationūque libros à quibusdam scriptos ait idem lib. 2. simpl. capit. 15. Præter hæc instrumentorum non paucorum, ut ponderum, mensurarum, vasorūq; aliorum elegans, pura, proba supellex ad recte componendum, & composita recondenda est necessaria. De quibus omnibus ubi dixerimus, ad rem nobis propositam aggrediemur.

DE DOLIS, SEV ADULTERIIIS MEDICAMENTORVM.

**M**edicamenta simplicia, præcipuè rara, & ob id pretiosa adulterantur, & falsa pro veris, fictitia pro natiuis supponuntur, idq; multis modis. Nam simplex idē est interdū sed facultare dolo ablata: ut rhabarbarū maceratione dierū quinq; in aqua examinatum, leinde ficcatum, vel alia virtute, sed improbiore addita, ut si idē rhabarbarū.



aqua post maceretur, vel destillata ex tithymallis, vel simplici quidē, sed in quam succus tithymallorum sic dissolutus, aut scammonij. Interdum simplex idem genere est nō specie aut loco, vt libr. i. in cinnamomo & casia diximus: & plurima quoq; docebimus titulo sequenti. Nonnunquā idē est etiam specie & loco, sed vel intempestiua collectione, vel improba ad repositionem præparatione, vel ipsa repositione in loco parum idoneo, vel seruatione diuturniore vitiatum est, quorum tam magna est copia, vt exempla deesse nequeant.

Est frequenter quando simplex pro simplice subicitur, vt pro costo radix enulæ Campanæ, pro acacia, succus prunorum syluestrium. Frequentius pro simplici multa eius ipsius substantiam, magnitudinem, figuram, qualitates denique omnes quoad fieri potest mentita, substituuntur: vt pro galbano colophonia cum farina fabarum purgatarum, & quæ mox plurima leges.

Frequentissimè ambo simul miscentur, portio scilicet simplicis alicuius veri, sed vel ligni sui vel aliorum mistura aucti & conspurcati, quod in myrrha, ladano, opopanace, & aliis propè infinitis, malum euidentissimum est. Huc pertinet, quod verorum simplicium nunc puluere fictitia



fictitia integuntur, ac velut incrustantur, interdum illorum decocto vel infusione macerantur & imbuuntur, ut etiam qualitates ipsorum & substantiam simulent.

Hæc autem simplicium medicamentorum adulteria fieri consueverunt primum & maxime ab his, qui à se ignoranter, animo malo, intempestive collecta in vrbes conuehunt & vendunt: deinde à mercatoribus in regiones alias transferentibus, & postremo ab ipsis rhopopolis ac pharmacopolis. Adeo autem calide nonnulla hi omnes adulterant, sicque veris assimulant, ut etiam exercitatissimis quodoque imponant: id quod ne frequenter accadat, quorundam figmenta partim prius diximus, in multis simplicibus, partim hic dicentur. Quanquam hæc adulteria non publicanda censet Galen. ne pravi homines ubi ea obiter didicerint, opere ipso vitient & corrumpant. Eadem ratione eos accusat, qui lethalium pharmacorum descriptiones inuulgant. Tamen cum vix regio ista aut velit aut possit hæc vitare, non raro autem ab institoribus & interpolatoribus externis fallatur, è republica Gallorum fuerit scire, quibus quædam falsò represententur, & quibus notis deprehendantur: præsertim cum etiam ipse Galenus suam illam sententiam interdum non ita anxie ser-

*Li. i. antid. & li. 9. simp in diphryge.*



uarit, sed quorundam simplicium adulteria in antidotis, & alibi passim leuiter attigerit: licet quorundam aut nulla aut non exacta est discretio, sed eorum & dolose paratorum notæ confunduntur. Quædam contra nullam adulterationem recipiunt, vt agaricum, xylobalsamum, carpobalsamum, pentaphyllum, polium, zingiber.

*Li. i. ant.*

Cum igitur omnium nobis bonorum post Hippocratē author Galenus planè intelligeret, quantā vim habeat ad rectè meddum integritas medicamentorū: vt aliarū materiarum medicarum, sollicitus magnoperè fuit, vt medicamenta singula apud se præstātissima haberet, partim ea quorannis ex omni regione ab amicis fidelibus recipiens, partim ipse in loca ipsa profectus, vt Cyprum, Lemnum, quæ volebat exportans, quantum sibi in vitam reliquam sufficeret.

Vbi verò simplex aliquod præstantissimum nactus erat, identidem explorabat totam eius naturam, substantiam, colorem, odorem, saporem, vires, vt experientia illa crebra verorum medicamentorum perfectam haberet cognitionem. His enim veris cū vitiato collatis, facile secernebat tanquā indice quodam germanum & nativum à spurio. Vt enim rectum sui & obliqui est demonstratorium, sic verum mendacij.



dacij, sic præstantissimum medicamentum  
sui & viciatorum. Quæ via præterquam  
quod breuissima est (veritatis enim sim-  
plex oratio, & in vnoquoque genere rerum  
quod perfectum est idem simplex: imperfe-  
cta vero ac vitiata propè infinita, vt à signo  
ad signum linea recta est vnica, infinita au-  
tem obliquæ esse possunt) etiam est tutissi-  
ma, ob id quod simplicis etiam vnus tan-  
tum vitiati mistio, totam sepe compositio-  
nem conspurcat & vitiat, vt medicamen-  
tum vires non sit habiturum, quas illa ma-  
iores dederunt, & quas tu fortasse sepe ex-  
expertus: quo fiet, vt spe tua frustratus tri-  
steris & iridearis: & mirum ni etiam ca-  
lumniam sustineas, ægro scilicet per id non  
sanato, quod futurum promiseras, & fortas-  
se ne adiuto quidem: est etiam quando gra-  
uiter offenso.

ADULTERIA SIMPLI-  
CIVM MEDICAMEN-  
TORVM.



CACIA succo & carne pruno-  
rum agrestium representatur do-  
lo parum malo, cum vtraq; viri-  
bus conueniant.

*Anicēna  
2. canar.*

Aloës crassæ partes & impuræ lotio-  
ne separata aqua marina & croco Mesuæ



*Dioscor.* adulterantur: sed croci odor dolum aperit. Alij acacia, alij gummi immiscendo adulterant, tuncq; minus est ad minima friabilis, & odor & sapor est alius.

Ambra pulvere ligni aloës, styracis, ladanii, ambrae largioris moscho in aqua rosarum soluto. Sed hæc manuū attritu multo cetera mollescit, vera non mollescit, Plateari<sup>9</sup>.

*Dioscor.* Amomum planta amomide simili, sed inodora, ex Armenia delata, seminis dissimilitudo vitium detegit.

*Serapio.* Asphaltum, id est bitumen pice mista Dioscoridi licet adulterari non posse, ut neque carpobalsamum, neq; xylobalsamum scribit, Gal. lib. 1. antid.

Aerugo multis modis adulteratur Dioscoridi: sed hodie syncerior videtur, si adulteratam suspiceris, notas ex eo repete.

*Dioscor.* Aeris flos delimitata æris scobe.

**B**ellium adulteratur gummi, sed ita vitiatum minus est amarum, & suffitu odoratum, Dioscorid.

Balsamum, id est, opobalsamum, vitiatum terebinthina pauco opobalsamo mista, vel sine hoc, croco orientali & succo foliorum citri, vel oleo nardino. De quo in opobalsamo plura leges.

*Dioscor.* Bitumen adulteratur pice, ut in Asphaltum dixi.

Casto



**C**astorium variè adulteratur: vitiū autem faciliè deprehendes attentus notis, quas in vero & laudatiore castorio diximus, in partibus animalis medicamentosis.

Costus radice prædura Helenij Comagenij, sed odor Helenij minùs vehemens, neq; caput tētās, & sapor minùs acer quàm costi. *Dioscor.*

Crocus misto crocomagmate runso, flore cneçi, vel oleo & pulvere berfilij, ut vocant, qui fricando dolum detegit: vel sapæ sublitu & lithargyro, vel plūbagine ad pōdus augendū, utrunq; minùs odore vegetū est: prætereā hoc est puluerulentū. Adulterati quoq; croci color & odor celeriter euanesçūt: veri diu permanet, Gal. primo antid. *Dioscor.*

Casia odorata, corticibus capparis & radicis tamaricis mistis.

Caphura, gummi iuniperi: sed hoc est minus odorum & durius: illa est friabilis, & odore valentiore. Platearius.

Caryophylli vetustate exanimati vino puluerem optimorum caryophyllorū habente irrigantur, siccantur, foris solūm caryophyllos olent, & vix ad dies decem: molliores sunt integris.

Carpobalsamum adulterari semine hyperici simili, quod Petra Palæstinæ oppido affertur, autor est Dioscori. adulterari tamen non posse assermat Gal. lib. i. antid.



*Diosc.*

**E**vphorbium lacte hœdino, sarcocolla, & glutini mistione conspurcatur, experientia veri est difficilis: nam euphorbiū leui gustu os diu accendit, ita ut omnia gustata euphorbium resipiant. Idem iniectum igni odorem edit fastidiendum. Dioscorid.

Ebur vstum (quod cur spodium vocer vulgus non video) ossibus canis vstis vel albo marmore vstorid verò gravitate proditur, illud forma ossis, & linearū desiderio.

**G**albanum mutatur resina, farina fabarum excorticatarum, hammoniaco, Dioscorid. ex cuius notis syncerum apprehendes.

Galanga acris cypero europeo insipido, vel falso, vel bistorta (ut vocant) radice austera: si verò dictæ radices aceto pulverem veræ galangæ & piperis habente, biduò macerentur, foris solum galangam referunt. Platearius.

**L**adanum stercore caprino & pulvere nigro, id autem tractando non mollescit, sed in pulverem abit modo ladani vetustate exucti. Viribus præterea & odore ladani caret, quod sic vitiatum est.

*Diosc.*

Lasus omne antequam siccescat adulteratur sagapeno, aut fabæ lomento, sed maleficio deprehenditur colore, odore, sapore, dilutione, Dioscorid.

Lici



Lycium quibusdam amurca, succo absinthij, felle tauri, sed id à viribus synceri multum recessit. *Dioscor.*

Lemniam terram sic adulterant, ut nemo veram à falsa possit secernere: sic & Lycium Indicum, & plurima alia, ut verorum notæ à falsorum notis non exactè discerni possint. *Gal. I. li. antidot.*

Ligustici semē adulteratur semine quodam simili, quod facile gustu discernitur, amarum enim est: alij semen fœniculi aut feseleos admiscentes ligusticū dolo vitiant. *Dioscor.*

Lentiscina refina, id est, mastiche thuris & resinæ pineæ nucis mistura. *Dioscor.*

**M**elchus pelliculis incisis pulvere carnis columbinæ siccatae, sanguine hœdino, pane asso. Si eius certum pondus pelui madenti impositum aliquādiu sit grauius, est legitimum: si pristinum pondus seruat, supposititium. *Symeon.*

Manna arabum saccharo & folliculis fennæ.

Myrrha adulteratur gummi macerato in aqua, in qua myrrha maduertit, *Diosco.*

**N**ardus adulteratur stimmi, seu stibio cum aqua aut palmeo vino inspissationis ponderisque causa inspirato. *Diosco.*

Nard<sup>us</sup> Celtica adulteratur imposita herba fini *Dioscor.*



**Dioscor.** simili, quæ hirculus ab odoris grauitate vocatur, sed herba candidior sine cauliculo, minoribus foliis, radice nec amara nec odorata, vti vera nardus est.

**O**pi omnes adulterantur addito sagapeno, antequàm inarescant, colore, odore, sapore dolus deprehenditur: & quia cum aqua vel salina non mox soluantur adulterata: adulterantur etiã furfure & farina præcipue *λευκίας*, id est, qui ex caule defluit, quia dilutior: *ρίζας* verò, id est, qui ex radice perlucidior & purior. Quauis enim radice incisa aut caule quod effluit crassum & lentum *ὀπὶς*, id est, liquor dicitur, lib. 8. simpl.

Opium, semine lactuæ agrestis.

Opopanax, hammoniaco aut cera, tunc in aqua si digitis teratur, non soluitur, nec latefcit vt syncerum, Dioscor.

Os ex corde cerui cartilaginofum, simile ex maiorum animalium corde.

**Ga. 1. lib.**

**antidot.**

**Dioscor.**

Opobalsamum tam variè adulterant & astutè, vt eius adulteria etiam exercitatissimi mos fallant. Hæc verò adulteria inuulganda non cenfeo, ne maligni etiam vitient à nobis docti.

Vitiatur misto vnguento terebinthino, lentiscino, Cyprino, balanino, susino, metopio, melle, vel Cypria cera liquida: sed malefc



lesiciū facile deprehenditur. Nam verus liquor in vestem laneam fusus maculam nō facit, & post lotionem notam nō relinquit: cū vitiatus inhæreat. adhæc merus, lac si instillatus coagulat, & in aqua aut lacte celerimè liquatur, & colore lactescit. Alias quasdam notas apud eundem & Simeonem si libet, legeris potius, quàm apud barbaros hoc seculo adhuc legi solitos, profunda hominum ignorantia, & magno mortalium incommodo.

**P**iper longum fraudulèter præparatum, est herba quædam flava, quæ à Xene affertur, aspectu quidem, nō autem gustu macropiperi similis: hæc autem aqua irrigata soluitur: natiuū macropiper insolubile permanet, Gale. lib. i. antidotorum. Piper longum verum ex Barbaris affertur: adulteratū verò duplex est, alterum, quod in Alexandria maximè conficitur: alterum herbe cuiusdam germen. Quod factitium est, si per diem totum in humore maceretur, illico liquatur ac soluitur, libr. 4. sanit. tuend. Illud fortè ex maza subacta aqua, in qua dissolutum aut maceratum sit piper, & in formas effictas, coniecta post siccata. Vidi etiam adulteratum ex germine & velut nucamēto betule & coryli.

Pastilli theriaci ex radice pentaphylli, id est,



est, tormentilla, Venetiis malè componuntur, non ex viperarum carne. Hermolaus in Coroll. Musa.

**Dioscor.** Phu radice rusci admista vitiatur: sed maleficium facile deprehenditur, quia hæc dura est, frangi contumax, & sine vlla odoris gratia.

**Dioscor.** Pompholyx taurino glutine, ouillo vel marino pulmone, aut grossis vel quibusdam aliis crematis.

**Li. I. ant.** Pentapetalon, Pentaphyllon, Polium nihil simile habent in plantis, ob id non adulterantur.

**Mesues.** **R**ha Ponticū, radice centaurij magni. Rha barbarum exanimatur maceratum aqua diebus quinque, postea siccatum idem minus in crocum tingit, intus nigricat, varietatem in fracturis amisit, densius est, astringit magis: ex aqua verò illa siccata trochisci fiunt regibus.

**Gal. li. I. ant.** **R**heum cum viget ac integrum est, valenter astringit, densum est ac contractum tota substantia, tamen celeriter perforatur. Incola regionis in qua gignitur, coctione vires eius in aquam trahunt: deinde Rheū siccatum tamquam integrum sit, nec coctū transmittunt, sed id rarius est & laxius integro, nullam aut minimam astrictionem retinēs.

Quam



Quantum aliis notis rheon à rhabarba.  
differat, alibi diximus.

**S** Agapenum succo lasiris & galbano &  
Dioscorid. id non eliquescit, sed verum  
vino vel aqua affusa statim dissolvitur, Gal.  
lib. 1. antid.

Sarcocolla puluerizata est suspecta adul-  
terij, Dioscor. à quouis pulvere misto: inte-  
gra eligatur.

Styrax modis multis Dioscoridi adulte-  
ratur, sed dolus facile deprehenditur notis  
ab eo dictis.

*Dioscor.*

Santala lignis aliis, rubrum berfilio ino-  
doro: flauum & album ligno cedrino odo-  
ratione linguam calfaciente.

Scammonium lacte tithymalli & sarco-  
colla, vel erui farina, tunc linguam minùs  
valenter pungit & mordet.

*Dioscor.*

Saccharum intrus fœculentum aut spuma  
succu cannæ eius auctum, tunc in ore vane-  
fcit, & fractum nigricat.

**T** Urbith, gummi dissoluto quibusdam  
radicibus extremis illito: verum au-  
tem si frangitur, gummosum est intus.

Tamar Indi prunis adulterati non splen-  
dent, humidiores sunt. sapore & nucleo pru-  
norum, multum à semine Tamar Indorum  
diuerso.

*Thus*



*Dioscor.* Thus pini resina & gummi: suffitum autem gummi flammam non edit, resina autem in fumum vanescit, thus statim ardet: odore etiam maleficio proditur.

*Dioscor.* Thuris cortex pini aut nucis pineæ cortice horum tamē index, lignis: nam reliqui cortices suffiti quanquam incenduntur, sine odore fumant. Thuris verò cortex ardet, & odorum fumum edit.

*Dioscor.* Thuris manna adulteratur cribrata pini resina, aut polline aut cortice thuris confuso, sed hæc igne deprehenduntur.

Hæc abundè fuerint ei, præsertim qui veras simplicium syncerorum notas ex libro primo accuratè didicerit. Nam cum rectum sui & obliqui sit index, ut initio huius docuimus, & in vnoquoque rerū genere quod perfectissimum est, idem sit simplex ac unicum. Id si cognoueris, alia ei cōgeneria aut etiam arte affinia nullo negotio secreueris.

**I**am tradamus simplicis alicuius nomine scripto absolutè & sine determinatione, sexus, coloris, magnitudinis, figuræ, loci, tēporis: vel notarum probitatis aliarum, vel partis eius simplicis, radicum, foliorum, florum, seminum, & cæterorum, quòdnam sit eligendum: nam pro variis scopis varia, sed in scopos efficaciora deligimus. Quam in  
rem



rem te iuuabit nostra simplicium per locos communes descriptio. Quæ enim radicibus folis sunt efficaces plantæ, illarum nomine, radices veniunt, quæ foliis, floribus, fructibus, seminibus, cortice, ligno, liquore, succo gummi, sunt vtilēs ac medicamentosæ magis, dum plantæ nomen effertur, partē eius vsurpari solitam elige: quum verò pluribus suis partibus ad res etiam varias valent, quibus sit opus, coniecta ex partium illarum facultate & affectus natura, & medicamenti constituendi forma, vt ammi, anisum, apiū, carū, cnicus, cuminum, gith, libypticum, nasturtiū, psillium, seseli, staphis agria, semine sunt præstantiora, idq; solum illarum nomine intelligendum, in aliis multis similiter.

Anisum Cretense lib. 4. san. it. tuend.

Hagnus, id est, flos eius aut semen, licet folia etiam sint vtilia.

Agaricus, albus & fœmineus.

Aloë, id est, succus eius: aloë Indica lib. 9. simplicium in diphryge.

Alumen, scilicet scissile, quia præstantissimum. lib. comp. pharm. gen. primo.

Acetum, ex vino non hydromelite vel cereuisia.

Aristolochia pro re proposita explicanda est: rotunda enim cum multum tenuare crassum humorem, tergere vlcera, digerere

**K**



ex vtero: longa autem cum mitiora hac volumus. Clematidis autem, quia fragatior in vnguentis expetitur.

Anomum, Scythicum lib. 8. compo. ph. part.

Ammi Illyricum libr. 9. eiusdem Aegyptium alij laudant.

Balsamum, opobalsamum potius intelligendum quam carpobalsamum, aut xylobalsamum, lib. 2. comp. ph. part.

Bryonia alba quia efficacior quam nigra.

Buglossum vtrumque foliis & flore efficacius radice tamen non inutile.

Casia vel Cassia in libris Græcorum.

Casia syrinx optima, & cinnamomo viribus & toto habitu finitima. In libris Arabum eadem lignea dicitur: altera vero fistula his dicta ponitur, cum medicamentum est purgatorium.

Cardamomum, maius.

Capparis, cortex radice.

*Galen. in  
simplic.*

Centaurium, minus in purgantibus medicamentis. in cæteris maius dictum à facultate multiplici & efficaciore.

Calaminthe, montana, quia efficacior quam domestica.

Costus, amarus, cum subamarus & valde acer solum nominetur: dulcem tamen nescio quem Arabes inuexerunt.

Cypres



Cypressus, id est, nuces eius ī astringētib<sup>9</sup> medicamentis, lignū aut folia in diureticis.

Cinnamomum optimum, de quo in simplicibus abundē.

Corallium, rubrum.

Cuminum, Aethiopicū, libr. 4. san. tuen.

Daucus, agrestis: nā satius pastinaca est alimentum veriū quā medicamentum.

Elleborus, niger Mesuæ, quia salubrior, albus Gale. Apho. 1. lib. 5. Obserua igitur, an compositio sit Arabica aut Græca. Elleborus vterq; & heleniū ex locis editis præstāt.

Eruca, sylvestris, quia efficacior hortensī.

Epithymum, Atticum melancholiam ex ventriculo purgat: id in Græcis cōpositionibus vsurpandum, in Arabicis Arabicum,

Fœniculus, semen, sed in collyriis succus foliorum aut radicum.

Galla, solida efficacior quā perforata.

Gummi, Arabicum: id enim omniū perfectissimum vel Plinio authore.

Gluten, mastiche, cæteris glutinis efficacior, vt vitrum etiam glutinet, quibusdam intelligitur: aliis ichthiocola, aliis taurocolla magis placet glutinis nomine.

Hyssopus montanus hortensī melior, vt calaminthe montana efficacior domestica. Hyssopū Ciliciū Dios. Creticū verò Archigenes, apud Gal. lib. 8. c. ph. p. Hyoscyamus,



albus, seu album eius semen: quod tamē interdum exprimitur, frequentius tacetur.

Iris, radix ireos Illyricæ veteribus, nunc pharmacopolarū ignavia Florētina vsurpatur, cū illa per Venetos facilē haberi queat.

Li. 6 simp.  
plic.

Lupinus amarus: nam dulcis esculentus est, ut ille amaritudine per macerationem in aqua deposita.

Lactuca, semen, præterquā in victus ratione, ubi herba potius intelligitur.

Lapathū, oxylapathū efficacius rotundo.

Lithargyros, auris: tamē lithargyroschryfitis aliquoties in lib. c. ph. Gal. legitur.

Mastiche, Chia lib. 7. Meth. & alibi passim. Aegyptiam tamen ac recentē ob id pinguis simam laudat lib. 2. ad Glaucon.

Marrubium, album præstantius nigro.

Mel, apum, alterum aëromeli seu mel aërium & rosidum.

Margaritæ, solidæ meliores perforatis, nisi etiam sint flauæ, obscuræ, solidis pares.

Medulla si nō additur cuius animalis, & valens futurum est medicamentum, ceruina miscenda valentior quā vitulina, lib. 6. compo. ph. part.

Nuclei, pini, oliuæ: dactyli autem Auiennæ.

Oleum, oliuum ex oliuis expressum.

Opium, Thebaicum Gal. lib. 7. simp. & post



post eum omnes.

Petroselinum, Macedonicum, & in hoc Astreoticum, & huius semen maxime in usu est lib. 8. comp. ph. part.

Pruna, sialuus deiicienda est, Damascena, & Hispana seu Iberica, hodie Augustana & Cathalaunica Italis dicta, sunt multo praestantiora, vel si qua his similiter sunt pingua, dulcia: si ad cohibendum & astringendum sit medicamentum, Damascena immatura, vel potius quae Iorana nobis dicuntur. S. Iuliani & Turonica.

Papaver, album semen.

Piper, album quia acrius, & linguam magis pungit quam nigrum, à quo per adustionem vis exhalauit, Galen. lib. 8. simp. sed album id maturum intellige. Nam album ex macropipere in racemum granatim dehiscente, recens factum, minus est acre, & macropiperi facultate proximum, quale apud Serapionem est accipiendum. Pix, liquida in suppuratibus & tergentibus: sicca, in siccantibus, vnguentis epuloticis & glutinantibus, Gal. lib. 7. simpl.

Pæonia, mas seu eius radix, vel semen, Manardus ætatis nostræ medicus longè doctissimus in epistolis.

Polypodium, quernum vulgò vsurpatur, murale & à saxis pretulerim cū Narbonen-



sibus quibusdam, quod frequētissimum, & pro querno omnes venditant, nisi si quando astrictione opus est: qua ratione hederam quoque quernam nonnullis expeti audio.

Quatuor emolliētia, malua, althæa, viola nigra, acanthus.

Qua- tuor semi- na.	{	Fri- gida	{	Maiores, melonum, cucur- me. cucurbitæ, citruli.
			{	Minora, lactucæ, portu- lacæ, intybi, cichorij.
	{	Ca- lida.	{	Maiores, cumini, carui, anisi, fœniculi.
			{	Minora, apiij, dauci, a- meos, amomi.

Quinque radices vreticæ, apiij, petroseli-  
ni, asparagi, graminis, rusci.

*Lib. 8. sim  
plic.*

Resinarum, primas non iniuria meruit  
lentiscina, id est, mastiche: inter alias verò  
præfertur terebinthina, quia melior quàm  
colophonia, & phryctæ dicta: aut illius loco  
ponitur larix dicta, terebinthinæ propè simi-  
lis, Gal. lib. 1. comp. ph. gener. recentioribus  
verò pinea intelligitur.

*Lib. 9. cō.  
ph. part.*

Ruta, folia rutæ agrestis, Græcis verò fo-  
lia rutæ domesticæ. Illam verò & illius se-  
men, moly vel besanū, vel besasa, vel cū Sy-  
ris, apud quos nascitur Hermola ferè vocār.

Rosa, rubra recens in purgantibus, sicca  
in astringentibus.

Rhapha



Rhaphanus, sylvestris.

Rosmaris, folia, interdum flos, quem nescio cur hodie vulgus ἀρωμα, id est, florem absolute appellet.

Rhus, cortex fructus sumach dicti.

Stœchas, stœchados Arabica flos.

Styrax, calaminthes: nam liquidus vulgò dictus est myrrha stacte, si verus sit.

Santalum flauum.

Spica, nardi Indica.

Sulfur, ἀπυρον, id est, ignem non exper-  
tum ceu viuum est nobilissimū: ad quēdam  
extinctum seu nobis familiarius præfertur.

Ἰχθίνος, id est, iuncus, pro scœnu anthos.

Tres flores cordiales, violarum, buglosi  
vtriusque.

Thymum, Atticum aut ex editis locis &  
siccis, lib. 4. sanit. tuenda.

Viola, nigra seu purpurea, vulgò Martia  
& quadragesimalis, quòd in ea tēpora flos  
ferè incidat, & eadē recens si haberi potest:  
nam sicca inefficax.

Zizipha. i. iuiubę recētia & bene matura,  
aut saltē integra, nō putriū aut vetustate e-  
xucca, qđ illis post sextū mēsem ferè accidit.

Sic quę singula in singulis regionibus  
sunt præstantissima & laudatissima.

Alumen Milesium.

Agaricus Ponticus Andromach. iuniori



in theriaca.

Myſi Cyprium.

*Lib. 6. ſa-* Nitrum Berenicium.

*nit. tuend.* Sinon Syriacus.

*Lib. 9. cō.* Cuminum Hiſpanum, alibi Aethiopicū,

*ph. part.* melius Aegyptio. Aniſum & Thymum

*Lib. 1. an.* & alia plurima Cretica, libr. 4. ſanit. tuend.

*tidot.* in diatrion piper. & diacala.

Meon Hiſpanum & Macedonicum.

Aristolochia Pōtica, & hac melior Cre-  
tica, libr. 10. comp. ph. part.

Phu Ponticum, Caſtorium Pōticum.

Daucus Creticus, ſemine & radice bonus,  
ceteri ſolo ſemine. In Dicearchia quæ  
nunc vocatur Puteoli, ærugo, ceruſa, æs,  
ſquamma æris, & alia nonnulla. Romæ  
argenti ſpuma fit optima: ex Sicilia itē, ma-  
gna Libya & Creta quotannis multa præ-  
ſtantiffima Romam afferebantur.

De his multa libro ſecundo in delectu  
medicamentorum diximus, quædam dictu-  
ri quoque libro quarto in theriace.

Quid, id  
eſt, quod  
medicamē  
tū pro quo  
ſupponen-  
dum.

Q V I D P R O Q V O.



Ντιβαλλόμενα, hoc eſt, ſimplicia,  
quæ aliorum facultate ſimilium  
penuria ſupponi poſſunt Medi-  
ci conſilio, quæ nomine Galeni  
circun



circunferuntur, & à Paulo ad verbum propè  
citantur, Galeni non esse hinc liquet, quod  
statim ipso initio Galenum citat. Adhæc a-  
nacardij fructus mentionem facit, qui Gale-  
no ignoratus fuit. Postremò multa suppo-  
nit absurdissima, vt loco agarici, euphor-  
bium: pro serpyllo, potamogitona: vice gal-  
læ, sordes gymnasiorum: in locum poly-  
podij, radix chamælææ aut chamæleontis:  
pro polythrico, absinthium, & alia eius ge-  
neris plurima viribus dissimilia. Tamē quæ  
recipiēda magis sunt, tum indidem, tum ex  
Galeni libris, tum etiā ex Arabibus vt cun-  
que proferemus, vt pro

Aqua pluuiæ, supponi potest aqua fonta-  
na pura: & ab omni mistione syncera, Gal.  
lib. 1. comp. ph. part. in diacodio.

Acacia, succus & caro prunorum agre-  
stium, vel hypocisthis, Auicē. 2. canon.

Asaro, acori par pondus & dimidium.

Carpesium quoq; pro asaro & cum asa-  
ro, lib. 2. comp. ph. part.

Absinthio, cum Galeno abrotanum: &  
contrà pro abrotano absinthium.

Acanthij semine, lychnis, & contrà, ἀντι-  
βαλλομένων author.

Acantha Arabica seu Aegyptia herba  
(quæ sucacha Serapioni dicitur) acantha leu-  
ce nostras, eidem dicta bedegar.



Alicacabo, semen folani.

Asphalto, pix liquida, brutia.

Aethiopicae oleae lacryma, lacrymarum  
acaciae partes duae, seu pro gummi elemmi  
gummi Arabicum.

Acoro ad flatus & hepar ac lienē iuuan-  
dum, cumini par pondus, & tertia pars ari-  
stolochiae Auicen.

Anchusa, hyacinthus.

Arsenico, sandaracha.

Amylo, sicca farina.

Amygdalis amaris, absinthium.

Aristolochia quauis, vna ex tribus aristolo-  
chiis, quācūq; habueris, Gal. lib. 3. c. ph. part.

Adipe vulpis, vrsinus.

Adipe ceruino, anserinus.

Alumine, sal fossitius.

Pro balaustio, malicorium.

Buccinis, ostrea vsta.

Balsami liquore, myrrha stacte.

*Lib. 6. fa-* Pro Cinnamomo, casiae aut amomi du-  
*nit tuend.* plum ad odoris gratiā Gal. lib. 5. c. ph. par. in

*Li. 1. an-* dentifricio. Pro cinnamomo, duplū optimae  
*tid. Gal.* casiae, vel cū Quinto Medico duplū vel mul-

tū carpesij, vel certē non paucior casia, Gal.  
lib. 2. 3. & 8. cōp. ph. p. & lib. 1. antid. Quidā  
carentes cinnamomo in vicem eius ponunt  
æquale pondus ex semine cardamomi. Da-  
mocrates in Cyphi. lib. 2. antidotorum Gal.

Casia,



Cassia, cinnamomum, Gal. lib. 2. cō. ph. p.

Cassiae cortice, nardus indica vel malobari folium: vel contrā, lib. 6. comp. phar. p.

Chamaemeli floribus, duplum foliorum  
radicum.

Costo hodie rarissimo, pyrethri dimidiū,  
el baccæ cedri, vel radix helenij, vel ireos.

Cimolia terra ex Cimolo vna cycladum,  
et trimentū ferri & molæ simul attritorum.

Struthio, in sternutamentis ellebor<sup>9</sup> albus.

Cardamomo maiore, minus: & contrā.

Calaminthe omnis, mentastrum, pule-  
gium similia sunt facultatibus, ob id inui-  
cem sunt antiballomena.

Pro croco, crocomagma.

Cypero, iuniperus maior.

Cumino, semen rutæ vel agni.

Clinopodio, heliotropium.

Colocynthide, semen ricini.

Capparis radice cortice, cortex radice  
tamaracis vel ericæ.

Cicutæ semine, coriandum.

Pro dictamno, elelisphacus vel nepitha.

Doronico, dimidium seu duæ tertiæ ca-  
ryophyllorum, Auic.

Damasonio, eryngium. Pro Elaterio,  
succus foliorum cucumeris agrestis.

Ebeno, lignum Gaiaci: & contrā. Nam  
quas vires hodie in ligno Gaiaci experimur,  
ebeno



ebeno tribuit Galenus libro 6. simpl.

Eupatorio Mesuæ, absinthij & asari  
dimidium pondus eius, vt ambo simul  
sta æquent pondus eupatorij Mesuæ, ab  
patorio Græcorum diuersi.

Pro Folio, folium caryophylli, nardus  
Indica si inuenitur, cassia id est, vulgare  
namomum, macis, Auicenna 2. canone.

Ferrū ferrugo, squama ferri idem præ  
pollent, & pro se mutuò ponuntur.

Fimo palumbis, fimus columbæ.

Felle suillo, vel perdicis, vel piscium.

Pro Gentiana, asari & radicis cappasa  
ana dimidium.

Gongilide, heliotropium.

Glycyrrhizæ succo, æquale radicis eius  
Andro. in arteriace 15. apud Gal. li. 7. c. ph.

Gnidio cocco, semē lathyridis, & cōtra  
Galbano sagapenum.

Pro Hammoniaco, propolis.

Hermodyctylo, in doloribus iunctura  
rum folia anchusæ & dimidium bdelij.

Hederæ gummi, gummi perfici.

Hyacintho, flos Isatidis.

Pro Iride Illyrica, helenium odoratum.

Pro Lapide asio, lapis gagates.

Pro Lapide magnete, lapis Phrygius,

Lapide Phrygio, pyrites lapis vel argy  
rites.

Liby



Libystico, semen staphilini, id est pastinaca, praesertim agrestis.

Lepore marino, cancer fluuiatilis.

Lanariae radice, radix veratri nigri.

Lycio, succus radice cetaurij magni, li. 7. sim. aliis succus baccarum periclymeni, autor libelli Dynameon: Gal. male adscripti.

Pro Melle, mel aërium vel saccharum.

Malabathro, casia, vel nardus Indica.

Myrrha troglodytica, calam<sup>9</sup> odoratus.

Myrrha, Smyrnium, & contra Dioscor. in Smyrnio.

Pro nasturcij semine, folia eius sicca.

Nuce moschata, parispica. Nardo Syriaca, iuncus odoratus.

Pro opopanace, hammoniacum, vel galbanum, vel sagapenum, vel bdellium, libr. 2. ad Glaucanem in curando scirrhus.

Ozimo caryophyllato, melissa in affectibus cordis.

Oleo laurino, pix liquida, licet illo inferior, vel oleum cedrinum, vel cicinum, vel vetus, vel oleum ex lucerna cum Hera, Gal. lib. 1. comp. phar. part. vel coctum, sic enim tenuius fit, & veteri ac cicino simile, vel sordes lucernarum luti crassitie. Ibidem.

Oleo rosato, violatum, nymphaeae: amygdalinum autem loco rosacei boni, id est ex multis rosis cum oleo omphacino insulso fact



facti libro tertio comp.ph.part.initio.

Oleo recinino seu cicino, raphaninum

Opobalsamo, opocarpasum Galen.

myrrha stacte, vel liquor myrti.

*Lib. 6. cō.*

Oriza, hordei farina.

*ph. part.*

Oesypo, medulla ceruina.

Omphacio, succ<sup>o</sup> rhois, vel vinū auster

Pro Pipere longo, album: pro albo,

grum optimū, id est, grauissimum: & co  
trā, 4. sanit. tuendā.

Periclymeni fructus drachmis tribus,

dicis eiusdē drach. tres. lib. 9. comp. pha. pa.

Phoenicobalanorum pinguium carna

drachmis tribus, palmule seu dactyli tres

aut sex Galenus, lib. 7. comp. ph. p. in art

riace 15. Andromachi.

Psyllio, lens palustris.

Petroselino Macedonio in theriaca, alt

rius regionis Peroselinum, Gal. lib. 1. anti

Pro resina phrycta, pix, aut pix bruti

Gal. lib. 9. comp. phar. part.

Rubigine, scoria ferri.

Raphani seminis drachmis decem. suc

ci eiusdem cyathus vnus, Galenus lib. 9.

comp. ph. part.

Rosis, flos rosarum, vel contrā, Gal. lib.

6. comp. ph. part.

Rhoë coriario, rhus obsoniorū, & con

trā, Gal. lib. 6. comp. ph. part.

Pro



Pro Staphide agria, pyrethrum.

Spodio Græcorum, cinis super fornacem aurariam inuentus melior quàm ebur vñtum, quod nescio cur hodie Barbari spodium vocent.

Styrace, castorium.

Sale Indo, saccharum candefactum.

Sagapeno, gummi cedri, hammoniacum, resina picea sicca.

Spuma nitri, nitrũ molle, vel aphronitrũ, Gal. lib. 3. comp. ph. part.

Sulfure viuo, flauum vel vñtum & purgatum.

Satyrio, semen erucæ, vel scincus: vel contrà.

Sinapi, cardamomum vel cardamum.

Scammonio, ricinus.

Stribio contuso, squama æris, stannũ vñtũ.

Sepir osse, pumex.

Serapiade, pæoniæ radix.

Scilla, bulbus.

Pro Terebinthina, larix dicta resina, ei propemodum similis, Gal. lib. 1. com. ph. ge.

Thapsiæ succo, chamæleontis nigri succus, vel nasturtium, vel nasturtij aut erucæ seminis pondus æquale, licet illa sint multò inferiora thapsia, Gal. lib. 1. comp. ph. part.

Tamaricis succo, succus sambuci, Gal. libro 9. comp. phar. part.

Pro



Pro Veratro albo, nigrum.

Viscoquerno, chamæleon niger.

Vino falerno, aliud quoduis colore ful-  
uum substantia tenue, vt perluceat, & sit o-  
dorum vehementer, vt Ariusium ex Chio,  
Lesbium ex Mitylene, Cresso: Methymna  
& Tmolites, Gal. lib. 1. comp. ph. gen.

Pro Zedoaria, aristolochia.

Zingibere pyrethrum.

Αντιβαλλόμενα, vel horū aliqua vel alia  
potest quæuis regio noua desideratis facul-  
tate affinia facere doctorū medicorū con-  
silio: nam si Arabibus & Græcis pro sinapi  
cardamomum fortè ipsis frequentius licet  
substituere, quidni pro cardamomo fre-  
quētissimū nobis sinapi vsurpabimus? præ-  
sertim cū vt pro cinnamomo casia, sic con-  
trā pro casia cinnamomum assumi probaui-  
mus: idēmq; in aliis faciendum puto. Ob id  
Galenus libr. 7. simpliciu melissophyllum  
(inquit) marrubio facultate simile, sed ipso  
multo imbecillius, ob id melissophyllum uti-  
tur nemo. Nam absurdum fuerit, præsentē  
vbique terrarū magno marrubij prouentu,  
vti melissophyllo. Si cui verò ad manum  
non fuerit marrubium, melissophyllo uti  
poterit, obseruata eius præ illo imbecillita-  
te, vt ob id quātitas eius augeatur: hæc Ga-  
le. qua ratione pro cinnamomo duplū casie  
optimē



optimè miscemus medicamentis, vt quāti-  
tate qualitatis imbecillitatem redimamus.

Quæ igitur apud singulas gēres sunt co-  
piosa, modò sint facultate proxima his quæ  
desiderantur: quia facilia sunt paratu po-  
nantur: vt in Asia in frigidis capitis affecti-  
bus, aut in declinatione calidorum rustici  
cedrio dicto vtuntur: eius penuria pisselxo,  
id est, pice & oleo mistis liquida forma: in  
terdum etiam cedrio & pisselxo simul ma-  
gis & minus mistis, prout vires eius intēde-  
re student: hoc autem linūt sinciput, nares,  
frontem, aures, & quibusdam plantam &  
sedem, Gal. lib. 2. comp. ph. part.

Sed videmur antiballomenis non egere,  
qui magna cura iam simplicia generis o-  
mnis in prōptu habeam⁹: imò maximè ege-  
mus, cū multa simplicia veteribus laudatissi-  
ma (vt Theriaces cōpositio docebit) hodie  
nobis parum sint cognita. Quæ vbi certa  
erunt, his vtendum potius quàm antibal-  
lomenis. Vt enim pluris est equo domini  
oculus quàm equisonis industria: pluris a-  
gro domini vestigiū, quàm villici stercori-  
zatio: pluris familiæ paterfamiliās, quàm  
procurator: pluris prætor, cōsul, rex, pastor,  
quàm proprætor, procōsul, prorex, mercena-  
rius: sic plus tribuēdū puto his, quæ maiores  
magno delectu & ratione optima in com-

L



positiones cooprauerunt, quàm quæ illorum loco coacti adoptamus.

**M**edicamenta quædam tum purgantia, tum non purgantia, & sumenda, & ad mouenda, ad compositionē per ignem præparamus calfaciendo, nutriēdo, liquando, coquendo, despumando, colando, clarificādo, affando, vrendo, extinguēdo, lauando, infundendo, destillando, vt sint mitiora, vel valentiora, vel gratiora, vel salubriora, vel facultas vna tollatur, aut detegatur, aut noua acquiratur. Multa enim solū calfiunt, vt dū calfacto pistillo mastichem siccā alutæ intendimus in epithema: dūq; calfacto mortario & pistillo gūmi Arabicum & tragacātha siccata promptius in puluerem tenuissimum ducendo læuigantur, præsertim aëre humido: nā sicco, qualis æstate & gelu, præsidium illud non admodum requirunt, nisi sint admodum recentia.

Nomine ignis intelligo calorifica omnia, solem, simum, putrentes cortices, calorem animalis, calcis irrigatæ, & si qua sunt alia præter hæc calfacientia.

Oleum, cera, pix, resina, & similia prius calfacta abluuntur.

Calfacta prōptius & perfectius miscentur sed in calfaciendo sunt certi fines, quos ultra & citra vis medicamentorū non consisti



sistit. ob id aromata miscemus aliis ab igne depositis, ne ab igni ipso vis eorum dissoluatur, vt postea dicemus.

Medicas portiones hyeme calidas damus, & cum vomitarias esse volumus, tepidas: cum hydroticas, plurimum calidas propinamus.

Semina saccharo incrustanda antè calefaciēdo modicè siccamus, vt promptius in his saccharum siccitate concreascet & albescat. Caloris vis in medicamentorum præparatione talitè patet, vt me dies prius sit defecturus, quàm caloris illius exempla, si omnia persequi liberet.

Nutriuntur super cineres calidos lythargyrum & molybdena, & cum oxelæo celerrimè liquantur: cum hydrelæo diutissima coctione opus est.

*Li. 9 sim.*

*et li. 1. c.*

*ph. gene.*

Turbith lacte nutritur & myrobalani oleo, aqua, & aliis apud Mesuen. Sarcocolla lacte muliebri, vel asinae, vel caprae nutrita aliquandiu post siccata, idq; aliquoties, reponitur ad vsus. Fit hæc simpliciū quorundam nutritio & velut resectio atque auctio interdum sine igni, præsertim aëre calido, vt etiam vnguentum nutritum declarat.

#### L I Q V A T I O .

**L**iquantur calore ignis, quæ frigido concreuerunt, butyrū, oleum hybernū,

L 2



adipes, medulla, cera, resina: gummi melius aqua soluuntur, & ei miscentur, non oleo, uti succi lenti bdellium, hammoniacum, & similes, vel aceto, vel alio: resina verò oleo liquata eidem probè miscentur non aqua.

*Lib. 1. cō. phar. gen.* Chalcitis metallicorum celerrimè liquatur, & alumen omne, sed scissile mollescit tantum: liquatur & sandaracha & auripigmentum. Lithargyros per se tardissimè liquatur: cum arugine vel duplo oxelæi cocta citius liquefit, quàm cū hydrelæo duplo, vel paulò plus duplo. In medio horum sunt ærugo & misy: fori autem quia terreum magis est ac saxeum, quàm chalcitis & misy, etiam tardiùs liquatur.

## DISSOLVTIO.

**C**Rocum, thus, myrrham læuigata vino dissoluit, & medicamento propè cocto miscet, quæ ubi modicè liquata erunt ab igni, deponit Andromachus in arteriace 16. lib. 7. comp. phar. part.

Galbanum, opopanax, sagapenum, hammoniacum ex vino vel aceto, vel alio liquore cocta dissoluuntur. Cum siccis verò trita abeunt in puluerem.

Gummi ferè dissoluuntur liquore aliquo, aut pistillo calido, item & pingues succi nisi ob siccitatem teri possint, ut frequenter  
gum



gummi Arabicū, tragacāthi, iuniperi, thus masculum, mastiche, & propè reliqua vetustate vel igni siccata: recentia verò & adhuc vuida etiam calentibus digitis liquefunt, aut saltem mollescent. Eadem tundendo lactescunt, multò magis si pistillo calido in mortario calido tundantur. Gummi quia aquea est natura, pròptiùs cum aqueis miscetur, quàm cum oleaginis: resina contra quia est oleagina, vt in simplicibus diximus. Multa item composita, vt conseruæ, trochisci, antidoti aliis miscenda, antè liquore aliquo dissoluuntur.

Non modò autem hæc ad compositionē sunt necessaria, sed particulares quædam compositiones sæpe sunt antè faciendæ, quæ in alias maiores recipiuntur: vt cyphi in mithridatiō: pastilli theriaci & scillitici & hedychoon magna in theriacen. Galla moschata, & alipta moschata in multas Arabū compositiones: & præter hæc nō pauca, quæ in sequentibus compositionibus inuenies.

## I N F U S I O .

**I**Nfunduntur medicamenta parum trita, & macerantur liquore aliquo calente à sole, vel igni per semihoram, per horas etiam plures, vt octo, noctem totam etiam diem,

L 3



biduum, triduum, pro medicamento natura, & vario medicis scopo & necessitate, ut interim vis eorum tota in liquorem illum trahatur & transeat. Hac utimur non modo in apozematibus & syrupis sed etiam in potionibus quotidianis purgatricibus, ut hac ratione sint gratiores, quam ipsa solidorum substantia.

*Apho. II.  
lib. 2.*

Ciclius etiam subeunt aut distribuuntur liquida quam crassa: quomodo potu quam cibo facilius & iucundius est impleri. Nec sola medicamentorum facultas in liquore transit, sed eius substantie portio tenuior: interdum etiam crassioris aliquid, praesertim dum infusum valentius colando exprimitur, aut per colum rarius transmittitur. Colandum enim ac exprimendum magis aut minus pro aegri, & affectus, & medicamento natura. Infusio veteribus parum frequens est, quanquam multa saepe in liquore aliquo ante decoctionem macerauerunt, non tamen ad purgationem, quo more nos hodie in agrorum delicatorum & diuitum gratiam solemus, atque adeo alteramus saccharo & pseudocinnamomo adiectis, ut aeger sumpsisse se medicamentum nesciat.

*Li. 4. fa-  
n. t. uend.*

Est quando vice infusionis in sculo aliquo eadem nodulo ligata incoquimus. Gale-  
nus



mus verò semen abietis tritum & flores populi nigrae tritos oleo dulci & tenui macerant dies quadraginta interdū menses duos, tres, quatuor, plures, in domo calida, & sub sole mouet meridiano, postea linteo colatum & expressum oleum reponit, reliqua abiicit.

Infunduntur seu macerantur liquore aliquo medicamenta, ut eorum vires in ipsum transeant (ut dum agaricū, sennam, rhabarbarū, & alia multa super cineres calidos temperamus aliquandiu humore idoneo) vel ut simplicis facultas vehemens corrigatur, ut turbiti lacte caprino recens multo maceratum & post siccatum fit clementius, neque ventrem postea cōturbat. Mezereon quoque & esula aceto macerata acrimoniam effrenem deponunt. Vel ut facultas noua medicamenti acquiratur: sic turbiti succo cucumeris agrestis temperatum materias à partibus remotis valētius attrahit & vacuat. Hermodactylus itē scillae, aut raphani succo, vel aceto scillitico infusus à iuncturis potentiū euocat. Agaricus etiam oxymelite maceratus fit purgantior. Vel ut medicamentum fiat lubricum, ob id medulla collocynthis, chylo tragacanthi prōptē per vētrem totum lubricat, ut neq; vētriculo, neq; intestinis, neque vesicae adhæsu suo sit mo-

*Menses  
in cano-  
nibus.*



lesta. Scammonium quoque oleo violato vel simili maceratum promptè subit deorsum, nulla aut minima partium noxa, quas permeat. Aut igitur liquor ipse medicamento vires in se trahit, aut mutat ac frangit, vel auget pro varia cuiusq; liquoris natura: ut si aloë decocto aromatum mergatur, illorum vires in se trahet. Sed hæc fusius & clariùs nostris tabulis in canones Mesuæ expressimus.

## M V C C I L A G O.

*Lib. 6. fanita. tuen.*

**X**υλός, id est, succus, seu succago ac lentor, ac veluti mucus ac muccago fit infusis quibusdā feminibus in liquore calfacto sole vel igni. Cuiusmodi sunt semen psillij, ex quo fortem facere expressionem cōtra falsam Arabum opinionem ne dubitata: sic etiam extrahitur ex semine cydoniorum, malux, bismalux, lini, scænigraci, vrticæ. Lini semen in aqua coctum refrigerantem χυλόν, id est, cremorem lentum, efficit. Quomodo ex radicibus malux, bismalux, symphyi, periclymeni, & similium: vnde emplastrum est, *διὰ χυλόν*, seu *διὰ χυλῶν*, id est, de muccaginibus: diuersum tamē ab eo quod de muccilaginibus vulgo dicitur, ut leges in emplastris Mesuæ. Ex quo autē liquore succus ille sit educendus, Medico cōsultore opus est, ut in dysenteriis cum aqua rosa



rosarum & plâtaginis clysteribus iniicitur hæc muccago in pleuritide cum aqua tussilaginis aut adianti, aut hyssopi, aut scabiosæ extracta illinitur, & in aliis affectibus cum liquore alio pro variis Medici scopis. Ex gummi item Arabico & tragacantho infusis materia sic lenta educitur, vt ex cæterorum gummiū dissolutione. Iniiciuntur autem prædictorum libræ vni aquæ calentis libræ tres, si crassio rem vis chylon: aut 4. aut 5. si aquosio rem, & nocte vna, vel horis aliquot macerantur recalfacta, & sacculo lineo imposita exprimuntur: baculo interdum etiam batuuntur, donec totus humor glutinosus effluat.

Χυλὸς autem etiam succus ex tritis plantarum partibus expressus, vt libr. primo docuimus. Semperuium autem vtrunq; portulacam, maluam, symphytum, buglossum, cotyledon, aloë, telephium, & alia per multa lentore multo prædita, vix succū trita reddere, nisi inter tundendum liquorem aliquem affundas tenuem & aquosum, non crassum & lentum. Aut calathio imposita, in cella vinaria herbas tutas aliquādiu in catinum suppositum destillaturas colloces, aut prius quàm exprimas. mediocriter calfacias in vase duplici, refrigerationem obtundi times. Quòd si liquorem affundas, is

*Li. 6. fa-  
nit. tuen.*

L 5



herbæ huius virtutem nõ vitiet, sed vel au-  
geat, vel foueat, & seruet. Sic polygono ma-  
ri præsertim ex loco arido, & quando se-  
mētescit, maioranæ, thymo, saluiæ, rorima-  
rino, foliis lauri, hederæ ex locis aridiori-  
bus liquor aliquis est affundendus his facul-  
tate conueniens, si succum aliquem ex hu-  
iusmodi ficcioribus educere libet.

## CLARIFICATIO.

**C**larificantur, hoc est, purgantur & puri-  
fiunt, succi quidam per se (residendo  
enim, quod terreum est ac feculentum sub-  
sident) quidam coctione & colatura, quidam  
vt decocta, alia quæ vix sine albuminibus  
in singula decocti libras ferè singulis (quan-  
uis tria etiam sex libris & pluribus sufficere  
possint) purgantur, idq; immisso vel paulò  
antè, vel illico post melle aut saccharo: alio-  
qui & albumina vr̃tur, & purgatio parum  
bellè procedit. Quòd si quæ apozemata  
aut syrupi, quos vocant magistrales, agari-  
cum recipiunt in fine ponendum, albumini-  
bus non egetur. Albuminum loco etiam est  
acetum, aqua vitæ dicta, succus limonum &  
aranciorum. In quibus enim acetum est, de-  
spumentur coquendo, & coquantur despu-  
mando, donec spumam emittere cessent:  
tunc enim clara sunt quatenus eis datū est.  
Veteribus non fuit in vsu, sed horum lo-  
co



co collum panneum, nunc simplex, nunc duplex, interdum etiam triplex, vel raram, vel densum pro re varia & scopis diuersis aliquo scilicet interuallo, ut trium digitorum: angustissimum verò erat & rarissimū summum, latissimum & densissimum inum, mediocre in amborum medio fixum stabat: si quod facis crassitie obstructum non patebat, abluendum erat.

Albumina autem ouorum vel in aquam frigidam iniecta scopulis concutiuntur, donec in spumam abeant, quæ particulatim saccharo cum aqua feruefacto, vel decocto alicui iniiciatur, cum scilicet prior nigrescit, aliam substituendo donec clarescat, vel eadem iniecta primū saccharo cum aqua coquendo, vel decocto alicui, vel simul mistis ambobus (quod frequentius fit) scopulis similiter in spumam agitati multo abeunt, simul coquuntur, donec succidat spuma. Dum verò id decoctū refrixit, modicè quidem si decoctum mediocre habiturum est consistentiam, vel potius liquidæ proximam.

Magis autem, si decoctum futurum est liquidissimum, ut oxymeli, hydromeli, apozemata propè omnia colantur per pannum album laneum semel, & si non sint clara satis, bis & ter.

Quæ



Quæ verò decocta succum habent crassum & lentum, vt qui paulò antè succi lentius & crassi sunt dicti, & syrapi & saccharum cum aqua coctum incrustandis feminibus, vel aliis bellariis aptū, calida omnino sunt per pannum colanda.

Aëtius & Paulus ebullitionem ad tertiam partis consumptionem faciebant ante mellis mitionem, ne, opinor, coctione multa mel amaresceret: id quod Galenus in oxymelite nō metuit, quod tribus aqua, aceto, melle initio simul mistis posse coqui scribit.

## COCTIO.

*Aris. c. 3.  
lib. 4. me-  
geor.*

COCTIO medicamentorum ferè fit elixando in humore calido, rariùs assando in calore sicco: simplicia enim non modò alimenta, vt radix ari, dracontij, capæ, alij, porri: sed etiam medicamenta in liquorem cui incoquantur, vim suam transmittunt, & liquores illius virium aliquid adipiscuntur. Ob hæc alimenta & medicamenta acria elixando euadunt mitiora & gratiora (nisi liquore medicamentoso elixetur) ipsum verò decoctum vires simplicium sortitum à medicis in apozema vel syrupum, vel forum, vel id genus alia vsurpatur.

Quinetiam coctione fiunt antidoti, cataporia quædam, olea permulta, vnguenta, cataplasmata, emplastra, & reliqua propè omnia



omnia, quæ libro sequenti composita doce-  
 bimus: in quorum multis non solum facul-  
 tas simplicium miscentur, sed ipsæ etiam  
 substantiæ. Quid quod ellebori radicem  
 raphani radici inter cineres assandē impo-  
 nit, ut raphanus iste purget mitius, quam  
 per se elleborus (cuius rei meminit Galen.  
 quos medicamentis purgare oportet, & qui-  
 bus, & quando) elixari dixit Mesues: & scam-  
 monium malo cydonio circumdatum, & in  
 cassato coctum, ut ipsum etiam malum  
 clementius purget, quam per se scammo-  
 nim. Coquimus igitur medicamenta per-  
 rita, ut eorū vires imbecillas augeamus,  
 aorum validas nimis minuamus, aut alie-  
 as in totum abigamus, ut quoque ex omni-  
 bus etiam facultate diuersis & sæpe contra-  
 ris facultas vna cōcrescat & coalescat. Ad-  
 hec ad custodire diuturnitatem coctione  
 longa quædam siccamus, quædam etiam  
 coquimus ob destinatam medicamenti  
 formam: ut syrupū diutius coquimus, quam  
 ozema, vel iulep vulgare emplastrū diu-  
 tius, quam ceratū aut malagma. Quæ medi-  
 camenta mel liberalius accipiūt, coqui lar-  
 gius postulant: & itē quæ paucum mel acci-  
 piunt, si his parantur, qui mel & dulcia cete-  
 ra auersantur. Nam eo pacto minus est dul-  
 ce, & minus stomachum eorum qui à melle  
 abhor

*Li. 4. san.  
 tuend. in  
 diacala-  
 minte.*



abhorrent, subuertit. Longo tempore etiam  
coquantur: ob id initio decoctioni impo-  
nuntur aristolochia, polypodium, hermo-  
dictylus, & ceteræ radices, semina propè o-  
mnia, fructus, ligna (nisi sint aromatica, aut  
*Mesues.* virtute imbecilla, aut superficialia) violæ  
eadem ratione diu coquantur, quando vis  
purgatrix in centro earum posita quaritur:  
rha barbarum, myrobalani omnes quando  
astringendum, acerbæ, austera, metallica o-  
mnia. Parcius verò coquantur, quorum  
virtus imbecilla, aut est superficialia, aut fa-  
cile ob tenuitatē dissoluitur, aut substantia  
est parum firmiter contexta, hoc est, rara, vt  
flos violæ nigræ, si vis leniens quaritur, ro-  
sæ, & reliqui propè flores (excepto cameme-  
lo) epithimum, adiantum album, agaricus,  
semē cucumeris, cucurbitæ, melonis, citreo-  
li, rha barbarum, myrobalani omnes, quan-  
do per hæc duo, vt rosas recentes purgan-  
dum, aperiendum, tergendum. Manna quo-  
*Mesues.* que & casia, & tamar Indi, & cetera dulce-  
dine, vel aciditate lubrica & humiditate  
multa purgantia, quia vim lubricandi aut  
comprimendi in tamar Indis imbecillā co-  
*Li. 7. me-* thio multa perdit. Aromata quoque, vt nar-  
*tho. & 6.* dus, costus, amomum, casia, cinnamomum,  
*c. ph. p. in* iūcus odoratus, calamus aromaticus, iris, la-  
*diamoro,* danum, folium malobathri, styrax, bdell-  
*& 9.* lium.



lium, opobalsamum, xylobalsamum, non *eiusdē, &*  
coquuntur: sed cum vas ab igni deponen- *i. antido.*  
dum est, aut mox ubi depositum est, ini- *in theria-*  
ciuntur. Quod autem in diacydonio zingi- *ca.*  
ber & piper post modicam coctionem & le-  
gitimam despumationem imponit, deinde  
percoquit ad mellis consistētiam, priori lo-  
co non repugnat, quia piper non esse aro-  
ma colliges ex lib. 9. comp. ph. par. Si ta-  
men hęc maceratione vires in aliquo liquo-  
re deposuerint, etiam si prius erant evanide,  
nunc volunt posse ut libet concoqui, & in  
liquore firmas & integras servari, ut in sy-  
rupo de absinthio Mesuæ.

Decies deferuescente cortina Plinio dici-  
tur in oxymelite Dieuchis, id est, rebus ipsis.  
decies sufferuefactis, seu post decem ebulli-  
tiones: sic per alios numeros, ut cum leges.  
apud doctos: Coque donec feruescat semel,  
id est, vna ebullitione. Coctio cuiq; medi-  
camento est sua pro variis scopis, citra quā  
& ultra medicamentum est deterius, pro na-  
tura simplicium, affectuum, aëris tēperatu-  
ra & forma constituenda. Nam minùs co-  
cta quò sunt liquidiora, eò gratiora, sed mi-  
nùs diu servari possunt: ut oxymel Galeni  
multò gratius, quàm quod officinæ ad mel-  
liscras sitiē coquūt, ut scilicet diu servari pos-  
sit: cum illud aëre calido vix dies 4. integrū  
serva



seruari possit. Sed de gradibus coctionis cuiq; medicamento composito conuenienti dicetur libro quarto in singulis propè compositis.

Coctio ad dimidias nullam habet ambiguitatem, siue interpreteris ad dimidia partis consumptionem, siue donec pars dimidia supersit: vtraq; enim oratione res eadē significatur. Sed coctio ad consumptionem duarum partium ex tribus scilicet vt trium ex quatuor intelligēda est, qualis multa hodie fit, vt in syrupis audies. Coctio autem ad secundas, tertias, quartas scilicet partes, & ceteras Galeno lib. 4. sanit. tuendæ in oxymelite vsurpatur ad consumptionem tertię vel quartę partis: vt oxymeli sit potu iucundissimum, & etiā in febris nullo caloris metu bibi possit: quę dos ad mellis crassitię cocto pharmacopolarum oxymeliti per se non adest. Apud Plinium autem oppositum intelligitur: nam lib. 14. c. 9. si præ coctio (inquit) fiat ad tertiam partem: & de eadem sapia lib. 23. ca. 2. vult eius coctionem fieri, donec tertia pars supersit, seu donec duę partes ex tribus coquendo sint resolutæ. Qui coctionis scopus sępe Galeno & Mesuæ exprimitur. Alibi Galenus hunc scopū neglexit, vt in diacodio, cuius finem coctionis esse vult non tertiam aut quartam, aut omnino tal

*Lib. 7. c.  
ph. par.*



talem aliquam aquæ partem relinqui, sed cum primùm capita coquendo in aqua intabuerint. In stomaticis & stomachicis, & In fine li- aliis multis fumendis scopum coctionis sta br. 6. sani- tuit mellis aut fordiū crassitiem, in multis ta. tuend. dum manu tractatum digitos nō inquinat, nec ipsis hæret. Sed hi coctionum scopi in singulis compositorum generibus libro sequenti plenius explicantur.

## A S S A T I O .

**Q**Uæ assando in vitro, sartagine, alio vase, vel patella, vel prunis, vel cineribus coquuntur, non admodū multa sunt: neq; enim raphani radix aut malum cydonium propter se assantur tātū, sed multo magis ut vires illa ellebori, hoc scammonij coquendo trahat: assando verò propter se coquuntur Medicis. Cuminum modicè frigitur in vase fictili, quod coctum in camino quàm optimè sit ad diospoliticum. Ery- Lib. 4. sa- fini semen tostum valentius sit, lib. 7. com- nit. tuend. po. ph. part. Scilla assatur in lienosis, libr. 9. comp. ph. part

Alia non pauca Medici assando seu (ut vocant) torrefaciendo præparant diuersis rationibus. Quædam enim ut ficciora cilius ad læuorem terantur, ut gumm. cragacantham, herbe, radices, flores. ~ rosæ, crocus, ubi celer vsus pulueris æquiritur: cro-

M



cus etiam papyro impositus igni vel sole  
 ficcatur. Sericum Arabibus torretur, ut pul-  
 vis fiat. Psillium vulgò, nuclei pini, & bdel-  
 lium torresunt Andromacho, libr. 6. com-  
 pos. pharm. part. Sic sideritem & perdicia-  
 dem assat Galenus lib. 5. comp. ph. p. in suo  
 dentifricio.

Quædam ut vis eorum per ignem augea-  
 tur: ut scilla tosta & in sartagine frixa ma-  
 iorem assumit acrimoniam, humiditate lar-  
 gius absorpta, ob id purgatior euadit. Scil-  
 lam gradem luto circumdatam torret Cry-  
 fermus, & corticem, ac quod in fundo du-  
 riusculum aufert, & πυρήνα, id est, nucleum,  
 accipit, lib. 9. ph. p. in splenicis.

Quædam ut vis eorum minuatur, sic cæ-  
 pa, alliū, ari radix sub cineribus assa, minus  
 acria & magis vesca euadunt. Sic aspi fructus,  
 ut poma, castaneæ flatus deponunt, quomo-  
 do elixū hordeum, & alia pleraque præter  
 fabas, nisi iis acria, ut cæpas misces. Eadem  
 ratione opium & meconiū obeius narco-  
 ticam malignitatē Apollonius & alij qui-  
 dam insignes viri torruerunt: sed quia tor-  
 rendo omnis eius in stupefaciendo sensum  
 efficacia aboleretur, non tostum Galenus ma-  
 gis castorij caliditate obtundi. libr. 3. phar.  
 part. Sic psillium assando ficcatur minus  
 aluum subactum Arabibus, cum ei solam re-  
 frigeran



frigerandi facultatem Græci dederint, non etiam lubricando purgatricem, multò minùs causticam in medulla ipsius conditam: quæ Arabum somnia videntur.

Alia virtute duplici, & interdum repugnante prædita, assando facultatem vnam vel perdūt, vel minuunt, alteram intēdunt, vt myrobalani & rha barbarum assando vim purgatricem amittunt, astrictoriā augent: & balanus myrepfica, id est, ben assando vomitoriā facultatem in humiditate nitrosa largiore positam deponit, deiectionaria remanet, vel hoc valētior, quòd à vomitoria motu contrario non impeditur.

Vt rara, aut virtutem imbecillam vel superficialiariā sortiti decoctionem longam non sustinent: sic neq; longam assationem, quæ ex illis assanda veniunt, non autē vrenda sunt, ne ipsorum facultas corrumpatur.

## V S T I O.

**Q**uòd si assatio fiat maior quàm conueniat, à calore sicco adustio est *Ari. c. 3.* maioris tantum ratione ab assatione differens: nisi hoc etiam quis ad amborum discrimen congerat, quòd vrendis simplicibus multis, vt terreis, metallicis, alia quædam miscentur, quæ vel flammæ edant, vt sulfur, sil petra, mel: vel ignis vim celerius in vrendum corpus deducat, vt pro sua na-

*li. 4. mete.*



tura ipsum corpus alteret, hoc est, rarius, leuius, tenuius, purius, splendidius, acrius, siccus, calidius efficiat.

Vrendorum medicamentorum cause sunt variae: quaedam enim vruntur, quò sicciora reddita & solutiora, laeuigari & tenuissimè comminui possint, pili, lana succida, testa ostreorum, buccinorum, purpurarū, vngues & cornua multorum animalium, & omnia & coria, & alia, quae vel ob terrosam duramq; corporis consistentiam & concretionē condensatā sunt sortita, & partes impedio crassas, quia ab ea vim quandam cogendi, vel ob lentorem immodicum, aut humiditatē aliquā vsui esse non possunt. Sic enim rectè vngues caprarum vsi ex aceto alopeciiis illinuntur: & vngues asini, & cranium hominis vsutum ad epilepsiam bibuntur: & ossium aliorū cinis ad arthritidem: & cornua cerui & caprae vsa veniunt in detifricia: & testae ostreorum in emplastra: pompholix & haematitis in collyria. Nitrum si lapidosum est, vri vult Gal. libr. 8. metho. vt ad frictionem sit aptius.

Alia verò vruntur, vt essentiae crassitiem deponant, & tenuitatem induant, aliasq; facultates igneum calorem sequentes. Metallica vrendo tenuiora euadunt, sed etiam ignis commercio mordacia & rodentia:  
clora



elota autem rosionem deponunt, & lenia prorsus redduntur. Arsenicum vstum & non vstū est causticum, sed vstum tenuioris est essentiae.

Gypsum vstum tenuioris fit essentiae & siccantius, quàm non vstum, & fit minùs emplasticum. Pumex vstione tenuitatem & aliquid acrimoniae acquirit, quam lotionem deponit. Cornu cervi & caprae vstum terget. Cinis corij veterum calceorum *Hac lib. 11. simpl.* siccet vlcera. Pili & lana succida vruntur, vt acris, calida sicca, tenuium partium fiat.

Testa ostreorum & caetera terrea vruntur, non modò vt in puluerem minui possint, sed etiam vt tenuioris sint substantiae, & cogendi quandam facultatem deponant, & cōtrariam digerentem accipiant. Cinis radicis asphodeli magis calfacit, siccet, tenuat digerit.

Abrotanum vstū, anethi radix, & anethū *Li. 6. simpl.* ipsum, *καλονύθκ* vsta siccandi vim magnam *plic.* acquirunt, & abrotanum etiam mordendi. *Ibidem.*

Alia vruntur, vt vis quaedam nostro scopo aliena in superficiem trahatur, postea lotionem separetur, quo fine haematitē & pompholygem saepe vrunt, & lauant ophthalmici, & Galenus lapidem Phrygium, vt post leges.

*Li. 9. simpl.* Alia vruntur, vt colorē nouum induant *plic.*



agro gratiorem: sic ærugine vsta Galenus  
einplastra faciebat melina, id est, coloris ma-  
li cydonij, quod viridis multos terreret. Sic  
cerussa trita vsta, rudicula ferrea mota trā-  
sit in fandyea, & fit rubra, vt ochra & auri-  
pigmentum: & ossa multum vsta albissima  
fiunt, & cornua cerui potius quàm capræ v-  
sta dentes dealbant sua substantia, non sola  
vī deterforia sine morſu, quam vtrunque  
vstum obtinet.

Alia vruntur, vt in aliā trāseant speciem:  
sic ex viperis vstis sal fit theriacus: ex cinere  
brassicæ aut betæ, & aliorū sapore nitroso  
preditorum, fit à quibusdam nitrū: ex calce  
vsta & fece vini vsta cauterium: ex antimo-  
nio vsto, sulfure vsto, cerussa vsta, calciti v-  
sta, oleum. Sunt qui alcēa, acaciam, bolum  
Armeniam, opium, & alia quædam adurāt,  
sed paruo aut nullo successu.

Vrendi modus non est omnibus vnus:  
quædam enim humore pingui prædita per  
se vruntur, vt pili, lana, cornua, vngues, ossa  
coria, hirundines, & aues quædam alia, vi-  
peræ, & alia quædam pedestria. Et hæc  
in olla noua operculo foraminulento tecta  
sunt vrenda, præsertim cū cinefacta di-  
spendi possunt: quæ verò etiam vsta manēt  
integra, vt vngues, ossa, cornua, hæc etiam  
vuis carbonibus tradi possunt, nisi quæ-  
dam



dam sint addenda, quæ vim eorum mutant:  
tunc enim etiam in olla noua vruntur: sic vi-  
peras cū substratis quibusdam medicamen-  
tis Galenus vrebatur ad falem theriacum.

Alia materiam aliquam inflammabilem *Libr. II.*  
requirunt substerni, vel aliter misceri, adi- *simplic.*  
pes, resinas, olea, ceras, mel, sulphur, & id  
genus alia, vt libro secundo Pharmacopœ-  
pœ ex Dioscoridis libro quinto & aliis  
abundè explicabimus. In præsens verò suf-  
ficere existimaui, causas vstionis, & mo-  
dum vrendi proponere, quem vno Gale-  
ni exemplo indicare nō fuerit alienum ex  
libro 4. composi. pharmac. partic. Vritur  
(inquit) lapis Phrygius ad oculorum sani-  
tatem, in minuta confractus frustula, ma-  
gnitudine nucis auellanae, & in ollam re-  
centem iniectus, luto deinde extrinsecus  
circumlito, vbi operculum imposueris per-  
foratum, vel in solo vertice, vel (quod  
est melius) etiam pluribus aliis partibus,  
vt fumosi & fuliginosi effluxus eorum quæ  
vruntur, per ea foramina efferantur. Vbi  
iam lapis totus euaserit ignitus, in vas pu-  
rum ex olla traducto butyrum superfun-  
de recens, agitando lapidis vsti particulas. Id  
fac, donec extinguantur omnes, & tunc ces-  
sa. Rursus ollæ reditū vires iterū carboni-  
bus perustis, vt nihil fumidū habeant, sem-



per euentilando, vt citius combustio absol-  
uatur. Vbi erunt igniti, nec vlla amplius fu-  
ligo emergit, effusos lapides restingue vi-  
no falerno, aut quodā rubro & odoro. Ter-  
tiò vre vt prius, & vbi ignitus erit, extingue  
melle Attico non largo. Sic alia multa sunt  
comminuenda, & ollæ imponenda, non ta-  
men omnia toties vrenda. In quo exem-  
plo obserua operculum cum vase lutari, &  
ipsum esse foraminulentum, & carbones  
perustos, & à materia, in qua extinguitur,  
igni rarefactum corpus, vires quasdam ocu-  
larias in sese trahere.

## L A V A T I O.

**M**edicamentorum lauandorum scopi  
sunt quatuor. Primus, vt partes eo-  
rum impuræ tollantur, qua ratione herbe si  
puræ sunt, etiam si intybus est, aut sonchus:  
radices, multa semina, metallica lauantur  
aqua pura & fontana: nec metuas cū Mesue  
vim superficiariam dictarum herbarū hac  
lotione dissipari, quod in rosis & floribus  
aliis metui potest: sed hi ferè puri sunt, neq;  
lotionem requirunt.

*Lib. 4. cō.  
ph. part.*

Secundus, vt facultas eorū velut in pro-  
fundo merfa & parum efficax sit euidētior.  
In cadmia etiam non vsta, & aliis quibusdā  
tergendi vim occultam lotio detegit: sic  
aloë lota ventrem magis roborat.

Tertius



Tertius est, ut virtus medicamento malefica, vel nobis in affectu praesentem incommoda tollatur, & quae expetitur, maneat: sic vsta omnia si lauentur, moderatiora fiunt, & acrimoniam vstione acquisitam depouunt, ac minus mordacia redduntur, sed ignea illa natura in aquam deposita ipsam efficiunt tenuem & calefacientem: quod vero terrenum remanet, morsus expers vlceribus humidis fit epuloticum. Ob id as vstu acre & subastringens lauari vult, ut cicatricem inducat in carne molli: in dura enim est epuloticum citra lotionem.

*Lib. 7. method.*

*Li. 9. simplic.*

Calcanthum vstum & lotum fit moderatius, lib. 4. comp. ph. part. & chalcitis, pompholyx, os sepię, & id genus alia sunt abluenda, praesertim cum vlceri, vel oculo, vel parti alij insigniter sentienti acrimonia mordax est noxia. Testa ostreorum, buccinorum, purpurarum, vsta & lota vlcera caua & fistulosa, & ob fluxionem diuturna carne implet.

Ceruinum cornu vstum lotumque dysentericiis salubre.

*Li. 11. simplic.*

Semen vrticę succo tragacanthi lauat Mesues, ne deuorando fauces & oesophagum adurat, cum tamen non vehementer calfacit Galeno, neque mordicet, sed tantum essentiae tenuitate & detergendi facultate titilet, ac ventrem subducatur. Quod ve-

*Li. 6. simplic.*



rò partes vrtica herba contactæ pruriant, id punctura fit aculeorum minimorum, quibus tota hæc armatur, magis & minùs, quos non sentias, si infernè sursum prèhèdas: sed contrà sentias maximè. Eodem succo aloë

*ibidem.* lauat, ne hæmorrhoidas excitet, vfu multo & crebro.

Lauantur eadem ratione plurima citra vstionē acria: acaciam lauat Galenus, vt acrimonia per lotionem deposita siccat sine morfu. Oleum quoque, picem, refinam, ceram, & alia permulta lauat (quod post audies) vt morsus & acrimoniæ sint expertia. Gummi Arabicum in aqua lotum ad arteriacen vult Andromachus, libr. 7. composuit.

*Lib. 7. me* pharm. part. Aloë lota minùs vacuat, magis ventrem roborat. *ibod.* Lacca lota minùs soluit, magis aperit obstructions ventriculi, hepatis, lienis.

Cyanus & lapis Armenius lotionē vim vomitoriam deponunt, & purgandi molestiam deiectionem retinent.

Quartus deniq; scopus abluendi medicamentum est, vt à liquore facultatem aliquā nouam acquirat: vt si succo rithymalli aut decocto medicamētum aliquod lauas, eius vires in se transferat: sic aloë lota decocto aromaticorum stomachicorum ventrē potētius roborat. Turbith decocto agarici lotum  
aut



aut infusum valentius est purgatorium pi-  
tuitæ: decoctum scammonij, tithymallo-  
rum, & aliorum id genus in se lotis vim  
suam largitur. Aqua vel vino albissimo *Lib. 1. cōt.*  
lauantur metallica ad emplastra alba. Aqua *ph. gen.*  
lauantur, si affluens in vlcus humor est acer  
& mordax. Vino austero, si humor affluit  
largior: aceto vel aqua marina, si vlcera  
sint tumida, & cum oris crassis & callosis  
attenuationem multā requirentibus: sicque  
in reliquis est liquor mutandus pro affectus  
& partis natura, & aliis indicationibus cura-  
toriis. Sic calida succo refrigerante, vt cu-  
curbitæ, lota frigiditatem deposita aut fal-  
tem diminuta caliditate induunt. Contra  
verò frigida succo calfaciente lota & in ex-  
teris ad portionem: quomodo in decoctio-  
nibus diximus.

Lauandi autem modus is est Galeno, vt *Li. 2. sim*  
que calfacta liquantur, nec possunt aque mi- *cap. 15.*  
fceri (qualia sunt oleū, cera, pix, resina, & alia  
quædā) modicè calefiant, ac mox infundan-  
tur in vas magnū oris lati, semiplenū aqua  
purissima omnis qualitatē experte (quādo  
scilicet medicamento nullam vim nouam  
addere volumus, sed in tantum purgare, aut  
facultatem eius mersam detegere, aut no-  
xiā tollere, sed que ex sole vel igne tepeat.  
Tum id corpus lauandum in aqua ipsa teri-  
tur,



tur, tunditur, frangitur, subigitur manibus, ut vnaquæque medicamento abluendi particula aquam tangere possit, & in ea suam acrimoniam exuere. Denique aqua hac effusa, in synceram aliâ vasi infusam recalfacta ipsa medicamēta immitte: rursus admodum diu contunde: mox idem tertio, quarto, ac sæpe deinceps faciendum, donec omnem suam qualitatem in aquam deponat medicamentum, seu donec aqua nullam ex loto medicamento qualitatem ampliùs recipiat, quam rem gustu, colore & odore cognosces.

Oleum hac ablutione non modò mordacitatem & falsuginem exuit, sed etiâ fit candidius, aquea ac rufa eius substātia separata ac deterfa: ipsum tamen lauādo minus verberabis, quàm cerā, picem, resinam, ne adeo aque misceatur, ut ægrè postea separari possit: sed ita verbera, ut dum quiescere paulisper fueris, innatans detrahare possis: non falsum verò & omphacinum lotionem non admodum indiget.

*Ibidem.* Quæ verò lapidosa & dura sunt, ut cadmia, aris squamma, æs vstum, ea tenuissimè contrita ex aqua fontana & purissima multum diuque teruntur, ea aqua subinde effusa, & pura in eius locū affusa, quoad nihil sordium medicamento in aqua innat



innatet, maneatq; aqua medicamēti qualitatum omnino expers. Quandiu enim aliquid eius aquæ ipsi innatabit, aut qualitatis eius quidpiam sensui apparebit, tam diu terendum & effundendum. Sic lithargyram, diphryges, cerussam, misy, fori, stymmi, & omnes lapides, prætereà calcē lauari vult Galenus lib. i. cōp. ph. gen. non tamen semper aqua, sed etiam vino, vel aceto, vel aqua marina, vel alio liquore, cui metallica & terrea ob innatā grauitatem facile subsident. Vult autem hæc toto die cum liquore illo medicamentofo contrita per noctem in eo relinqui: postero die manē illum abici, & alium mox superfundi: postea rursus similiter teri, & sequenti aurora liquorem iterum effundi: idq; fieri donec morsus sint expertia hæc metallica: & sordes nullas in aqua relinquant, sintq; pura & perspicua.

Quod si hæc æstate sub sole feruenti laueris, medicamentum potentiùs siccabit, tenuius erit & albius.

Lauandi scopos quidā numero definiūt, vt pompholygem & hæmatitem vtenda in collyriis oculorū septies lauāt ophthalmici medici. Armenium lapidem & cyaneum etiam quinquagies Alēxand. Trallianus & Mesues aqua buglossi lauant. Alia diutius vel parcius lauanda pro ipsorum facultate.

sub



Substantia, & medici indicationibus.

## DESTILLATIO.

**D**estillatio est humoris alicuius à planta, animali, terreo, vi caloris facta extractio. Destillatio veteribus intentata, neotericis vſitatiffima propter hominum huius ætatis mollietatem, aut nouorum morborum malignitatem, præcipuè inuēta naturæ imitatione, quæ in maiori mundo vi solis & astrorum & caloris in terra conditi vapores ex terra, præcipuè aqua & aquosis in mediâ vsque aëris regionem educit, cuius frigiditate densati in nebulâ coguntur, aut nubem, quæ soluta in pluuiam, niuem, grandinem destillat. Eadem in homine (vt animalia quædam alia catarrhis quoque obnoxia omittam) minore mundo, ex spiritu, humoribus, solidis partibus, cibo, potu, caloris aut natiui, aut etiam aduētitiij vehementia vapores tollit in cerebrū, cuius frigiditate densati in pituitâ coëunt, substantia, quantitate, odore, colore, sapore, tam variam, quàm vaporis elati & cerebri cogentis varia est natura: vt omittam, quod ei ex morain cerebro, & sæpe ex putredine vitium accedit. Tollitur autem vapor hic maximè à partium subiectarum, vt hepatis, cordis, ventriculi, sanguinis totius, calore: ex humore non minimum tamen trahitur



hitur & à capite calidiore, aut natura aut p  
regmina multa, crassa, dēsa, aromatibus far-  
ta, perque solis & lunæ radios præcipuè per-  
pediculares, aut his proximos. Collectus  
postea in cerebro hic humor, dum quanti-  
tate aut qualitate, aut vtraque ipsum mole-  
stat, à vi eius expultrice detruditur, nunc  
quà data porta in partes subiectas, nunc in  
nares, meatus purgādo cerebro à natura in-  
stitutos, nunc verò calore interno vt per fe-  
bres: nunc externo, vt per æstum liquatus  
fluit: nunc à frigore externo compressus.

Cùm autem dixi, ex terra & solidis parti-  
bus tolli vaporem, ne terram intellige ele-  
mentarem, siccissimam, durissimam, & ossa  
iā planè terrea, aut partes alias in nobis con-  
tinentes siccissimas, sed terram nobis notis-  
simam, ex elementis 4. conflata, & in qua  
humoris aliquid inest: partes item solidas  
nondum exuccas. Quando vapor mediæ  
inter aquam & aërem naturæ non tollitur,  
nisi ex corporibus humiditate aliqua prædi-  
tis, isque solum vi caloris alicuius.

Hanc separandi à re aliqua humoris ra-  
tionem imitata mortalitas, humida cor-  
pori (sic enim vocant latius vas, à quo va-  
por tollitur) imposita vi caloris tenuat  
in vaporem, qui capitelli, vel alterius fri-  
giditate coactus in aquam alueolo in mar-  
ginem



ginem capitelli inserto ferè excipitur, mox per nasum (sic enim etiam vulgò vocant capitelli partem, naso nostro figura & usu finitimam) in subiectum vas (receptorium & matellam dicunt) aliquod destillat: sed aliæ sunt & vasorum destillantium & humorum species, de quibus postea fusiùs.

Planta ergo aut corpore alio ad destillandum composito, pars eius quæ tenuari est aptior (quæ scilicet natura tenuior, leuior, rarior, liqdiior, superficialia. magis) illa primum vi caloris tenuata tollitur, postea alia illi natura propinqua: postremo id quod ceu humidum rei substantificum terreas partes glutinans, pingue & oleaginum vi ignis validiore separatur, integrumq; attollitur: quo omnino extracto, velut cinis factum corpus & dissolutum cernitur.

Quomodo calor in nobis valentior spirituosam primum humidamque substantiam, & recentem, tum carnem, tum adipem dissipat, deinde veterem, postremum insitum ipsum humorem absument ignis modo in lignis vel candelis, cineritias ac terreas faciens reliquias.

A plâta igitur omni & animali ac omnibus vtriufq; partibus aqueum aliquid crudum, ac velut pituitosum excrementosumq; primum extrahitur, mox coctius & tenua-

██████



tum magis, postremo oleaginum, quod etiam ex ossibus ipsis extrahitur, non modo ex aliis partibus solidis, nisi quod quædam essentia tenuioris vires propè vniuersas remittunt primas. Quin & chymistæ etiam ipsa elementa ex corporibus simplicibus sese vi ignis separare affirmat.

*Arrol-  
dus de vil  
la noua.*

Porro hæc omnis humorum extractio calore perficitur. Nam quæ per licium, penicillū (filtrum vocant) arenas, vas figulinum crudum, cissimbium, id est, vas hederaceum, fit humoris transmissio, destillatio non fuerit, nisi abusuè loquentibus.

Calore enim propriè dicta destillatio perficitur, & eo vel à sole, vel ab igni, vel à putredine. Vidi & à vino in lacu feruente, & à puteis cellisq; vinariis, ac aliis locis subterraneis per hyemem elatum vaporem in operculo, qualiter in olla vsuuenit, concreuisse in aquam, quomodo per hyemem animalium expiratio in proximis corporibus in pruinam cogitur. A sole flores magna quorundam industria aquam reddunt, floribus ipsis odore & gratis qualitatibus aliis proximam.

Ab igni autem, id est, à flamma, quæ ex aëre, & aëris corporibus producitur, vel à carbone ignito, qui fit ex terra vel terreis corporibus accensis, destillatio fit vel nullius

N



alterius interuentu, vel mediis aquis feruentibus, vel etiam ab his vapore, cineribus, arenis tenuibus, scoria laeuigata.

Flamma præterea ipsa vti & carbo non parum variat, non solum maioris & minoris ratione, sed etiam lignorum vel putrium, vel graueolentium, vel beneolentium, & integrorum vel viridium, vel siccorum. Adde quod clibani magnitudo, & figura, & connexio magnam vim habet caloris mutandi. Præter hæc carbo ex suffocatis & semiustis lignis graueolentiam & qualitatem quandam alienam rebus destillandis, vt coquendis & aliter præparandis imprimat: quomodo qui accenditur in panibus corticeis, quos coriarij confingunt, & qui ex carbone terre, & qui ex cespitibus, & qui ex siccatis stercorebus etiam bubulis. Sint igitur carbones omnino accensi & semiusti, vt ex eis malignitas antè expirauerit, quam his res destillanda committatur, præsertim si in corpus est recipienda: nam ad mouendorum ratio minor habenda est.

Præterea aquæ feruentes, aut ab his vapor mitius agunt in rem destillandam, quam vel ignis ipse per se, vel etiã per media alia sicca prædicta. Ob id vt Galenus in diplomate, id est, vase duplici (balneum Mariæ vocant cum chymistis pharmacopola) liquet



Liquat, calfacit, coquit ea quorū vires ignis  
 violentia dissipari non vult: sic quæ mitia  
 integriora volumus, in aquis feruētibus im-  
 posita destillamus, vel earum vapore. Quæ  
 quamuis minùs duratura purantur, sunt ta-  
 men minùs à sua natura mutata, quàm rem  
 odor pristinus declarat. Fornacem huius  
 generis habeas, cui vas æneum grande su-  
 perponatur aqua plenum: ei verò vasi æneo  
 vascula in arcum superponantur quàm plu-  
 rima possunt, in quorum fundo res destil-  
 landa infit. Alij aliter fornacem velut in  
 arcem scilicet extruunt, & eius lateribus va-  
 sa inferunt terrea, longa, fundo latiore res  
 destillandas continente intrò penetrante,  
 ore foris tanquàm lagena operculato, in  
 qua vapor per apertilem eius ventrē elatus  
 concrefcit, per os eiusdem prælongum de-  
 stillat. Talis est Godofredo Cochuo Me-  
 dicorum Parisiensium viatori optimo, ac  
 diligentissimo pharmacopola. Quæ de-  
 nique destillatio à putredine fit vel fimi e-  
 quini tam solius quàm cum calce paulatim  
 irrigata & sæpe mutata, vel corticum hu-  
 mectatorum, vel aliorum putrentium, ut  
 chymistis fuerit in multis utilis: medico ta-  
 men non est recipienda, propter causam in  
 lignis putribus & ex putredine vel alia de  
 causa graueolentibus, si præsertim intra cor-



pus est recipienda. nam ad mouēdorum minor habetur ratio.

Faciēda igitur destillatio medicis vel sole, vel igni per flammam lignorum integrorum, vel carbonum iam ardendo semiuistorum, maximēque in vase duplici, aut aquæ bonæ feruentis vapore, præcipuè quoties sumenda destillantur.

Quoniam præter hæc variāt multum vt cocta sic destillata vasorum ratione, magna in his cura est adhibenda, vt terrea sint vel vitrea potius quàm metallica: & quæ terrea sunt, ex luto sint puriore, & diligēter cocto, qualia sunt figulina nobis Bellouaca, & Britonia, & Hispanica. Vitrea autem sunt præstātoria, quia puriora & densiora, sed etiam chariora & fragilia magis, nisi paulatim incalescant & refrigeretur. In quo etiam discrimine sunt terrea. Ob id vtræque luto sapientiæ, quod vocāt, paulatim vndique circumlinunt, & siccant, quantum vasis eius, ignis violentiam attingere debet, etiam si cineribus, arenis, scoriis primū excipiēda sit. Nam quæ aquis aut ipsarum vaporibus insident, vasa munimento nullo indigent.

Metallica verò, plumbea, ferrea, area, stannea, argentea, aurea, cur damnum, in promptu Galeni ratio est, in singulis propè horum metallicorum generibus. Si enim  
aqua



aquam plumbeis tubis delatā affirmat dysenteriam generare, quis metus ab aquis receptorio & capitello plumbeo destillatis?

Adde quòd cerulla non pauca in superficie iterna plumbei capitelli vt aceto destillando colligitur, sic vi empyreumatis cum vapore plerunque etiā acri, nempe ex plantis acribus, ascendentes, ea quæ aquas ipsas inficit, & magna parte lacteas reddit, donec subsederit. Ex cæteris metallis, quæ vel ferruginem vel æruginem gignunt vasa, tantum habent periculi, quantum ferrugo & ærugo nocētior cerussa. Purgatiore argento & auro facta vt sunt innocentiora, sic paratu ob sumptum magis difficilia.

Neque corporum quæ vocant, neque capitellorum ( quæ alembica dicunt ) vna omnibus ad omnes succos destillandos est forma. Nam aqua trahitur quibusdam ex vino imposito in vas æneum magnum igni incubans. Cui collum crassum tripedale inest, & collo huic insidens capitellū etiam æneum in pyramidē fastigiatum, ambiente id velut situla aquā frigidam continente, vt celerius vapor largus à capitello refrigerato densetur, & ne ignem sic referat aqua vini. Aliis loco colli & capitelli vaporem excipit fistula ex ferro albo vel alio metallo, prælonga in multos anfractus



mœandrorum modo & serpentum contorta (vnde ei vulgò serpentina nomen est) in aquam magna sui parte merfa.

Aliis alia quoque est forma. Sic quæ corporibus seu corpulentis vasis non erectis, sed velut cubantibus imponuntur capitella limbo carent, sũntque lagenis terreis vulgaribus proxima.

Interdum capitelli forma est, vt dixi, in acutum pyramidis modo mucronata, interdum parte summa capitis modo latefcit, vt plus vaporis capiat, & largiorem aquam cogat, sed tunc forè in vas corpulentum ex vertice relabitur.

Alij vtriculos vitreos aut terreos mutuò applicant (quos musas cornutas vocant) quorum alter lutatus igni insidet, materiam destillandam continens: alter ab igni procul abest, humorem recipiens, in ambobus collis concretum.

Est quando per descensum fiunt aquæ & olea quædam, quomodo ex resinosis arboribus vrendis pix.

Sunt verò formæ vasorum aliæ prope modum infinitæ, præsertim chymistis vsurpatissimæ, de quibus plura dicere superse-  
deo, præsertim quòd intellexerim Ioan-  
nem Baptistam Montanum Veronensem  
medicum doctissimum in id opus magna  
cura



cura præcipuòq; studio incumbere, vt habeat Medicus, quæ remedia ex metallicis corporibus, & aliis arte fusoria & sublimatoria vires habent præstantissimas & efficacissimas, ad morborum pertinacissimorum curationem.

Vidi & capitella duo, vt per inferius per-  
tusum materia portio in superius ferretur,  
quod cum inferiore clauiculatim iungeba-  
tur, ne inferius lutatū esset auferendū, cum  
recens materia valè corpulento erat infun-  
denda. Hæc autē destillata vires simplicium  
à quibus separantur, retinent: nisi quod te-  
nuiora & valentiora fiunt, quò frequentius  
destillantur: quod in aqua vini ferè experi-  
mur, rarò in aliis.

Huius liquoris vires quidam alterant vel  
illito capitello aliqua materia, vt melle, la-  
dano, aliis: vel ea naso imposita, quod ferè  
fit ad odoris gratiam: moschum enim ca-  
ryophyllos caphuram, id genus alia nodu-  
lo ligata summo naso impingunt, vt per  
has materias transmissus liquor odoris sua-  
uitatem contrahat.

Vt verò empyreuma quod his inest pau-  
latim expiret, satius fuerit phialas, quibus  
hi liquores seruantur, apertas aliquādiu te-  
nere: obseruando tamen, ne interim odoris  
gratia, & cum ea virium multum exhalet.



Haftenus quæ per ignē fit medicamen-  
torum præparatio diximus, & quæ per lo-  
tionem obiter exprefsimus, quod vltæ ferè  
lauantur, & quæ alia præter hæc lotionem  
requirunt, magna parte ignem aut solem  
quoque poftulant. Nunc dicendum qualis  
effe ignis debeat, & ex qua materia.

*Libr. 1. c.  
ph. g.*

Carbones iam peruftos vult Galenus in  
vrendo lapide Phrygio, libro 4. compofit.  
phar. part. ne quid fumidum habeant. Vtq;  
emplaſtrum ex lithargyro fit albius, eligit  
idem oleum purius, lucidius, & aquam pu-  
ram & candidam. Eadem lignis peruri cœ-  
ptis vel peruftis antè carbonibus exactè in-  
cenſis coquit in aëre ſyncero, ſub dio, in ſo-  
le, quia oleū craſſum, aqua turbida, aër nu-  
bilus, vmbra, fumus, medicamēto nigredi-  
nem facile conciliant. Quæ cura in his ad-  
mouendis, & horum tantum colore natu-  
ram rei parum mutante, tãta Galeno adhi-  
bita, nos magnoperè admonet noſtri offi-  
cij, vt ignis & aëris in coquendo etiam ad-  
mouenda, multò magis ſumenda, rationem

*Li. theria  
ces ad Pi  
ſonem, &  
li. 1. anti.  
Libr. 7. c.  
ph. par.*

magnam habeamus. Hac ratione theriacen-  
ſarmentis vitis percoquit, quæ etiam boni  
ſunt odoris. Sic antidotos ſtomaticas, ar-  
teriacas, ſtomachicas, & alia omnia coquit  
in lib. compo. phar. ſuper carbonem accen-  
ſos, vel igni ex lignis ſiccis, & ob id ſine fu-  
mo:



mo: quia fumi acrimonia præterquàm quòd nullius in his est vsus, etiam incommodat suo morfu.

Tali quoque igni mel despumat, & cum tenuissimo puluere trium piperū anisi, thymi, zingiberis ad finem addēdo percoquit, libr. 4. sanit. tuendæ. Est enim despumatio hæc non mellis solùm, sed etiam aliorum quæ coquuntur, præparationis species per ignem facta. Mel enim curiosius despumatum miscetur compositioni dia trion pipe- *Li. 4. san. tuendæ.* reon, & diospolitico theriacæ, Mithridatio, *Libr. 7. c. ph. part.* & aliis, quia verò mellis acrimonia est pauca, & utilis in arteriacis, retinetur.

Nec fitis est ignem ex carbonibus accēsis omnino aut ex lignis ob siccitatē ἀναπνοῖς, id est, fumi expertibus fieri ad rectam medicamētorum compositionem, ne odor scilicet teter ex contrariis in medicamentum transeat, sed in multis quoque & ἰμπύγνυα, id est, ignea vel qualitas vel substantia vitatur, maxime in his, quibus vis est refrigeratoria. Vitatur quoq; virium in tenui substantia positarum facilis per ignem dissolutio. Ob id medicamenta, in quæ cautiones hæ cadunt, in diplomate seu vase duplici (de quo postea quoque in instrumentis pauca dicēda, coquimus: quod balneum Mariæ vulgò cum chymistis vocamus.

N 5



*Ibidem.*

Omnes arteriaca, quæ vim mitigandi, leniendi, digerendi habent, optimè in diplomate, id est, vase duplici coquuntur carbonibus aut lignis perustis, ut in magno lebere aqua calidam infusam habente, vas alterum continens medicamentum coquendum collocetur:

*Ibidem.*

ut si arteriacam coquis ex melle & terebinthina coqui in vase duplici ad spissitudinem quam coalescat: deinde galbani obolos tres adde & coque donec manus non inquinet, deinde refrigerato lruia cætera misce.

Sic coquendum oleum anethinum Galenus vult, lib. 4. sanit. tuenda: & chamamelinum, & acopum abietinum, & *δι αιγας*, Et semina, ac flores cum dies 40. vel duos, tres menses oleo maceramus, & ei ceram & resinam liquando miscere opus est, in diplomate miscemus.

*Lib. 5. cõ.  
pha. p.*

Oleum lentiscinum recens in vase duplici est reperfaciendum ad sedandum dolorem phlegmonarum in gingivis, tunica linguæ, cute torius.

Aromatibus quoque ad saporis vel odoris gratiam, & sæpe vires maiores condiunt medicamenta, iisq; nunc simplicibus, ut amomo, casia, cinnamomo, ambra, moscho: nunc compositis, ut alipta moschata, gallia moschata, pulueribus aromaticis, electariorum quorum exempla non pauca in componendi ratio



ratione per ea quæ melius compositū reddunt, audiuiti: multa quoque libro sequenti auditurus.

**T**Erere seu tundere est cōminuere crebro percussu, nō solūm humida, mollia, & virentia, sed etiam sicca, sic ut hæc in puluerem abeant, vnde Plinio trita in farinam & tusa cribratāq; dicuntur: quanquā hoc posterius etiā de humidis intelligi potest, quæ trita per cribrum vi cochlearis aut rudiculæ aut manus cernūtur: sicca verò trita cribri succussione descendunt. Vtrunque humidum & siccum scilicet *λαγνεν* Græci dicunt, id est, læuigare, seu læue & politum reddere, & in puluerem tenuem cōminuere, & cum vino vel alio liquore multum subigere: vulgus batuere, pilare, pistare, ut herbas, fructus, semina, radices, ligna, & cætera tam mollia, quā dura. Succitamen lenti *Lib. 6. cō.*  
gummiū modo, ut galbanum, hammo- *pha. part.*  
niacum, sub pistillo dilatantur magis quā læuigentur. *λύπη* etiam, id est, scindere in pila, & tundere herbas, radices, & semina li. i. antidot. in theriaces præparatione.

*Τρίβειν* quoque, id est terere non tantūm in puluerem comminuere, sed etiā de vis paffis, de bdellio, & vino, & myrrha, & aliis simul tuis & per se dicitur in libr. composi. phar. part. & g.

Utq;



Vtq; illa patent latius, sic quæ ad purgationem horum pertinent: nam lib. 9. comp. phar. part. *συννέσας τὸ ὑγρὸν*, id est, vbi facco transmiseris liquore, quod hodie de farinis & siccis ferè vsurpatur, vti saccus pro cribro & incerniculo magis siccorum quàm humidorum. *τὸ ὑγρὸν ἰθὺνίῳ συνθίσσμεν*, id est humidum scilicet oleum linteo percolauimus, lib. 4. sanit. tuend. in acopo ex semine abietis, quod etiam hodie ad sicca præcipuè terrea & metallica trāstulimus, idq; cicotrinizare speciatim dicimus, verbo opinor corrupto ex *λοσνίσην*, id est cribrare & incernere, vnde & *λοσνίον ιατρικόν*, id est cribrum medicum dicitur lib. 6. comp. ph. par.

Ducere pistillo scilicet per mortarium aut super marmor leui compressu thus, mastichen, & similia, quæ tundendo latefcunt: sic rhabarbarum per se, sic lithargyrū cum oleo vel oxelæo vel hydrelæo nutritum, & alia permulta non humida modò, sed etiam sicca, quæ trituram illam verberatu multo faciendam non tolerāt. Quin etiam metalla vel aliud quidpiam elaboramus, & pluribus diebus, præsertim in sole cum aceto vel alio simili diu conterimus, vt lib. 1. compo. phar. part.

**Li. 1. sim- ph. ca. 11.** Teruntur medicamenta præcipuè sicca, interdū & humida, multis rationibus. Nūc  
 vt



ut proutius quod potentia sunt, id actu fiat,  
 ut medicamenta potestate calida quo te-  
 nuius sunt trita, eo citius & facilius à nostro  
 calore actu calida euadunt, & nos vehemē-  
 ter calfaciūt, cum integra ipsa aut nulli aut  
 minimam calfaciēdi energiam assequi pos-  
 sint: quomodo ligna crassiora ægrius incē-  
 duntur, quam eadem minutim concisa. Pi-  
 per enim si integrum aut ore continens aut  
 deuoras, parum id calfacere deprehendas  
 etiam post tempus longum. cum eius puluis  
 tenuissimus mox ubi linguæ impositus est,  
 eam vehementer incendat. Eodem modo  
 calida omnia potestate: sic folia plantarum  
 calidarum tusa calent nobis & magis & ci-  
 tius quam si integra vel sumantur vel ad-  
 moueantur. Quæ ratione succos planta-  
 rum, & liquores, & gummi, & resinas, & si  
 qua sunt alia ex his liquidiora, tenuiora, ca-  
 lidiora reliquiis harum plantarum, ex qui-  
 bus separantur, docet passim Galenus. Idem  
 indicium tibi esto de frigidis potentia, quæ  
 uti calida, à calore nostro accipiunt, ut actu  
 frigida euadant. Sic vti ut magis siccant,  
 accuratè pollinis modo sunt læuiganda, &  
 cribro tenuissimo cernenda.

Nunc ad mitionis necessitatem. Quæ  
 enim trita sunt tenuissimè, & cribro tenuis-  
 simo creta, simul compositioni miscentur,  
 cum



*Lib. 4. fa-  
cit. tuend.*

cum partibus suis minimis se mutuò cōtin-  
gant, promptius & valentius se inuicē affi-  
ciunt, ac tandem compositi virtutem vnā,  
rectius conflant. Quæ terendi ratio in com-  
positis propè omnibus locum habet. Nunc  
medicamenta teruntur magis vel minùs, vt  
facultatem acquirāt à priore diuersam. Quæ  
enim tenuissimè sunt tusa, & cribro tenui-  
creta, maximè in totum corporis habitum  
digeruntur: ediuerso crassiora in vêtre hæ-  
rent, quia angusta venarum ora subire ne-  
queunt: ob id diospoliticon crassius facio,  
cùm aluū per id ducere studeo: tenuissimū  
verò & minutissimum pollinis modo, cū  
vrinas mouere. Cuius præcepti in omnium  
medicamentorum compositione memini-  
se oportet. Hæc Galenus. Eodem fine rha-  
barbarum, asarum, cyminiū, & alia permul-  
ta negligēter trita aluū subducunt: tenuius,  
verò comminuta in corpus prōptè subeūt,  
& venas perreptant celeriter, vrināsq; mo-  
uēt. Eadem ratione facilius est impleri po-  
tu quā cibo: aqua item & oleum terebin-  
thinæ vel aliorum hepar, lienem, renes pur-  
gantium celerius munere suo funguntur,  
quā ipsa rerū corpora. Sic scammonium  
tenuissimè terunt, si medicamentis corpus  
peruadentibus miscent: crassius autē, si ca-  
tapotiis, aut aliis, quæ diu in ventriculo ma-  
neant.



nere volūt. Aerugo item chalcitis, misy, sori, chalcanthum, æris squama, & alia similiter valētia diu ex aceto trita morsum & rofionem obtundunt, vires augent: quia cū partium sint natura crassiorum, vim suam in altum vsq; corporis curandi non demittūt: ob id vt tenuiora fiant, diu ex aceto terenda sunt & dissoluenda, vt sic curiosē attenuata ad penitiora vsq; penetrent, & corporis meatus pertranseant, nusquā inter eundem retenta: & si calidioris sint naturæ, sine morsu munere suo fungentur.

Quomodō humores corporis tenues facile citra rofionem perspirant, crassiores retenti & obstruentes grauando aut rodendo: si acres sint, molestant. Ex multa autem tritura in sole cum aceto quippiam vstioni ab igne simile rebus ipsi accedit, tamen calorem igneum non assequuntur. Vsta tamen & sic trita ex aceto ac læuigata multō præstantiora sunt. Sic aromata (quæ *ἰδὴ*, id est, species Paulus & Actuarius sepe appellant) negligenter tunduntur, cū vires eorum diu integræ sunt seruandæ: tenuissimè verò, cū his viribus in præsens est opus. Præstantius quoq; est dentifricium, quāto exadiūs simplicia sunt trita, Galen. lib. 5. comp. phar. part.

Terendorū verò nō vna est natura. Quæ  
enim



enim substantia sunt tenuia, si sunt sicca, promptè in partes minimas disteruntur, uti humida mox per se sparguntur, & altè corpus imbuunt: crassa vero contrà. ob id illa minùs diu, hæc longiori tēpore in eundem scopum terenda sunt. Quapropter metallica & terrea cætera quod crassa sūt, etiam post vstionem maximè diu sunt terenda, præcipuè quæ oculis sunt imponenda collyrio vel sicco vel liquido. Qualiter si tenuia & rara, & imbecilla ac superficiaria facultate prædita, parum diu sunt coquenda: contraria diutius.

Rara quoq; mediocriter & friabilia parum diu terenda sunt, ut rha barbarū, scammonium Antiochenum (quod laudatissimum Mesues existimat.) Accuratiùs densa & lenta mediocriter, ut aloë.

Rara mediocriter addidi, quòd quæ sunt immodicè rara, ut agaricus, colocynthis, per se in puluerē tenuem cōminui nequeūt, sed vel cū aliis sunt puluerizanda, aut priùs, in trochiscos fingenda, siccandaque. Tunc enim nullo negotio tenuissimè teruntur: quæ res facit, ne ventriculi & intestinorum tunicæ præ mole hæreant, humorèq; superfluo imbuta molestiam his partibus afferāt magnam ex oppressione, & diuturnam ex pertinaci adhæsu.

Lenta



Lenta quoque mediocriter dixi, quòd quædam ex his etiam ob siccitatem medio criter iam dura, nondum tamen per se pulverizari possunt, sed sub pistillo lateſcunt. Quapropter aut vetustiora sunt eligenda, aut sole vel igni siccanda, aut cum aliis ficcioribus & friabilibus & tenuioribus terenda, vel aliquo liquore idoneo sunt dissoluenda. Sic tragacantha, gummi Arabicum, thus, myrrha, mastiche, sarcocolla, styrax, bdellium, euphorbium, ladanum, succus glycyrrhizæ, & alia gummi, resinæ, liquores, succi, dū vetustate aut aliter sunt siccata in puluerē terendo, aut pistillo diu multumq; per mortarium ducendo comminui possunt, vel per se, vel cum ficcioribus: cum verò sunt recentia, melius aliquo liquore dissoluuntur. Eòdem pertinent semina quædam, ut cnicus, lini, canabis, cydoniorum, citri, bombacis, melonum, cucurbitæ cucumeris, citreoli, amygdalas utrasq; & fructus quosdam, ut dactylos, baccas halicacabi ob lentorem & pinguedinem, quia etiam ducendo lateſcunt, non terenda esse, sed vel scalp pro, vel cultelli acie identidem verberata minutim inciduntur, ut in compositiones veniant rota sua substantia,

Adde quòd ut coctione longa non modo vires imbecillæ resoluuntur, sed etiam

○



empyreuma coctis rebus imprimitur: sic  
lōgo attritu corporū durorum pistilli, mor-  
rarij, & terendorum etiam cum humore (vt  
scriptum prius Galeni testimoniū probat)  
calorem in terendis præsertim diu medica-  
mentis vel gignit, vel auget, qui medicamē-  
torum facultatem mutat: & si imbecilla  
est, dissipat, difflatione adiutus per agitatio-  
nem illā excitata. Quam caloris ex attritu  
durorum generationem planē indicat fari-  
na, quæ ex breuissimo contactu molarum  
calida tamen in subiectam arcā decidit. Ob  
id thymum & hyssopum vt coctionem, sic  
trituram mediocrem sustinere scribit, & in  
aliis similiter.

## P V R G A T I O.

**P**urgātur, seu vt vulgò loquuntur, mun-  
dantur medicamenta quædā intus, quæ-  
dam foris, quædam intus & foris, quædam  
nusquā. Intus, à seminibus, vix passæ, si  
Medicus imperarit, myrobalani omnes (ex-  
ceptis Indis enucleatis, & magna ex parte  
emblicis) vuarhois, nisi in decoctū veniat,  
quando nec pruna passa, nec myxa, nec zi-  
zipha purgantur à nucleis: nisi quòd expres-  
sa pruna nucleos in colo relinquūt: myxa,  
zizipha nō exprimuntur. Foris, quæ excorti-  
cātur, vt semē cucurbite, cucumeris, citruli,  
melonū, cnici, ricini, dente, vngue, cultello,  
forpi

*Semen ta-  
mē cucu-  
meris are-  
factum et  
cōtusum.*



forpice purgatur. Semen quoq; citri, limo- *cribra*  
 num, aranciorū, pæoniæ vtriufq; , staphidos *tum vſur*  
 agrię, & nucleus ſtrobili, id eſt, pineoli, piſta *pat lib. 8.*  
 ciorum, bombacis, ceraſi, perfici, anacardo- *ſim. Gal.*  
 rū, nucis Indice, cultello, vnguibus, malleo.

Bacca lauri in emplaſtro de meliloto.

Ficus in diacnico Gal. li. 5. ſanitur tuenda.

Amygdala vtraq; ſi in conſecturas reci-  
 piuntur, aqua calida parum macerate, facile  
 digitis depellantur, vt ſtrobili & piſtacia, &  
 alia ſimilia, ſine aqua in marcipanes & con-  
 dituram recipienda. Si verò in oleo expri-  
 muntur, integra prius tūduntur: ſi in deco-  
 cta veniunt, integra iniicis: ſi verò foris ad-  
 inouenda ſunt, cum cute teruntur: omnia  
 prædicta foris non purgantur. Hordeum,  
 triticum aqua calida parū diu maceratum  
 piſtillo ligneo in mortario æreo promptè  
 deglubitur, zea & oriza, molis: zea iterum  
 vt hordeum purgatur. Radices quædam  
 ſolū recentes abluuntur, & circuncifiſis ra-  
 diculis ſeruantur vel vſurpantur, vt cicho-  
 rij, ruſci, aſparagi, bugloſſi vtriuſque.

Aliæ vtendi tēpore cultello raduntur, vt  
 radix glycyrrhizæ, gētianę, rubię, pæoniæ,  
 tormentillæ, & doronici, tunici, vt vocant.

Quarundam ſuperficies tota circuncidi-  
 tur, & ſi quid intus inutile apparet, excidi-  
 tur, vt rha barbari, agarici, ireos.



Intus & foris simul, mala cydonia in dia-  
cydonio. Daſtyli etiam edēdi, colocynthi-  
dis fructus cortice & ſemine purgantur, vt  
ſola maneat medulla ſeu caro.

Radices quæ intus habent ſubſtantiam  
lignosā, vt raphani, apij, petroſelini, ſœni-  
culi, ſaxifragiæ, oxalidis, peucedani, ellebori  
vtriuſq;, pſeudodiſtamni vulgaris, pityuſc,  
id eſt, turbith, eſulæ, ſcillæ, capparis, tamari-  
cis. Scilla etiā nucleis & agnatis purganda.

*Lib. 9. cō.  
ph. par. in  
lienofis.*

Tamen cyperus, enula, coſtus, acorus ve-  
rus, integra teruntur aut coquuntur.

Ellebori radicū fibræ aqua paulūm ma-  
cerātur, poſt cortices extracti in vmbra ſic-  
cantur in vſus: vt & zingiber, calamus aro-  
maticus, caſia, cinnamomum, galanga vul-  
garis.

Et baccae myrti, iuniperi, interdū etiam  
baccae oxyacanthæ, aſparagi. Piper o-  
mne, carpobalaſamum, cubebæ, cardamo-  
mum, amomum. Semina ſœniculi, apij;  
cari, ameos, dauci, cumini, ſeſeleos, cardui  
benedicti, lini, ſœnigræci, aniſi, anethi, papa-  
ueris, portulacæ, lactucæ, cichorij, pſyllij, mi-  
lij vtriuſq;, & cetera ſemina parua nec intus  
nec foris mundantur à pharmacopola, ſed  
vel trita vel integra vſurpantur. Ex magnis  
item cicer, faba, lupinus, eruum, vicia, ſemē  
agni (manibus confricandum, vt depoſita  
canicie



canicie nigrescat) hipposelini, cydoniorū.

Gummi quædam & succi solidi, & liquores, & resine, terra, foliis, scobe, ligno, cortice suæ parentis adulterati purgatur liquore idoneo fusi vel dissoluti, postea colati.

Quorundam seminum sola medulla in compositiones recipitur, ut cnici lib. 5. sanita. tuendæ: melonum, cucumeris, cucurbitæ, citruli, & aliorum magnorum. Tamen solus cortex rhois est vsui, ut multarum radicū, apij, eleoselini, fœniculi, raphani corde lignoso execto. Semina illa sole ficcata tere leuiter in mortario, frica manibus, cerne cribro medullā solam transmittēte, si non succedit, forpicibus, vnguibus, dentibus, cultello excortica. Semen tamē lathyreos, daphnoidis, & alia id genus non pauca vno die insolata, aut ignita patella parum assata rupto cortice promptè exilit. Amygdalæ, strobili, pistacia, nuces, aqua frigida per noctē, vel calida parum diu macerantur, aut ignita patella tosta excorticantur.

INSTRUMENTA PHARMACOPOLARVM PRÆCIPVA.

Ο Λμ & θύρα Gal. in præparatione theriaces, libr. 1. antidotorū sæpe: *δυνάμις* Damocrati in cōpositione Cyphios, libr. 2.



antid. Gal. est mortarium seu pila. Ea autē est lignea, terrea, lapidea, marmorea, eburnea, vitrea, aurea, argentea, ferrea, plūbea, stannea, ærea, multiplex, & ex quavis materia: magna est pila, vel parua, vel mediocris. Ex eadem materia esse possunt *ὑακροι*, id est, pistilli, & in vsus eisdem *ἄχλοι*, id est, vctes, vt in præparatione theriacis Galen. & magnitudine proportioni pilarum respondent. Et suæ materiæ ferē applicātur lignei pilæ lignæ, ferrei ferreæ, plūbei plumbeæ: tamen lignei etiam pilæ lapideæ, eburnæ, æræ in quibusdam terēdis, aut frangendis, aut deglubendis applicantur. Ferrei autem propē soli mortario æreo hodie seruiūt ob vtriusq; duriem. Ob quā pilas Aegyptias commendat Galenus in præparāda theriaca: quoniam, inquit, cū durissimæ sint, nihil inter cōtundendum ex earum substantia in ipsa quæ leuigantur, exteritur. Quapropter etiā hodie margaritas & alia sic dura super lapidē porphyrium terunt, nō in mortario æreo aut ferreo, vt à quibus multum substantiæ in margaritas trahatur & deradatur. Lapidei, marmorei, vitrei fragiles maximē fuerint, vt & eius generis mortaria, quorum crassities fragilitatem penfet.

ἡ δὲ *δοιδυξ*, id est, cochlear paruum, magnum, ad commiscendum, subigendum in  
mort



mortario, vt in theriaces compositione, & *In fine li.*  
ad eximendum trita, vt mox ex Critone di- *l. antidot.*  
fces. Crito pilam in qua teruntur medica-  
menta, pelle tegit duplici in medio forata,  
quantum pistillo terenti, & hoc ablato, ma-  
nui & cochleari satis pateat ad eximēda quę  
trita sunt, vt incernantur. Altera illi ex su-  
perna parte injecta, quę foramē habeat mi-  
nus, quātum scilicet soli pistillo satisfaciāt.  
Hęc autē tollitur, vbi tenuissima medica-  
mēti portio in puluisculum soluta subsistit.  
Item quod cretū est tegatur, donec motus  
eius constiterit, tunc cribrum aperi. Quam  
consuetudinem hodie vellem in vsu nostris  
esse, præsertim cū pretiosiora terunt.

Sint autem tam pilę quā pistilli & ve-  
ctes puri exactē, & nihil æruginis habētes,  
cū ferrei sunt, vel ærei, vel argentei. In pi-  
lis per pistillos quassantur, terūtur, molliun-  
tur, subiguntur, miscentur, ducūtur materię  
medicę ad varias compositiones. Quę-  
dam molis etiam exiguis sinapi & segetū  
modo teruntur quibusdam locis.

Diabesafa stanneo vase reponi vult He-  
ras. lib. 8. comp. phar. part. Theriacam verò  
non ligneo, sed pretioso aliquo vase vult  
seruari lib. antidot.

Medicamētum stomachicum vase cor-  
neo reponitur, lib. 8. comp. ph. part. Tere-



binthina vase ex ferro albo aut vesica sicca melius seruatur, quàm ligneo, lapideo, vitreo, terreo duro etiam seruatur.

De his  
paulo an-  
tè.

Κόσιν & κοσινίον ιατρικόν, id est, cribrum medicum, Gal. lib. 6. comp. phar. part. σάκη & σάκνιον, id est, saccus Medicis, & hodie vulgo Gallorum dicitur, vti & Hebræis: vnde κοσινίζειν, id est, cribrare, & σακκίζειν, libr. 9. comp. ph. part. Cribrum est setaceum, stamineum, vt nobis dicitur, ex pilis caprarum, lineum, sericum, ex ea scilicet panni serici specie, quam tafetū vocamus: & ex his quædam rara, alia dēsa, alia amborum mediā. Item quædam parua, alia magna, alia mediocria.

Τὸ ὑγρὸν ὀθονίον διηθείσασιν, libr. 4. sanit. tuend. id est, humidum linteo percolamus.

Vasa oris latioris & angustioris permulta sunt necessaria ad continendum, macerandum, infundendum, coquendum, assandum, vrendum, reponendum, cacabi, lebetes, pelues, patellæ, frixoria, hydriæ, pocula, & hæc lignea, lapidea, marmorea, ex alabastro, achate, terrea solū vel etiā plūbata seu vitrata, stīnea, ferrea alba, ærea rubra, erea flaua, ærea stannata, argentea, aurea. Vasa tamen è stāno & argento parum purgato vitanda, quia illud plumbi mistura adulteratū est, hoc citò ducit æruginē, Gal. libr. 1. antid.

Et



Et in his quædam vtrinque ansata, alia sine ansis, alia vnicâ ansam nacta, alia item caudata à manubrio his vocantur, alia sine cauda, alia denique magna, alia parua, alia mediocria.

Inter terrea vasa sunt optima Valentina ex Hispania, pocula intus candore, nitore, læuore alabastritis proxima, foris pictura nitenti mirè variegata, conseruis, syrupis destinata.

Præter hæc ἀγγεῖον δίπλωρον libro 1. antid. quod ibidem paulò pòst vocat τὸ ἐν ἑστῇ καὶ ἀγγεῖον τῷ ὕδατι: in methodo autem vocat δίπλωμα, nos ad verbum vas duplex, vulgus balneum Mariæ cuiusdā chymistidis, magni vsus ne frigida calore perdatur, aut pretiosa vrantur, virésq; eorum vanescant, quia calorem per vas aqua calida plenū & igni superpositum recipit. Lebetes prædicti præcipuè ærei stannati ad medicamēta coquēda fornaci exemptili incensos carbonēs habenti imponūtur, rudiculis (quæ σπάθαι Galeno dicuntur libr. 1. comp. ph. gener. vulgò spatulæ) nunc ligneis, frequētius ferreis magnitudine variis mouētur ac miscentur. Sic lebetem stanno inductum coquendo oleo Sicyonio adhibet Dioscor.

Pyxides medicamentis siccis seruādis simplicibus & compositis ferè sunt addictæ, &



hæ sunt vitreæ, terreæ, plurimum lignæ ex trunco solido tornatæ & cauatæ, vel assiculis coagmentatæ, sed illæ semper rotundæ: hæ vero nunc rotundæ, nunc quadrangulæ: nunc etiam quadratæ, nunc ouales, nunc ex rectis lateribus in extremo rotundantur: at vero ambæ tam tornatæ scilicet quàm sutiles magnitudine plurimum variant. Pyxide lignea pulueres quosdam reponit Gal. lib. 6. compo. ph. part. Sub abaco supputatorio multæ cōduntur arculæ exemptiles, seminum multorū & aliorū velut loculamenta.

Sunt & stateres magnitudine varia plurimi, & mēsuræ, & pondera, capacitate & grauitate multum variātia, ac etiam forma inter se differentia, de quibus postea.


In marmor seu lapidem durissimum, alium, penidia & saccharum rosatum effusa paulatim concrescunt. In porphyrio lapide seu squama maris, vt vocant, seu vitro, margaritas & lapides pretiosos ducendo paulatim comminuunt. *Λοπάς ἐρυθρὰ χαλκή*, id est, patella æris rubri, in qua Aescchrion cancos vrebatur ad morsus canum rabidorū. Cuminum frigit in vase fictili, quod quàm optimè sit coctum in camino. Quæ enim exactè penitusq; cocta non sunt, hæc lutosa potius quàm figulina sunt, & qualitātū suarum non nihil medicamento imprimunt.

DE



PRAEPARATIO. LIB. III. 587  
DE PONDERIBVS ET MEN-

*suris, quae Galeno praecipue, & aetatis  
nostra Medicis in usu sunt  
sequentiore.*



EDICAMENTA ferè sunt sic-  
ca, aut liquida: illa magis ponde-  
re, haec potius mēsuris metimur.  
Tam pondera verò quàm men-  
suræ, quauis propè sunt infinitæ, etiam ho-  
die pro diuersitate regionum & consuetu-  
dine vtentium, tamen in ordinem ac nume-  
rum referre conabimur. Primùm autem  
pondera quanta poterimus maxima breui-  
tate & perspicuitate explicabimus, quòd ho-  
rū frequētior est vsus in medicamētis cōfi-  
ciēdis: ad mēsuras postea trāsibimus. Quo-  
niam autē medici fere Attica obseruatione  
vtuntur, vt lib. 21. cap. vlt. ait Plin. non alie-  
num à re proposita fuerit, pondera primùm  
Attica enarrare, & à minimis ad maxima p-  
media ceu per gradus quosdam procedere.

Λεπτέρ, id est, minutia omnium mini-  
mum & indiuisibile.

Χαλεῖς, id est, areolus vel areolum, pen-  
dit septem minurias.

ὀβολὶς, areola sex.

ἡμιόβολος, id est, semiobolus, areola tria.

γραμμα, id est, scriptulum obolos duos.

δραχμή, scriptula tria, seu obolos sex.

Μνᾶ



*μνᾶ*, Latinis Mina, drachmas cētum, seu vncias duodecim cum dimidia. Hæc autem est mina maior seu Solonis, quem Plutarchus pondera & mensuras auxisse scribit, cū mina vetus & minor nunc abolita, esset tātū drachmarū quinq; & septuaginta.

*ἡμιμναῖα*, id est semimina, drachmas 50.

*τάλαντον*, talentum, parū quidem, minas sexaginta: magnum verò, minas octoginta, seu libras octoginta tres & vncias quatuor. Nā mina Attica drachmis quatuor est grauior quàm libra Romana, licet Plinius *μνᾶν* Græcorum medicorum ferè libram verterit: quæ quatuor drachmæ octuagies collectæ libras tres & vncias quatuor complent. Hócq; modo est proportio sesquitertia, vt inter minam magnam & paruam, sic inter talentū magnum & parū vtrunque vsitatum Græcis. Romani verò talentum non habuerunt. Cū autem Comici & Virgilius talenti vtriusque meminerunt, Græcos, à quibus sua sumpserunt, imitantur, vt etiam Liuius ex Polybio locum vertens, & Festus & Gellius: talentum autem Atticum minus hi intellexerunt.

*ἡμιτάλαντον*, id est dimidium talentum.

*διτάλαντον*, id est, duo talenta.

*τρίτάλαντον*, id est, tria talenta.

Cū item Latini dicunt, talentum esse  
sex



sex milium denariorū, per denarios drachmas Atticas ( quarum sex milia Atheniensibus talentum complent) intelligunt.

Hæc verò pondera Atheniensibus etiam nummorum genera fuerunt, quæ si iusti erant ponderis, prædicta pondera æquabant. Nullum enim ferè ponderis genus tã Græcis quàm Latinis fuit, quo non etiã numisma, vel summa quædã rei nummariæ significaretur: sed  $\gamma\rho\acute{\alpha}\mu\mu\alpha\lambda\alpha$ , id est, scriptula ponderis tãtū non etiã rei nūmariæ Atheniensibus rationē habuisse videntur. Hæc ordine compositorio recensuimus: resolvere contrà & diuidere potest, qui volet a summo talēto per media alia ad ipsum vsque  $\lambda\epsilon\pi\tau\epsilon\rho$  indiuisibile descendendo, quem nos ordinem iam in ponderibus medicis sequemur.

$\mu\nu\acute{\alpha}$   $\iota\alpha\lambda\epsilon\mu\eta$ , mina medica vncias cōtinet sexdecim, vt docet Diosc. aut quisquis ille fuit, libro de ponderibus, & Galen. libro 2. comp. ph. gen. in emplastro Heræ, & emplastro quarto Andromachi: seu drachmas centum & viginti octo, libro 4. eiusdem in emplastro Philoxeni medici, & lib. 1. comp. ph. gen. Mina quibusdam videtur continere vncias viginti, aliis sexdecim.

Alia est mina maior vnciarum viginti, seu drachmarum cētum sexaginta: & hanc quidam Alexandrinam dicunt, ac ex emplastro



stro Moschionis, & ex emplastris albis & viridibus Andromachi, libro 1. & 2. comp. ph. gen. In usu fuisse medicorum apparet, praesertim eorum qui medicinam Alexandriae exercuerunt. Vtri Attica, quæ unciam est duodecim & dimidia, seu drachmarum centum in usu magis fuit medicis, qui vel in Græcia egerunt, vel antè scripserunt, quàm res Romana floreret. Medica verò (quæ est unciam sexdecim, seu denariorum centum 12. seu drachmarum Atticarum centum viginti octo) medicis Romæ agentibus, vel in Græcia, sed Romanas res iam florentes cognoscentibus.

- Lib. 3. cõ.* *Αἰτρά*, id est, libra medica, tam mensuralis  
*phar. gen.* quàm ponderalis, qua medici Græci pariter ac Latini vtuntur in suis compositionibus, estq; unciam duodecim, seu drachmarum sex & nonaginta, Gal. lib. 4. sanita. tuenda, & in compositionibus pharmacorum passim, & Diosc. Sed negotiatoria est unciam sexdecim, non vtenda in compositionibus veterum. Libram & unciam vnà cum imperio Romano Græci accepisse videntur, hisque vocibus parum: vt apparet, corruptis vtuntur, scribentes *Αἰτρά*, id est lib. & *δρυγία*, id est, uncia, idem omnino pondus significantes quod Romani. Nā *Αἰτρά* & *ἑξας*, *δρυγία* nomina sunt Romana.

*ἑμίλ*



ἡμιλίτρον Galeno pendit drachmas octo & quadraginta: Selibra dicitur Liuius & Celso: etiā libræ semis dicitur Celso & Scribonio.

Pondo per se seu absque alio pōdere scriptum, est libra, sed cum alio ponderis vocabulo, id significat quod Græcis σταδμῶν & ὀλκῆ, hoc est, pondere, ut pondo libra, pondo vncia, ut à libra & vncia mēsurali separatur, cui μέτρον, id est, mensura, eadem ratione Græci addunt, ut à ponderali separēt. Romani tamen vsu eius frequentiore, etiā his ponderibus, quæ ambigua non sunt, pondo addiderunt, ut pondo denarij duo, tres, quatuor in Celso.

Idēque & Scribonius, pōdo semis, pro selibra scribunt aliquando.

Dupondius, & dua pondo, & trepondo, ut bilibris, trilibris, sed etiam quadrilibris. Pondo dua etiā Scribonius aliquoties scripsit. Centum pondium item, & centū pondo, & centena pondo, pro massa ferrea aut plumbea centum librarum.

Libræ partes sunt: Vncia, pars eius duodecima. Sextans, id est, sexta eius pars, scilicet vnciæ duæ, vnde à Galeno ἑκτον τῆς λίτρας dicitur, ut Quadrans, id est, tres vnciæ. τέταρτον λίτρας: & Triens, id est, vnciæ quatuor, τὸ τρίτον τῆς λίτρας, τὸ τ' ἑστὶν, ὀγγάκιον. Galen. libro 5. comp. ph. gen. Quincunx, quia



quinque vnciæ. Semis, seu selibra, sex. Septunx, septem. Bes, octo. Dodrans, novem. Dextans, decem. Deunx, undecim. nomina Celso, Scribonio, Columellæ frequentissima, & Latinis medicis vsurpanda.

οὐγγία, vncia, drachmis Atticis octo, seu denariis Romanis septem cōstat, Græcis & Latinis eaq; ponderalis, Gal.lib. 6. cōp.ph. part.& libro 4. sanit. tuend. vbi libræ vnius partem tertiam, id est, vncias quatuor dicit æquare drachmas triginta duas, & alibi sæpe in compositionibus medicamentorum particularium & generalium. Libro autem octauo composuit. ph. part. in hiera Themisonis vnciæ tribuit drachmas argenteas octo, vel septem & semissem. Ibidem drachmam in Andromacho & Asclepiade pro drachma argentea accipiendā censet, vt recentiores medici propè omnes ætatē suā nominare solebant, & drachmā appellare, quod Romani *δραχμιον*, id est, denarium vocabant: sed quid inter drachmæ & denarij pondus re vera intersit, paulò post dicemus.

Tamen qui vnciæ drachmas tantum septem tribuunt, per eas denarios intelligunt. Qui septem drachmas & dimidiam, hi drachmam leuiorem denario aduertisse videntur, non tamen exactè differentiam expressisse: quàm sunt assecuti, qui  
vnciæ



uncia tribuunt drachmas octo, non autem denarios octo. Multò minus drachmas nouem cū face Arabica sua se opaca crassitie etiam nunc tegente. *ἡμιόυνιον* semuncia, id ex, vncie medietas. Sescuncia Celso, id est vncia vna & dimidia. Vncie partes præter dictam semunciam sunt Duella, seu bing sextulæ. i. scriptula octo, vncie pars tertia. Nam vncia pendit scriptula. 24.

Sicilicus vel Sicilicum, quasi semūciam secās, vt festo Pompeio videtur, pars vncie quarta, nam drachmas duas valet.

Sextula est sexta pars vncie, id est, scriptula quatuor, quæ sexies iuncta complent scriptula 24. seu drachmas octo, seu vnciā. Tamen Ruellius ætatis nostre doctissimus medicus *ἑξάγων* in Actuario vertit sextulam in aurea antidoto Alexandri, quo loco eius antidoti scriptores barbari habent omnes drachmam. Excusatur autem Ruellius vicinitate grauitatis, quæ sextulæ est cum drachma, quam vnico scriptulo superat, vt in drachma post & denario dicemus. Illa autem partium vncie nomina Volusio & Fannio in ponderibus, & Balbo de agrimensoria ad Celsum sunt vsurpata, & Ruellio in Actuario, cæteris medicis non appellata.

Drachma denique est vncie pars octaua, vt denarius septima: de quibus dicere tempe

P



stium est. Ne Nicolao Salernitæ credas,  
 vnciæ drachmas nouem tribuenti nulla ve  
 terū autoritate, cui & Seruitor nescio quis  
 scriptor triobolaris subscribit: hōsq; duces  
 magna nostrorum pharmacopœorum na  
 tio sequitur, nulla ratione alia, quàm quòd  
 ab illis est hoc scriptū, nulla aut ratione aut  
 scriptorum veterum autoritate sese tuenti  
 bus. In his tamē qui sunt humaniores, & iu  
 dicio meliore Græcorum placitum sequun  
 tur. Quot enim drachmas Mesues vnciæ de  
 derit, probari nequit. *Δραχμή*. drachma  
 Attica Atheniēsis, & denarius Romanus  
 nummus erat argenteus, & ab eo pondus  
 eiusdem cum suo vtrunque nummo graui  
 tatis: quia tamen vnciam Græcis & Latinis  
 æqualem drachmæ octo complent, denarij  
 verò tantum septem, denarius est paul.  
 scilicet vna septima. grauior quàm drachma.  
 Vnde libra ponderalis Celso, Plinio, Scri  
 bonio est denariorum quatuor & octogin  
 ta. Nam libra est vnciarū duodecim, in qua  
 rum singulis sunt denarij septem, qui duo  
 decies sumpti cōplent quatuor & octogin  
 ta denarios. Eadem libra Græcis est drach  
 marum sex & nonaginta. Libra enim vn  
 ciarum est etiam illis duodecim, in quibus  
 singulis drachmæ octo, quæ duodecies iun  
 ctæ efficiunt drachmas sex & nonaginta.  
 Cūm.



Cum igitur paulò grauior denarius esset, quàm drachma Attica, pōdus autē vel numisma Græci interpretes nō haberēt, quod exactè denario Romano responderet, Latina in Græcū sermonem versuri, per id quod proximum esset, ac non multò leuius, drachmam scilicet pro denario reddiderunt, vt Plutarchus, Galenus in Scribonij medicamentis compositis, quę citat lib. de compositione pharmacorum.

Contrà Latini dum Græca verterunt, pro drachma Attica denarium tam pondus quàm numisma verterunt, quia pars vnciæ octaua apud Romanos nomine proprio carent (nisi cū Balbo & Latinis multis drachmam quoque Græcorum more appelles) vt Aulus Gellius Festus, Liuius libro ab vrbe condita 44. Polybij locum recensens. Sic drachma Attica denarii argentei habere pondus dicitur Plinio libro 21. capitulo ultimo, & alibi, quoties medica transfert, pro drachma denarium vertit. Nec mirum est id eum fecisse in ponderibus minimum diuersis drachma & denario, cum *μνᾶρ* Atticam ( quæ vnciarum est duodecim & dimidia, seu drachmarum centum ) verterit libram, quæ vnciarum est tantum duodecim seu drachmarum est tantum sex & nonaginta: drachmis scilicet



cet quatuor leuior, quàm mina: & vnciis quatuor leuior quàm mina Alexandrina.

Hæc enim differentia illis visa est parui esse momenti, nisi si qua essent validis admodum viribus. Non habet igitur drachma Attica denarij pondus, neque libra minam æquat. Quoties verò Romana tractat Plinius, aut denario utitur, aut drachma pro pondere denarij: ut cum ait, è libra denarios quatuor & octoginta signari: tot enim surgunt denarij vnciarum duodecim, seu libræ vnius. In mina autè Attica denarij sunt propè octo & octoginta, siue drachmæ centum. In aliis duabus minis medica, quæ vnciarum est sexdecim: & Alexandrina, quæ vnciarum est viginti, numerus maior denariorum & drachmarum. Et Liuius libro quadragesimo quarto ab vrbe condita, drachmas quatuor Atticas dicit trumferè denariorum pondus habere. Nam tres denarij faciunt tres Atticas drachmas, & prætereà tres septimas vnius denarij, non tamen quatuor drachmas integras efficiunt: ob id Liuius rectè addidit, ferè. Quod si vnciæ tribuas tantum drachmas septem (quod Galenus quosdam facere scripsit, ut antè diximus) pro denario tunc est accipienda drachma, cum drachmarum octo pondus idem faciat, quod septem denarij: hocque



que modo denarius drachmam explet, & prætereà partem drachmæ septimam. Nec audiendus est hoc loco Cleopatra, dicens, Italicum *Δραχμιον* habet drachmam vnā, si exactum id velit: nec Scribonius Largus, qui in præfatione ait, æquè denarios quatuor & octoginta esse in libra Romana, quot drachmæ sunt in libra Græcorum, nisi drachmam pro denario vsurpet. Sic enim vnciæ dabit tātū drachmas septem, vt denarios septem alij omnes dederunt. Quam drachmæ & denarij differentiam cū nouisset Celsus, nec obolorum (qui sex drachmam complent) voce Græca vti vellet, vnciam in septem denarios drachmarum octo vice diuisit, quorum denariorum singulos in partes sex diuisit, quæ obolis sex, in quos drachmam Græci diuiserant, responderent. Has verò partes vocauit sextantes omnium primus & solus, quorum singuli singulis drachmarū obolis sunt paulò grauiores, tum quia ipsi sex diuidunt denarium pondus drachma in sex obolos diuisa grauius. Quibus denarij sextantibus & eadem ratione quadrantibus & trientibus denarij aut libræ quando vtatur Celsus, lectori cōiectandum ex simplicium viribus, affectus natura & ægri & medicamenti componendi format.

Libr. 5. c.

17.



Drachma igitur Attica pars est octaua vnciæ Græcæ & etiam Romanæ, aut si paulo leuior est, ita vt drachmę octo denarios septem non expleant, id autores nō curarūt.

Δραχμὴ etiam ὀλκὴ dicitur lib. 8. comp. ph. p. quamuis proprie ὀλκὴ sit pondus, vnde ὀλκὴ δραχμῆς, id est, pondus drachmæ libr. 8. c. ph. part. in hiera Themisonis, & alibi sepe.

ἡμιδράχμον, Gal. lib. 4. comp. ph. gen.

Βιδράχμον, τριδράχμον, τετραδράχμον. id est diæ, tres, quatuor drachmæ Græcis in usu sunt.

Drachmæ partes sunt γράμμα Aëtio, Alexandro, Aretæo, Moschioni Græcis iunioribus vsurpatum, (nam veteres ὀβολοῖν vel ὀβολοὶ' Ἀνδρ. eius loco dicebant) scriptulum ad verbum rectè dixeris: scrupulus tamen aut scrupulū dicitur Celso, Plinio, Columellæ, & recentioribus Medicis: Martiali quoque, nisi in his scriptulū legas. Drachma autem habet grammata, id est, scriptula tria: Simplium scriptuli dimidium quidam ratiocinatores vocant.

ὀβολός obolus Plinio vsurpatus est dimidium scriptuli seu sexta drachmę pars: nam oboli sex, drachmam constituunt: & oboli duo, scriptulum vnum.

ἡμιόβολον vel ἡμιόβολιον Andromachus apud Gal. lib. 7. comp. ph. p. pro obol. dimi.

Διῶ



Διόβολον vel δίοβολι δύο , τριώβολον , τετρώβολον Soranus & Zoilus vsurpant apud Galenum lib. 1. 3. comp. ph. p. διωβολικῶν & τριωβολικῶν , id est , diobolaris , & τριωβολικῶν , id est , triobolaris pondere , libr. 7. compo. ph. p. His enim nominibus veteres Græci sunt vñ.

Θερίδος id est , lupini semen , est drachmæ pars nona : nam drachma pendit nouem lupinos. Κεράτιον , id est , filiqua , est dimidiū lupini. Actuarius cu vulgo λεπρόβια dicitur. Semen autem eius vt lupini , lētis , orobi , cicceris , fabæ , non tota filiqua intelligitur : & id mediocre non enorme & habitius , neq; strigosum & emaciatum , qualia hordei aut tritici grana viginti scrupulo etiam hodie damus , aurifabrorum grana omnino immutabilia , hisque omnino æqualia appensuri , vt ponderum fundamentum nobis certius sit quàm Atticis in suo λεπ/ω , Græcis in suo λεπ/ω vel chalcō , vel lentis semine.

Χάλας chalc⁹ Plinio dicitur , aliis areolus vel areolū , est dimidiū filiquæ : nā filiqua pēdit duos chalcos : chalcus autē grana lentis quatuor , quæ minimum pondus faciunt , vt hodie grana tritici vel hordei : sed cū grana hæc pondere plurimū varient , ob variam magnitudinem , densitatem , raritatem , humiditatem , siccitatem , eligenda



sunt (vt diximus) mediocria, aut illorum loco grana aurifabrorum immutabilia. Alij chalcum oboli partem octauam faciūt, alij decimam, Attici sextam, vt prius dictū est. *Διναριον*, id est, duo areola Diosc. in cucumere agresti. Drachma igitur continet scriptula tria, obolos sex, lupinos nouem, filiquas octodecim, chalcos sex & triginta: secundum alios, octo & quadraginta.

Denarij partes sunt, Victoriatus, nūmus argenteus victori e nota signatus, dictus aliter Quinarius. Nam denarius decem asses siue libras primò valebat (vnde illi nomē) eius autem dimidiū victoriatus asses quinque: quia denarius in duos victoriatos diuiditur. Postea denarius fuit libræ pars octogesimaquarta: nam ex libra denarij octogintaquatuor signabantur, Plin. Victoriato autem pondere vtitur Scribonius. Celsus passim libr. 5. capit. 10. dicere maluit semis denarij, vt p. ✕. S. vel semis, id est, pondus denarij dimidij, & alibi p. i. ✕. & semis, id est pōlus denarij vnius & dimidij. Galenus victoriatum Scribonij aliquando in duos obolos, id est, scriptulum vnum, rectius & frequentius in *τρίωβολον* vertit, cū Scribonij compositiones describit. Denarij vti libræ sunt sextans quoque, quadrans, triens, de quibus antè diximus.

NOT



NOTAE PONDERVM RO-  
manorum ex Uclufio, Probo,  
Celfo, Scribonio.

℞. libra. ℞℞. libræ dux seu dupondium.  
S. semis. v. septunx. —S—.bes.  
S—lodrans. S—dextans.  
S—deunx. —triens. —qua-  
drans. —sextans. —vncia. ¼ fescun-  
cia. ⅓ semuncia. ⅔ vel 6 binæ sextulæ.  
⅞ sicilicus. —sextula. ⅞ scriptulum.  
\* vel x denarius. v victoriatuſ. z sex-  
tans denarij & librę apud Celfum — fef-  
cuncia, seu quarta pars ſemiſſis — drach-  
mæ ſex ſeu octaua pars ſemiſſis in Scribo-  
nio leguntur. 3. drachma vna.

NOTAE PONDERVM  
Græcorum & Atticorum.

μνᾶς. λι, vel λ, vel λ λίτρας. 50 δγ-  
γίας. 4 δραχμῆς. λ δρχῆς, id eſt, drach-  
mæ γρ γράμμα. —. δβολῶ,  
:≡: δυοῖν δβολοῖν κ' λιγᾶς. X χαλ-  
κῶ. 5" ἡμίσε, quæ duab⁹ hiſ velut accētū  
lineoliſ differt à nota numeri nonagenarij.

In hiſ ponderum tam Romanorū quàm  
Græcorū notis ferè exprimuntur primę pō-  
deriſ literæ. In Romanis verò lineæ ſemiſſi  
adiunctæ vnciarum numerum designāt. vl-



tra semissem seu sex uncias. Reliquarum Romanarum notarum ratio est difficilior, & cur Græci per A obliquum & drachmā figurant, cum æquius fuisset ad aliarum notarum imitationem  $\Delta$ . id est, A cum p, quæ dux sunt primæ huius ponderis literæ: item in obolo,  $\sigma\beta$ .

Mina Attica, quæ est unciarum 16. Aui-cennas, Serapio, Mesues vti quibusdam putantur, aliis Alexandrina, quæ est unc. 20.

Vulgus medicorum iniquius pōdera hodie notat, præterquam lib. librā: &  $\Theta$  id est, scriptulum, quod notam Romanā licet ratione mihi incōperta scriptā imitetur, vt 3 drachmam: at  $\text{Z}$  vel  $\text{E}$  vnciā cur significet, nō video. Iustius mea sentētia fuerit, ne notarū 3 &  $\text{Z}$  affinitate amplius peccetur magno mortalium incommodo, drachmā & vnciam primis suis literis scribere sic, dr. & unc. quod in mēsuris vulgaribus rectē fecerūt, M. pro manipulo, & P. pro pugillo scribentes. Faba Græca pendit duos obolos: eius meminit Gal. lib. 7. compo. ph. p. in arte riace 14. Andromachi catapotio fabæ magnitudine ibidē. Faba Alexandrina drac. vnā & dimidiā. Nucis iuglandis magnitudo filiquas septuaginta duas pēdit. Nux Pontica filiquas octodecim. Alia numero metimur, vt pruna, ficus, piper albū, li. 7. ph. p.



ph.p.in arteriacis (quod aliàs obolis, aliàs vnciis metitur.) Multa praterea metimur quantitate discreta seu numero, vt ficus, poma, myxa, zizipha, myrobalanos, tamar Indos, nucleis seu seminibus horū maioribus fere exemptis, vbi scilicet ad viuum componendi ratio exigitur. Est tamen quando cum nucleis numerantur, vbi penduntur, vel etiam mensurantur.

**M**ensuræ Romanis & Græcis duplices fuerunt, liquidorum scilicet & aridorum. Liquidorum primò dicemus.

Καλὴς Ionicè pro *λοαὴς*, culeus, mensuratū capacissimus. amphoras viginti capit, seu libras mensurales mille & sexcētas, Pli. lib. 14. cap. 4. & Fannius libr. de ponderibus.

Amphora urnas duas Columellæ, lib. 12. capit. 20. seu libras octoginta: olim etiam quadratal dicebatur, quòd vas erat quadratum, pedis mensura in longum & latum.

Urna congios quatuor, seu libras quadraginta.

Congius sextarios sex Romanos, libr. 6. comp. ph.p. seu libras decem.

Sextarius quia est congiij sexta pars, dictus, capit heminas duas seu libram & bessem, id est, octo vncias viginti mensurales, non ponderales: nisi liquorem quē metiris,

vt



*Libr. I. c.  
ph. g.*

vt mel grauissimum, oleum leuissimum, vinum (præsertim fuluum: nam nigrum crassius & grauius) mediū expresseris, & sic tot sextarij sunt explicandi, quot sunt res metiendæ,  $\Xi\iota\varsigma$  id est, sextarij, neque mensura neque nomen erat apud Athenienses, quo tēpore scripsit Heras Medicus: nunc ex quo Romani orbi imperare cœperunt, nomen  $\xi\iota\varsigma$  id est, sextarij apud omnes qui Græca lingua vtuntur, extitit: ipsa uero mēsurā Romanæ æqualis nō est; nam alij aliam sextarij mensurā vsurpant. Apud Romanos sextarius libram vnā & semissem, & sextam illius partem pendit, vt omnes simul iunctæ sint vnciæ viginti, quas plurimū cornibus metiuntur incisīs extrinsecus lineis quibusdam orbicularibus. Nōnulli falsō sunt opinati, sextarium Romanum octodecim mēsuralibus vnciis valere, Galenus. Sextario Italico seu Romano proximus est chus Atticus, vt cadus Atticus, amphoræ Atticæ.

Vt as & libra vncias duodecim continet, dictis in libra nominibus appellatas: sic sextarius cyathos duodecim nominibus iisdē vocatos capit: vnde sextarij bes, id est, cyathi octo apud Largum compositione 116. & sextarius falerni Martiali, id est, cyathi duo: & seni sextantes vini, id est, cyathi duodecim, seu sextarius vnus Suetonio in Augusto:



sto: quadrans vini Celso in curatione quartanae, & Martiali, id est, cyathi tres. Eidem triens, id est, cyathi quatuor, ac etiam Propertio & Iuuenali. Martiali item quincūx, id est, cyathi quinque: septunx septem, bes octo, deunx undecim. Pro semisse verò hemina, seu sex cyathi, ut dodrans pro nouem cyathis, dextans pro decem.

Hemina quartarios duos capit seu uncias decem: dicta quòd sit ἡμισον, id est, dimidium sextarij, autore Festo. Vox tamen Romana & mensura est: *ῥύλη* aurem (quam Linacer & alij propè omnes heminam reddunt) Galeno & Plutarcho usurpatur, & Andromacho, quanuis Romæ agentis (quod Galenus miratur) et Catoni Romano scriptori. Huicque diuersa est ab hemina. Prioribus verò *ῥύλη* Attica mensura uncias nouem libræ Romanæ capit. Eamq; mensuram in pharmacis, prius quàm res Romanorum creuissent, scriptis *ῥύλην* capere coniecit Galenus. Videtur & Heras cum *ῥύλην* scribit, sextarij dimidium indicare: an verò uncias nouem ex librali cornu vel decem innuat, etiam ignoratur: licet nonnulli eam sexdecim uncias. & *διμοῖρον*, id est, duas eius partes habere statuunt: sed alibi *ῥύλην* cum libra Romana æquauit, *ῥύλην ἰταλινὴν ἃς δὲ καὶ λίτρας ὀνομάζουσι*.

*Ibidem.*

*Li. 4. san.  
tuend.*

Quart



Quartarius acetabula duo capit seu vnc.  
s. dictus quia est pars sextarij quarta.

ὀξύβαφθ vel ὀξύβαφον id est acetabulum,  
sesquicyathū capit, seu vncias duas & dimi-  
diam, ab aceto dictum, quod ad ciborum  
intinctus capiebat. Idem κοῦλας τέταρτον,  
id est. coryle, sex cyathos capientis quarta  
pars, libr. 1. compo. ph. part. dici Apollonio,  
& lib. 2. com. ph. gen. Serapioni, quibusdam  
videtur. Scribit verò Galenus lib. 9. compo.  
ph. par. in solenico Chrysermi. δαύνης σπέρ-  
μα ] ὀξύβαφον ὁ ἐστὶ 50. α. id est, quod est vn-  
cia vna, nisi mendum sit: aut oxybaphon  
minorem faciat mensuram.

κούαθθ & scunciam capit & drachmam  
& scriptulum, seu cochlearia magna 4. (que  
& ligule dicuntur à cavitate simili linguæ  
contractæ, estq; sextarij pars 12.

Μυστρόν εἰ κοχλιάριον magnū, capit drach-  
mas tres & scriptulum vnum, datur diacy-  
donion mediocris mystri modo, in fine lib.  
6. sanit. tuendæ.

Cochlearij parui pleni mensura in parvis  
corporibus: maximi, in maximis: in mediis,  
ad portionem datur diatrion pipereon, lib.  
4. sanit. tuendæ.

Libr. 7.  
metho.

Hieræ picræ siccæ modus maximus est  
duorum magnorū cochlearium cum aquæ  
temperatæ cyathis tribus: minimus parui  
vnius.



vnus cochlearis: mediocris est duorum par-  
uorum cochlearium. Quæ loca & alia pas-  
sim planè declarant saltem tres fuisse co-  
chlearis differentias.

Quæ pondera, quibus mēsuris, quorum  
liquidorum vel aridorum respondeant, Pau-  
lus in fine docet abundè.

Quauis enim libra sit & vncia mensu-  
ralis, id est, mensura molem decernens: &  
ponderalis, id est, rei grauitatem pondere  
declarans, Galeno libr. 1. 2. & 3. & sequenti-  
bus compo. phar. gen. & illa vncias duode-  
cim lineis circularibus in mensura cornea  
extrinsecus descriptis signatas semper ca-  
piat, hæc vncias duodecim semper pendat:  
tamen rarò libra ponderalis mensurali res-  
ponderet: & contrà, ob varium rerum, quas  
metimur, pondus in eadem mensura. Quā-  
uis etiam libra frequentius mensuralis fuit  
Romanis, tamen etiam fuit ponderalis seu  
pondus librale, vt mensura libralis: ob id  
distinguit Galenus addendo *παραμυ* ponde-  
rali, vt *μέτρη* mensurali.

# R O M A N A E A R I D O-

## R V M M E N S V R A E.

**M**odius à modo, id est, mensura dictus,  
sextarios sexdecim capit, seu libras  
26. vncias octo, non autem pendet. He-  
modius, eius dimidium. Sesquimodius

V A I X O



Varroni vsurpatur. Sextarius capit heminas duas. Schoeni & Calami sextarius, Cato cap. 105. Salis & hordei sextarius. Columella lib. 12. cap. 5.

Hemina capit acetabula quatuor seu uncias decem. Iris aridæ contusæ hemina, Cato cap. 107.

Hemina salis, Columella lib. 12. cap. 49.

Acetabulum capit sesquicyathum, seu uncias duas cum dimidia.

Acetabulum melanthij, Cato cap. 107.

Acetabulum gallæ, seminis coriandri, cnicorum, Celsus libr. 5. cap. 18. Salis acetabulum, Plin. lib. 18. cap. 7.

Cyathus cochlearia seu ligulas quatuor, vel fescunciam, drachmā & scriptulū. Cyathus seminis, columella libr. 2. cap. 11.

Girh cyathos tres, picis vnum, Celsus li. 5. cap. de curatione papularum.

Ligula capit drac. tres & scriptulum, Columellæ vsurpatur.

Ergo mensuræ liquidorum tantum Romanis fuerunt, Culeus, Amphora, Vrna, Cōgius, Quartarius. Aridorū solum Modius. Semimodius. Sesquimodius. Humidorum & siccorum indiscriminatim Sextarius. Hemina, Acetabulum, Cyathus. Ligula. Hæc de mensuris Romanis. Arida autem metimur frumenta, legumina, semina alia, salē: reliq



reliqua vt aromata frequētius appendimus,  
quàm metimur: metallica solum appen-  
duntur.

Aridorum quæ metimur pondera maxi-  
mè variant, ob id omisimus, ne prolixitate  
odiosa displiceamus.

GRAEGAE, SEV ATTICAE

*liquidorum & humidorum mensurae,*

*quibus maximè vtuntur Medici,*

*ob id etiam medicæ*

*vocantur.*

LIQVIDORVM MENSURAE

*cum olei, vini, mellis pondere cuiq; men-*

*surae respondente.*

**M**ΕΤΡΗΤΗΣ, siue *μέτρος*, siue *λεγάμιον* ca-  
pit choas duodecim, seu congios Ro-  
manos duodecim, seu libras mēsurales cen-  
tum & octo, ἀπὸ τῆς μετρήτης, id est, à metien-  
do: illud alterum ἀπὸ τῆς χάδαρ, id est, capa-  
cem esse. Sic metreten Dioscoridis in oleo  
cenanthino. & *λεγάμιον* eiusdem in vino  
hyssopite, Plinius cadum vertit. Metreten  
præterea Italicā ī vino scillitico, & *λεγάμιον*  
Italicum in vino absinthite Dioscorides vo-  
cat pro amphora Romana, quæ non paulò  
minor est Attica. Cū autem Atticam am-  
phoram vult significare, vocat simpliciter  
*μετρητὴν* vel *λεγάμιον*: cōtrà Latini ampho-

Q



ram Atticam pro metreta dicunt, ut à Romana separèt, quæ iplis absolutè est amphora. Vtraque Græcorum medicis in vfu fuit, postquàm Romani Græciæ imperare cœperunt. Metretes olei pendit libras Romanas nonaginta, vini centum, mellis centum & quinquaginta.

Χῆνς, siue χῆνς, chus seu congius, sextarios sex capit, seu cotylas Atticas duodecim seu libras nouem, ἀπὸ τῆς χῆνς, id est, à fundendo Plin. ex Dioscoride vertitur semper congius. Chus olei pendet libras septē cum dimidia: vini autem libras 8. & vncias quatuor: mellis lib. duodecim cum dimidia.

Σῆνς, sextarius, cotylas duas seu libram vnā & dimidiam. Vox à Græcis ex sextarij nomine corrupta Andromacho, Asclepiadi, Heræ, Critoni, Dioscoridi, Galeno, & aliis Græcis, qui scripserunt, postquàm imperium Romanum acceperunt, vetustioribus Atticis scriptoribus incognita. Aceti sextarij tres Critoni apud Gal. & Galeno ipsi sæpe pro liquidi mensura in lib. cōpositionū. Sextarius olei pendet vncias quindecim, vini autem libram vnā, vncias quatuor, drachmas quinque, scriptulum vnum: mellis lib. duas, & vnciam vnā.

Κοτύλη quartarios duos, seu vncias mēsurales nouē, vnde Heras lib. 5. comp. ph. part. Galeni



Galenus dicit uncias olei Italicas nouem, seu cotylen pendere uncias ponderales septem cum dimidia: aceti cotyle Soranus apud Galen. libr. i. composit. pharma. parti. Dicitur etiam *ἡμίξιστον*, & dimidia sextarij pars Gal. libr. i. comp. ph. gen. & *πρυβλίον* Cleopatraz. Hemina dicitur Romanis & item Græcis, Romanas medicamentorum compositiones in suam linguam vertentibus, alias autem cotyle vtuntur. Cotyle olei pendet uncias septem & dimidiam: vini autem uncias octo, drach. duas, scriptula duo: mellis librā vnā & semunciam.

*Τέταρτον*, siue *ἡμικοτύλιον* Dioscoridi libr. 5. de thymoxalme, & Apollonius apud Gal. libr. i. comp. phar. gen. id est, quartarius vel semicotyle, capit acetabula duo seu uncias quatuor cum dimidia. *τέταρτον ξίστος* dicitur Damocrati apud Gal. libr. 8. c. ph. part. Pendet olei uncias tres, semunciā, & drach. duas: vini autem unc. 4. drach. i. & scriptulum vnum: mellis selibram, & drach. duas.

*ῥέθυβαρον*, id est, acetabulū sesquicyathū, seu 3. duas & 3. drach. *τέταρτον λοτύλης* dicitur Serapioni apud Gal. li. 2. comp. ph. gen. & Apollonio libr. i. ph. part. Pendet olei semunciā & drach. tres, seu drach. quindecim: vini autē uncias duas, & scriptula duo: mellis uncias tres & drachmam vnā.



Κύαθος cyathus cōchas duas seu mystra quatuor, seu chemas quinque, seu cochlearia decē, seu fescuciam. Attici mellis cyathus vnus, aut drachmæ duodecim, Crito libr. 5. comp. ph. part. Attici mellis cyathus Philip po Medico dicitur apud Gal. lib. 4. ph. part. Pēdet olei vnc. & drach. duas, seu drachmas decem. Pōdus olei curæ Medicis præcipuæ fuit in emplastris: vini autē vnciam vnā, drach. tres, siliquas quatuor: mellis vnc. duas & scrip. duo.

Κέχυμ mystra duo, seu chemas duas cum dimidia, seu drachmas sex.

Μύστρον, chemen vnā & quartā eius partem, seu cochlearia duo cū dimidio, seu drachmas tres. Mystrum magnum Cleopatrarū capit drach. duas cum dimidia & quartā: paruum drach. duas, scriptula duo, siliquam vnā & vndecimā.

Χήμη cheme, cochlearia duo, seu drachmas duas, scriptulū vnum, grana quatuor, & quatuor quintas grani. Lithargyri chemen aut drachmas tres, lib. 5. comp. pharm. part. Gal. Crito.

Κοχλιάριον drachmam vnā, scriptulum dimidiū, grana duo, & duas quintas grani. Cochlear olei pēdet Cleopatrarū drach. vnā.

Hæc ponderū minutorum nomina sunt vsurpanda, ad interpretandam mensurarum  
capac



capacitatem : & quomodò libræ & vnciæ mensurales non solùm ponderales sunt: sic hæc pōdera minuta possis mensuralia facere, vel saltem intelligere. Vinū nona parte excedit pōdus olei Galeno, Fannio, & Græcis quibusdam: vt cotyle olei nouē vncias pendet, cotyle vini decem, quod est nona parte esse grauius: sic olei sextarius octodecim vncias, vini viginti pendet. Mel autem tertia parte vino est grauius, ex Fannio, & Dioscoride, & Galeno, & experientia. Mel autem sit purum, è fauis destillatum: despumatum autem est grauius.

## M E N S V R A E A R I D O R V M

*Attica, Medicis maximè in vsu.*

**M**EDIV<sup>Q</sup>, medimnus, capit chœnicas octo & quadraginta, Suidas: seu centum & octo libras, seu modios sex, non medicos quidem, sed georgicos. Medicis tam magna mensura rarior est in vsu.

Xoiv<sup>ξ</sup> cotylas tres, vel sesquiseptarium, seu libras duas & quadrantem, id est, vncias tres. In vsu est Chrysermo & Erasistrato in Galen. medicamentorum compositionibus Pro chœnicibus decem Dioscoridis in vino ex dactylis Plinius reddidit modium, cū decem chœnices cotylas triginta, seu sextarios quindecim faciāt. Romanus autē

Q 3



est sextariorum sexdecim: vnum igitur sextarium neglexit Plinius.

Ξέφης sextarius, cotylas duas, seu 3. octodecim, Galeno sæpe vsurpatur in comp. ph. *ἡμικόιννον* vsurpauit Dioscorides in vino elleboritite.

κοτύλη ozybapha 4. seu uncias nouem, gallæ cotylas duas. Gal. lib. 9. c. ph. part.

ὀξύβαφον, sesquicyathum, seu uncias duas & drach. duas: piperis albi oxybaphon, Gal. lib. 1. comp. ph. part. & Dioscoridi vsurpatur in thymoxalme.

κόχλῳ cochlearia decē seu fescunciam. Salis cyathus Diosc. in vino melitite.

κοχλιάριον drach. vnā, scriptulum dimidium, grana duo, & duas quintas grani.

### NOTAE MENSVRARVM

*Romanarum, ex Volusij Meriani libro de Asse.*

Culei nota desideratur. Quadrantal, id est, amphora q.

Vrna, q. s. id est, quadrantālis semis.

Congij 4.

Sextarij 2.

Heminæ 2. s. id est, sextarij semis.

Quartarij Q<sub>2</sub>.

Cyathi cy. In aridis verò modij, μ.

Semodij μ. s. Acetabuli & Ligulæ notæ adhuc desiderantur.

NOT



NOTAE GRAECARVM MEN-

*surarum medicis frequentes, ex lib. de ponderibus & mensuris, qui Gale-*  
*no tribuntur.*

κ<sup>μ</sup> λεγάμιον, tribus primis consonanti-  
bus exprellum. Χ χοῦς. ξι. vel ξ ξις. *τις.*  
κ<sup>ς</sup>. λούλη. Τρυ. Τρυβλίον. ξο. εἰς βαρον.  
κ<sup>ς</sup> λύαθ. Χ. μύτρον. χ. χύμη.

In aridis verò μ. μέλιον, Χ. χοῖνις.  
cum duabus primis consonantibus.

Cum igitur tam varient pondera & men-  
suræ, in veterum compositionibus diligen-  
ter observa miscendorum & totius mixturæ  
vires, ut inde pondera quædam dubia con-  
iectes. Noscas etiam in id patriam medi-  
ci, & si extra patriam, in qua regione, & quo  
tempore scripsit.

Cum item pondera medicamentorum  
mensuris non semper responderint (ut osten-  
dimus) diligenter est advertenda maioriū scri-  
ptura, si iubet nos medicamenta πλεῖς, id  
est, copia seu mensura, & ὄγκω, id est, mole,  
vel σταθμῶ, id est, pondere metiri, Gal. lib. 6.  
comp. ph. part. Adhæc felicius pondera &  
mensuræ, & amborum numerus integrè ex-  
primuntur, quàm notis representantur ob  
lapsum facilem. Ob id Galenus Androma-  
chum iuniorem & Damocratem laudat,

Q 4



quodd medicamentorum compositiones carmine scripserint, integra hæc omnia recipiente.

Idem Galenus libr. 2. comp. pharm. part. *ἐνατὲρ, ὀνδράκων, ἐννεύκων, ἀραχμὰς* aloës in hieræ compositione integra scripsit: & alibi passim.

Horum de ponderibus & mensuris scriptorum partem plurimam ex Galeni libris de compositione medicamentorum secundum locos & genera collegeram, sed meliora & auctiora reddidi lectione Georgij Agricolæ medici hac in parte doctissimi & diligentissimi. Neque tamen semper ponderibus aut mensuris utimur in componendis medicamentis aut utendis, sed herbas manipulis, semina & flores pugillis sæpe metimur.

*Li. 5. san.  
tuenda.  
Ibidem.*

Terebinthina resina sumitur nucis unius ponticæ, aliquando duarum triumve magnitudine. Diacnici sumitur duarum triumve caricarum modus, pro cuiusque natura magis minusve medicamenti obediante per experientiam exploranda.

*Li. theria  
ces ad Pi-  
sonem.*

Pulvis capitis milui potatur ex aqua, quam tribus digitis capi potest.

Alia eius generis plurima apud medicos tum Græcos tum Latinos inuenies.


EXER





EXERCITATIO  
PRAEDICTAE METHO-  
DI IN ALIQVOT  
*veterum compositis*  
*celebribus,*

LIBER IIII.



BSOLVTIS vtcunque tribus  
instituti nostri partibus, iam  
quarta eaq; postrema super-  
est adiicienda, de medicamen-  
tis aliquot compositis, qui-  
bus ceu particularibus exēplis exercere tra-  
ditas prius methodos visum est. Neq; enim  
omnia veterum composita in vnum coge-  
re placuit: id enim operis fuisset infiniti, &  
parum profuturi: neq; item omnia vsu quo-  
tidiano celebrata, sed tantum sumenda tan-  
quā prācipua adscribemus: admouenda  
pleniū tradituri in Mesuæ Antidotario,  
quod cum canonibus & simplicibus à no-  
bis quāta potuimus, maxima cura detersum  
& politum & clarum redditum propediem  
emittemus. Non improbo tamen, si quis o-  
mnia quæ à viris ratione & experiētia insi-  
gnib<sup>9</sup> scripta sunt, enumerare velit Galeni  
exēplo, vt ex his quisq; illa potissimū prae-

Q 5



*In libr. de c. ph. phar. part. et g.* parare queat, quorum materiae copiam habet, modò diligenter curet, ut quæ miscentur, probata sint & vigentia. Mistis quoque & compositis tunc solùm utatur, cum vires expetitas habent summas. Nam multa vetustate exanimata sunt igni absumenda, non utenda. Quibusdam autem vetustas vires addit, ut theriace: aliis minuit, ut Philonis antidoto, qua tamen ante annum à compositione non utendum: aliis adimit, quorum maxima turba est in syrups, catapotis, & aliis, ut simplicibus, sic compositis. Quapropter syruporum vere & æstate rarus est usus, si rerum illos constituentium est potestas frequentior apozematum quæ tunc solùm Pharmacopola componit, cum iubetur à medico, uti etiam eclegmata, exoletis iam Arabum lohot præstantiora, quia recentia. Cætera item quæ omni propè hora est componendi facultas composita non habet pharmacopola, ut linimenta, frontalia, embrochas, cataplasmata, collyria. Sed tempore utendi parantur, quando facilis & prompta rerum in hæc necessariarum materia est, quæ autem omni parte anni parari nequeunt, rerum tunc vigentium penuria, illa semel in annum totum confici possunt: cura tamen diligenti adhibita, ne etiam ante annum vires eorum elang



elanguerint. At cum vnum medicamentum etiam vni morbo omnium aegrotorum competere non possit ob temporum eius & aegri naturæ varietatem, & alias indicationes, nec medicus tantam varietatem in vnoquoq; genere ad manum habere possit, medium aliquod habeat ad mediā naturam compositum, cui addas tempore vtendi quæ voles, pro affectus & aegri natura, vt in diamoro Gal. in comp. ph. part. vel simplicissimum pares, quod vtendi tempore arbitrato tuo intendas. Ob id syrupos omnino simplicissimos ex succis scilicet, vel decoctis simplicibus saccharo aut melli incoctis ad saporis gratiam, sed magis ad conseruationis necessitatem perferimus.

Pauca quædā explicaturus sum, quæ rudi adhuc lectori remoramento esse possint, cuiusmodi hoc est: quæ ratio nos mouerit, vt præter omnium consuetudinem pondera & mensuras, & vtriusque quantitatem integris propè nominibus expresserimus. Id autem quo consilio est à nobis factum, libro superiore in ponderibus & mensuris docuimus: *ἀρα* quoque & *ἰσος* Galeni more & Arabum scribimus. Neque etiam accusandi sumus, si quando pondera aut mensuras, quæ vno numero comprehenduntur, tamen ipso identidem repetito expressimus.



**Lib. 1. cē.** mus. Sic enim & Gal. myrti nigræ sextariū  
**phar. par.** vnum, seminis apij sextarium vnū, summi-  
 tatum ramorum myrti sextarium vnum: &  
 ibidem, adianti sextarium dimidiū, ladani  
 τὸ ἴσον, id est, tantundem: quum vtrobique  
 scribere potuisset, enumeratis his omnibus,  
 ana vel ἴσον, id est, æqualem portionē. Hu-  
 ius ταυτολογίας exempla sunt plurima apud  
 Græcos & Latinos medicos. Præterea quæ-  
 dam compositiones huius libri eiusdem rei  
 multiplicem habent mensuram aut pōdus  
 multiplex, ob id quòd ex magnis ceu portio  
 tantum aliqua sint diminutæ. Quomodo  
 apud Gal. emplastrus alba ariobarzanij in-  
 tegra, recipit lithargyri drachmas ducētas,  
 cerussę drachmas octoginta, cerę drachmas  
 quinquaginta, olei veteris heminas tres, te-  
 rebinthinæ drachmas triginta, cineris buc-  
 cinorum drachmas decem, thuris drachmas  
 nouem & decem, aquæ cyathos duodecim.  
 Quæ Heras sic ad tertiā partem diminuit,  
 lithargyri drachmas 66. obolos 4. & cetera,  
 lib. 1. c. ph. g. & alibi exēpla hui⁹ rei plurima  
 inuenies. Nec te moueat, quòd eiusdem  
 simplicis doses varias secundum scriptores  
 varios in eadem compositione interdum  
 adscribimus, cū nec Galenum id facere pi-  
 guerit etiam in ponderibus diuersissimis &  
 simplicium validissimorum, vt libr. 3. comp.  
 phar



phar. part. in fine. Mānæ thuris drachmas  
 quatuor, alij drachmas quindecim: & paulo  
 post calcis viuæ drachmas octo, alij drach-  
 mas quadraginta: gypsi rosti drachmas qua-  
 tuor, alij drachmas octo. Aromata item.  
 nonnunquā species etiam cum vulgo ap-  
 pellamus, Paulum & Actuariū sequuti, qui  
 ἡ ἰατρία illa passim appellant. Adde quod com-  
 posita cum δία declinantur secundum ter-  
 minationem per primam aut secundam de-  
 clinationem Latinorum, vt per secundam &  
 tertiam Græcorum, Diacalaminthe, thes,  
 thæ, then. Diacydonion, nij, nio. Diamor-  
 ron, ri, ro, & cætera, non autem cum medi-  
 corum vulgo, diacydoniῶ, nionis: diaphœ-  
 nicon, diaphœniconis: diarhodon, diarho-  
 donis, vt anasarca, cæ: hyposarca, cæ, vt ex  
 Galeno lib. sanit. tuendæ, & compo. pharm.  
 part. colligere est facile. Imperitijs idem  
 faciūt in catholico cathartico, quod diaca-  
 tholicῶ, conis, etiam qui se aliquid putant,  
 quotidie scribunt. Si verò illa separatim &  
 sine compositione scribantur, non mutata  
 voce manet in genitiuo singulari vel plura-  
 li, quem δία tunc postulat, vt diacydoniῶν,  
 dia morῶν, δία τριῶν περιτρίων: sic nos Ara-  
 bum antidotum δία τριῶν σαρλάων potius,  
 quàm cum vulgo tria fantali. Ad horum  
 imitationem ex Græca voce & Latina pra-  
 ctici



Etici quoq; diaprunum, ni, no, cōposuerunt, ut epitogium Quintilianus, & ὕδρωρ ῥοσῶν id est, aqua rosarum Simeon, quam ῥοδῶν ῥα-  
*ρux* Actuarius vocare maluit.

In compositionibus quoque vulgi nomenclaturas nō paucas immutauī, partim quòd ineptiores viderētur, partim, quòd veterum & in quibusdam recētiorum appellationes tanquā puriores & magis naturā rei nobis exprimētes, sequi potius placitum est. Nam quæ isti hodie nomina medicamentis tribuūt, confectioes, electuaria, opiatæ, lohot, rob, suffus, & alia quædam vel Burbara sunt, vel rei dicendæ non conuenientia. Confectio siquidem compositio est, ut conficere est componere, & in quam significationem hi cōtrahunt, sibi non constant: nec minus inepti sunt in re & nomine electuarij, quod electarium, id est, electa quædam simplicia continens medicamentum dicere alij malunt. Sed cū id omnibus compositis commune sit, ut in methodo componendi probauimus, cur quædam horum sic, alia aliter vocarunt? neque omnes rem eadem vocant electarium, sed hic solidam & siccam cōfectionem sic appellat, alius etiam liquidiorē. Opiaras rectiūs appellarunt medicinas, quæ scilicet opium recipiunt, quibus consistentia similes



les etiam opiatas vocant, quæ nos veterum more in antidotos reiecimus. Quas autem appellationes cuique composito medicamento hîc declarando aptiores esse putamus, partim docebimus in singulis compositorum formis & differentiis, partim nunc ex Actuario subiiciemus.

Cùm causæ salubres sint quatuor sum-  
 mis generibus Galeno comprehensæ, su-  
 mendorum, adinouendorum, educendo-  
 rum, faciendorum, duo prima hîc docemus,  
 neque hæc tota, sed in ambobus medica-  
 menta tantum formis & viribus diuersa.  
 Nam eorum quæ ingeruntur: quædam su-  
 muntur trita solum & læuigata: alia conue-  
 nienti humore subacta: alia in trochiscos, id  
 est, circulos cōplanata: alia in catapotia, id  
 est, globulos deglutiendos efficta: quædam  
 aqua ad tertias coquuntur, colantur, & de-  
 cocti iure iam medicamentofo sumuntur,  
 nunc per se, nunc cum vino, sapa, melle, sac-  
 charo: alia cum horum posteriorum alter-  
 utro cocta, donec concrecant, quod sera-  
 pion & ζουλάπιον Barbara voce solemus  
 nominare: alia prius trita, deinde cum mel-  
 le subacta, donec in vnitatem coëant, an-  
 tidota vocamus. Fructus autem aliquot  
 fugaces, aut iam coctos, aut in fulgama pla-  
 na redactos, ex melle aut saccharo tan-  
 tis per

*Actua.*

*ζουλά-  
 πιον etiā  
 Simeon  
 vocat.*



risper excoquimus, dum iustum crassamentum obtineant, & in bellariorum formas fingimus.

Ex admouendis verò quædam formantur in vnguenta, quæ solum illita auxiliantur: alia in emplastra, quæ linteis extensa, vel alutis tenuibus aut pittaciis inducta superponuntur: alia vocantur epithemata, quæ tæniis vineta hærent non suo lætore: quædam

*De his* velut *τριμματα*, id est tritura, & *ξήματα*, id est, *Paulus* sicca & pulueres dicuntur, suntq; ea vltima *libro 7.* & simplicissima omnium: quæ sumuntur, quædam ceu collyria fingentes, quibusdam liquoribus diluimus, & ad coteri terimus, tanquam ocularia medicamenta: alia aliter pro ægrorum conditione, morbi & partis affectæ natura. Quas autem vires medicamentum quoduis habeat, ex simplicium natura & totius forma suis locis post audies.

*Actuar.* Antidota ex herbis, succis, lacrymis, seminibus, radicibusq; congestis, & operosè tritis, & in vnum cum melle coactis fiunt, mistis magna ex parte calidis, frigidis interdum, & etiam sensum stupefacientibus, interdum & purgantibus, quæ etiam serapiis & zulapiis miscentur.

Medicinas quæ non foris admotæ corpori, sed in corpus receptæ affectibus medentur antidota, ab *ἀντὶ τοῦ ἐνὶ σπλάχνῳ*, quasi contra



contra affectus data, & foeminino genere *Ga. initio*  
antidotos medici appellant. Vnde cephalica, stomatica, stomachica, cardiaca, splenica, hepatica, nephritica, colica, hedrica, mithridatios, theriaca, Galeno propè semper dicitur, saepe substantiuo antidotus adiecto, saepe non expresse. Eadem ratione apud eundem cephalicum, stomaticum, stomachicum, & cetera saepe leges, antidotum scilicet. Horum quaedam aduersus deleteria & lethalia pharmaca dantur, alia contra feras virulentas, alia affectibus ex prauo victu natis succurrunt. Sunt quae usum hunc triplicem promittunt, ut Mithridatios, Theriaca, de quibus tanquam praestantissimis primum nobis dicendum.

*Lib. 1. de  
antid.*

Antidota grauissimis casibus opitulantur, maximè autem utilia sunt aduersus venena corporibus nostris inserta morfu, ictu, cibo, potu: rectè etiam dantur in viscerum, laterum, faucium, interiorumque partium doloribus, & collisis ictu vel casu ab alto.

*Celsus li.  
5. cap. 22.*

Quia antidoti etymon attigimus, subiit nobis in mentem docere, unde medicamenta composita nomen acceperunt, quae nominis ratio magni est momenti ad rem intelligendam. Ab actione & effecto in morbum vel corpus totum athanasia, quod immortalis, hoc est, maximè longaeuos ho-

R



mines facit. *ἰννοωγωνὶνδρ* Andromachi ex  
aloës vnc. ii. croci, mastichis ana vn. vna. li.  
7. comp. ph. p. vt aloë eccoprotica, li. 6. sim.

Sic cephalica, ophthalmica, stomaticā, ar-  
teriaca, stomachica, hepatica, splenica, coli-  
ca, & id genus alia medicamenta, harum  
partium affectibus salubria, quæ etiā à par-  
te vocata videri possunt.

Acopa, quia lassitudinem tollunt.

Ab inuentore.

Philonis antidotus, Philonium vulgò di-  
ctum, de qua in Mesue ex Galeno audies.

Mithridatios, à Mithridate Ponti rege.

Multa similiter cognominata sunt, vt The-  
riace Andromachi, ab Andromacho con-  
stituta.

Hiera picra Ga. q̃ eā vsu multo celebrauit.  
Diarhodon abbatis, Puluis ducis, in horum  
gratiam à Medicis inuenta & appellata.

*ἰός* medicamentū ad ischiadas, li. 10. c. ph. p.  
Diospolites seu diospoliticū, Isis emplastrū.  
Diadistamnū sacrum, quòd ex sacris Ae-  
gypti locis afferuntur, lib. 2. comp. ph. gen.  
Cyphi heliacum & selenicum.

Antidotum *σωτηρία*, Paulus lib. 7.

A medicamento simplici vel præcipuo  
quæ Basis dicitur, vel copiosiore.

Discalaminthe. Diacyminum. Dia trion  
pipereon. Diaphœnicon. Dia margaru.  
Opiat



Opiata antidotus, quod opium recipit.

Theriace, q̄ pastillos theriacos recipit, vel  
q̄ viperę moribus præter cætera auxilietur.

Hiera diacolocynthidos. Diaromatum.

A numero simplicium.

Tripharmacum ex lithargyro, oleo, aceto.

Tetrapharmacum. Theriace διατράκων.

πεντάκων, ex quinque, lib. 7. Pauli, cui ta-  
men quidam accesserunt.

δεντάκων ex decem.

Dodecatheon, ex duodecim & melle.

Hecatombe Pauli, licet tantum simplicibus  
octodecim constet. A qualitate.

Cygnus Gal. & cygnus alb⁹ & ruber Paulo.

Albæ & melinæ & virides emplastri, libr 1.  
comp. ph. gen.

ἐυχρωα, id est, boni coloris.

ἰδιούχων μάγμα in theriace.

δίχρωα, vel διχρώια, id est, bicoloria.

ἐυωδία, id est, beneolentia.

δυσωδία, id est, maleolentia. πικρὰ δὲ ἀλόνε,

quæ & hiera picra Galeni dicitur: est tamen  
ea multiplex, ut in hieris antidotis leges.

A modo vtendi.

Epichema ventriculi, hepatis, lienis, capitis  
aliarum partium quibus imponitur, quale  
quod scutum hodie vocant.

Hypoglottides, quę sub lingua tenentur,  
ut paulatim liquata sensim deglutiantur.

R 2



*Ibidem.* Arteriace ἐκλεικτ 14. Andromachi lib. 7.  
comp. ph. par. ἐκλεικτον φαρμάκων, καὶ ἐκλεικ-  
τας δυνάμεις, καὶ ἐκλεικμάχα, id est linctus,  
quod lingēdo deglutiantur.

ἐρρίνα ἢ ῥινίγχυχα, quæ naribus infunduntur.  
καὶ χρώτια ἢ καὶ χρίνω, id est, deuoro.

A forma compositi.

τροχίσκοι, quod rotulæ formam habeant:  
iidem λυκκίσκοι à figura rotunda, & ἀρτίσκοι  
à panis exigui forma Galeno dicuntur.

A nota.

Sphragis Lénia, id est, sigillū ex terra Lem-  
nia, in cuius locum supponūt terrā sigillatā.

A loco, vbi componitur, celebratius.

Oleum Sicyonium, à Sicyonia regione Pe-  
loponnesi Dioscorid. Galeno autem & Pau-  
lo à cucumere agresti, vt in Mesue docem<sup>r</sup>.

*Ga. initio  
libri I. de  
antid.*

**M**ithridates Ponti ac Bithyniæ rex o-  
mnium propè simplicium pharmacorum  
experientiā habere studuit, quæ lethalibus  
aduersantur, vires ipsorum in facinorosis ho-  
minibus morte damnatis cōprobās, vt Ga-  
leni tempestate Pergami rex Attalus. Que-  
dam igitur ipsorum phalāgiis peculiariter re-  
sistere deprehēdit, quædā scorpionibus, alia  
viperis, alia cōtra aconitum valere, alia con-  
tra leporem marinū, alia contra alia delete-  
ria. Quibus omnibus cōtemperatis, vnum  
cōfecit medicamentū Mithridates, nomina

tura



rum ab ipso Mithridation, sperans se præsi-  
diū aduersus omnia lethalia habiturū. Nec  
spes eū fefellit: vsu enim ei<sup>9</sup> quotidiano cor-  
pus à deleteriis securū sic effecit, vt cū exitio  
so & violento potius veneno (quo filix eius  
enectæ sunt) bis potio interire, quàm viuus  
in Romanorū potestatem venire statuisset,  
nullū inuenerit venenū, quod eū interime-  
re potuisset, ob id gladio transfixus interiit.

Mithridatios antidotus ab Andromacho  
sic describitur, ad deleteria efficax, & inter-  
nos omnes affectus.

Acori, phu pontici, hyperici, acacię, gummi  
ana drachmæ duæ.

Scinci drachmæ duæ, oboli duo.

Anisi drachmæ tres.

Folij, \* nardi Gallicæ & Indicæ, rosarū sic-  
carū, fœniculi seminis, meu athamānici, car-  
damomi, gētianæ, ana drach. quatuor, aliis  
trium, postremorū drachmæ tantum duæ.

Opij drachmæ quatuor, oboli duo.

Petroselini drachmæ quatuor, oboli tres.

Cassij, polij, seseleos, costi ana drach. quin-  
que, oboli duo.

Gallij drach. quinque, oboli tres: aliis drach-  
mæ sex.

Styracis drachmæ quinque, oboli quatuor.

Myrrhæ, castorij, thuris, hypocisthidis suc-  
ci, ana drachmæ sex.

Gal. 2.

lib. 2, aut  
do.

\* vāgds

λεχ/ι/ν/ι/ς

α/ν/θ/ι/ν/ο/ι

κ/ι/ς.



ἰατροτά  
v G.

Spicæ nardi, opopanax, scœnu anthus, resina terebinthina, scordij, cypheos, anadrachmæ sex, oboli duo.

Dauci seminis drachmæ sex, oboli tres.

Opobalsami, thlaspeos, ana drachmæ sex, oboli quatuor.

Galbani drachmæ septem.

Croci, cinnamomi, zingiberis, ana drachmæ septem, oboli duo.

Glycyrrhizæ drachmæ septem & dimidia, & oboli quatuor.

Vini chij quod satis est.

Mellis Attrici cocti quantum sufficit, hoc est, libram vnā in pulueris vnc. tres, vel si delicatius vis, sed minus efficax, in pulueris vnc. duas. Eadem ratio est quantitatis mellis seu sacchari, & puluerum in cæteris antidotis.

Mithridatis theriace, qua semper vsus est Mithridates contra venena lethalia, & qua utebatur Andromachus, scribitur Galeno libr. 2. antid. ab hac diuersa, vt dimidium theriaces post dicendæ videatur.

Mithridatios à Damocrate aliter sic describitur versibus apud Gal. lib. 2. antidoro. Myrrhæ Arabicæ Trogloditidis, croci, agarici, zingiberis, cinnamomi, spicæ nardi, thuris, thlaspeos, ana drachmæ decem. Opobalsami, seseleos, scœnu anthus, stœchad



chados, terebinthinæ, galbani, costi, piperis  
longi, castorei Pontici, hypocisthidis succi,  
styracis boni, opopanax, foliorum mala-  
bathri noui, ana drachmæ octo.

Calix nigre, polij, piperis albi, scordij, fe-  
minis dauci Cretici, carpobalsami, cy-  
pheos, bdellij (quod quidam addunt) ana dra. 7.

Nardi puræ Celicæ, gummeos, petrose-  
lini, succi papaueris, cardamomi, feniculi  
feminis, gentianæ, foliorum rosæ, ana drac. 5.

Distamni Cretici paulo amplius, vel æ-  
qualis portio.

Anisarij, acori, phu, sagapeni, ana dra. 3.

Meu athamantici, acaciæ, scinci ventris,  
hyperici feminis ana drach. duæ & dimidia.

Vini mediocris modus, & mellis simili-  
ter quod moderatū fuerit. Cypheos com-  
positio à Damocrate eodem hæc describi-

tur. *ἡ ἀπὸ τοῦ* id est, vix passæ pinguisimæ  
(à qua cortex ac semen totum sint exem-  
pta) carnis læuigatæ probè, terebinthinæ  
ana drachmæ Atticæ vigintiquatuor.

Myrrhæ, schœnu anthus, seu iunci rotū-  
di, ana drachmæ duodecim.

Cinnamomi drachmæ quatuor.

Bdellij lacrymæ, spicæ nardi, cassiæ bonæ  
& puræ, cyperi, baccarum iuniperi gran-  
diū & pinguiū, calami odorati ana drach-  
mæ tres.

\* *κεναι-  
μύων λε-  
γόμεν πο-  
τὶς ἐκ  
Diosc. in  
Cyph. ἡ  
τίμω ἀπὸ  
κεναιμύων  
μύων, τε-  
σινὰ ἐκ-  
πυργατὴ.*



Aspalathi drachmæ duæ & dimidia.

Croci drachma vna. Mellis & vini modus mediocris. Bdellium, myrrham, vinū in mortario tere ad mellis liquidi crassitiē, melle superaddito vuam cum aliis tere. Omnia vbi erūt læuia, fac cycloparuos. His Aegyptij sacerdotes diis suis propitiādis suffitu vtūtur. Sic Rufus vir optimus, & in arte exercitus, parandum prodidit. Permultæ enim eius compositiones etiam Dioscoridi, quarum vnā describit ab hac diuersissimam, tamen quam in antidota quoque misceri ait. Paulus quoque libr. 7. describit cyphi magnum *ἡλιακόν*, id est, solare dictum, ex rebus triginta sex confectum: & *σεληνιακόν*, id est, lunare, quod ex rebus viginti octo constat: vtrunque ab hoc etiam maximè differens: tamen etiam ad conciliandos deos odore grato compositum, & naribus nostris admonēdum, vt destillationes à capite in partes subiectas cōcoquat, & grauedine obstructionēq; nos liberet, & cerebri ventriculos purget, & pestilentibus morbis resistat. Per os etiam cyphi sumitur tum ad hæc, tum ad ea quæ pectori inhærent coquenda, necnō ad frigidos hepatis affectus. Miscetur medicamentis præcipuè epithematibus & antidotis, quæ inde Cyphoidea vocantur, Paulus lib. 7.

Mith



Mithridation autem Andromachi à ple-  
risque Romanorum imperatoribus proba-  
tissimam antidotum ex simplicibus circiter  
quadraginta duobus & cyphi constantem,  
merito prætuleris farragini nescio cui Ni-  
colai ex simplicibus centū & octo conflatę,  
eadem promittenti, sed verbis plurimis ad  
capitis, aurium, oculorum, dētium, pulmo-  
num, vētriculi, intestinorum affectus frigi-  
dos, hoc est, pituitosos, melancholicos, seu  
ad stuporē, paralyfin, apoplexiam, epilepsiā,  
spasmodum, tetanū, cephalęā, hemicraniam,  
maniam, melancholiam, grauē auditum,  
oculos lacrymantes, odontalgiam, cynan-  
chen, asthma, sputū sanguinis, perineupmo-  
niam, lienteriam, dysenterięā, siue sumatur,  
siue admoveatur: præterea ad frangendos  
calculos, menses ciendos, omnia vteri vitia,  
scirrhos, podagras, morsus & ictus venena-  
tos, morsum canis rabidi, ad febres quoti-  
dianas & quartanas initio accessionum, co-  
cta iam materia, in modum auellanae cum  
vino vel aqua, cui salvia vel menta sit inco-  
cta. In aliis autem vespere sumpta & admo-  
ta, quę omnia per internos omnes affectus  
intelligit Andromachus.

Mithridation autem priorem theriace  
descripsimus, quod hac prior tempore fue-  
rit, & quod ex ipsa theriacen excerpserit

R s



Andromachus, vt mox audies: adde quòd ad pleraq; deleteria est efficacior quàm theriace: quā tamē inferior est in morsus viperæ curatione, Gal. initio lib. 1. & 2. antidot. Populis autem septentrionalibus Gallis, Germanis, Anglis, Scotis cū rarissima sint venefica, & malefica animalia, contra hæc mithridatio aut theriace non egent, sed cōtra alios affectus nuper dictos, quos magnopere antidoti istæ profligant, vt paulò post audies. Ad theriacam antidoton transferamus, in qua vt ceteris medicamentis nosse misturam, facultatem, vtendi tempus, & mensuram oportet. Quapropter de his est nobis nunc dicendum.

*Libr. theriaces ad Pisonem.*

**T**heriaca autē dicta est, quòd ferarum & viperarum morsibus medetur, & quòd viperas recipiat. Eam verò ex optimis & plurimis medicamentis cōposuerūt contra morsus venenosos & pharmaça deleteria (quæ duo sunt mala in tota vita grauissima) & cū perpenderēt hominum naturas permultum inuicem differre, & aliud aliq; medicamentum esse idoneum, meritò exactam ipsius & variā fecerunt misturam, vt omnibus prodesset. At cū tantus sit *ἀριθμὸς*, id est, ferarum numerus, vipera, basiliscus, hæmorrhus, dipsas, scorpius, aspis, cerastes, phalangium, hydrus & aliæ permultæ, sola



sola tamē ex his vipera eligitur, quod ceteræ maximam vim noxiam in suis corporibus totis habeant, ut docet Galenus libr. de theriaca ad Pisonē, vipera eā vim noxiam in capite & cauda solum habet, carne reliqua nativam habet virtutem ad salutem, ut animalia pleraq; de quibus in his quæ agunt à tota substantia fusiùs egimus lib. 2. Porro viperarū in theriacam paratarū vis tabifica & corruptrix largior tollitur cauda & capite amputatis. Quæ si qua in carnibus remanet, obtunditur coctione, sale, anetho, reliquis præstantissimis medicamentis, ac dissolvitur: sic vesicae per se noxia cantharis, & succus papaveris per se potus lethalis: mista verò aliis, ex preparatione plurimum virtutis auxiliatricis acquirunt illa ad urinas innoxie movendas, hic ad somnum conciliandū & vires insomnia deiectas reficiendas.

Theriace antidotus ab Andromacho Cretensi Medico Neronis primario ratione & experientia absolutissimo, ex Mithridatio decerpta est, quibusdam ademptis, quibusdam adiectis, potissimum carne viperarum non exigua, ob quam appellata est theriace ἀπὸ τῆς διφίης, id est, à fera omnium saevissima ἰχθυῶν, hoc est, vipera, ad cuius morsus est præstantior mithridatio, quā ob id ex hominum usu magna ex parte deie



deiecit. Porro Theriace ob simplicium  
probitatem, & horum virtutis inter se pro-  
portionem fit præstantissima, vt cætera me-  
dicamenta composita: tamen qui Philoniũ  
antidotũ aut aliud quoddam exigũ com-  
ponit, non adeo summè bonis medicamen-  
tis eget, vt qui Mithridation aut Theriacẽ,  
aut aliud multæ misturæ & cinnamomum  
recipiens, conficit: hic enim omnium præ-  
stantissimis eget: qualiũ copia Romæ Cæ-  
saribus facilius quàm alibi gentium suppe-  
ditabatur. Ob id in ea non Medici soli, sed  
etiam myropolæ præsertim diuites præstā-  
tissima hæc medicamenta componebāt. In  
quibus tamen sæpe (quia inuentu difficilia  
omittebant) non leuiter peccabant. Cæsa-  
riani verò Medici nullo destituti ad probā  
compositionem, soli perfectissimè talia cō-  
ficiebant. Quæ res profectò facilis potētissi-  
mo Regi nostro Francisco fuerit nauiga-  
tionibus, suorum quidem, Alexandria: Ve-  
netorum verò, ex tota propè asia: Lusitano-  
rum autem, ex Aphrica & India, optima  
quæq; consequi medicamenta. Demus igi-  
tur operam, vt singula his cōpositionibus  
necessaria habeamus optima ab integræ fi-  
dei amicis ex regionibus, in quibus sunt præ-  
stātissima: quæ libris nouisse non satis est,  
sed horum notas omnes oculis aliisq; sensi-  
bus,



bus, ter, quater, frequentius accuratè explorabis, ne te fallant institores tam callidè omnia adulterantes, & veris assimilantes, ut etiam exercitatissimis imponant. Tamen ut ad explorandum veniat instructior, paucis notas optimorum quorūdā simplicium ad Theriacen necessariorum perstringam, ut cognitis optimorum notis, quisque deligat optima, quæ apud suos, aut vicinos, aut alias gentes existunt: ut primū habito singulorum delectu, deinde præparatis quibusdam, legitimè tandem ipsam Theriacen componas.

Quoniam alia aliis locis & abundant & *Libr. 3. c. 2.*  
meliora sunt simplicia, ex quavis regione *ph. part.*  
præstantissima eligantur, quibusdam his indicationibus adhibitis.

Radices sint cortice intento, non rugoso aut rancido: id enim macræ radicis est indicium.

Fructus sint optimi, multi cum surculis & germinibus, & aliis, quæ ipsis inhærēt foliis, inuolucris, floribus.

Semina, ut radices, sint bene nutrita, hoc est, procera, & plena, quod intentus cortex indicat.

ὄπῆς & χυλῆς non siccatos tempore, nec suis qualitatibus, & viribus inualidos gustatus & olfactus indicabunt.

Herb



Herbæ autem in Theriacam recipiendæ sunt, scordium, nepita, prasion, stœchas, dictamnus, polium, chamædrys, chamæpitys, hypericum, centaurium tenue.

Radices, zingiberis, ireos, rhei, pētaphylli, costi, nardi Indicæ, nardi Gallicæ, Gētiænæ, mei, acori, plu, aristolochiæ tenuis.

Semina buniadis, id est, napi, Ruell. in Actuar. petroselini, thlaspeos, ameos, anethi, fœniculi, dauci, cardamomi.

Chamæpityn, chamædryn, thlaspi, centaurium, hypericum, polium, & alia cuiusmodi florentia accipies, non sole æstiuo, siccata, neque dum fructus horum adhuc crudi sunt & imperfecti.

Mel theriacæ idoneum sit dulcissimum, & acerrimum sapore, pallidum colore, aut flauum, odoratissimum, substantia nec crassum & grumosum, nec impensè liquidum, sitq; totum sibi vnitum & lentum, ut digito si tollatur, visci modo longissimè seruet continuitatem, quale est Hymettium, vel Thasium, vel Atticum, vel aliud simile, sed mediocriter coctum sit, ut terreum & flatulentum coctione separetur. Mel item bimum vetustiore & recentiore est melius, modò non sit amarum, aut vinosam aliquam qualitatem odore & sapore referēs, siue vetustate, siue coctione & despumatione lon-

ga



ga utrumque contingat, id quod sola experientia probatur.

Vinum quoque sit phalernum, acre, laudatissimum, vel simile: non phalernum faustianum dulce, non imbecillum aut recens, & crudum adhuc ob nouitatē. Melius enim est vetus, nōdum tamen amarum: sit etiam tenue substantia, perlucidum *λίπρον*, id est, fuluum, non album, non rubrum, non nigrum: sitque odoratissimum, & suauissimum, non quod id theriaces aut mithridatij virtutem reddat meliorem, sed quia has antidotos alioqui ob multa amara (nam amara sunt omnia medicamenta, quæ longo usu virulētis bestiis aduersari sunt iudicata) ingratas, gratiores efficit. In omnibus enim medicamentis, quæ deglutiuntur, ratio est habenda & sollicitudo de saporis gratia, ut in methodo medicamenti componendi abundē probauimus.

Vinum ergo misce firmissimum, & validum imprimis, & quod pluribus annis non ampliùs mutari probaris: vitabis autē valde imbecillum, aquosius, valde austerum, facile acefcens, vetustate amarum.

Opium Thebaicū, vel illi bonitate proximum. Marum sit valde amarum, minùs acre, odoratius amaraco acri & minùs amaro. Vtraque sint Cretica.

Ref



Rosæ præstantissimæ sint omnium suavis-  
sima, & aliis rubicundiores.

Scordium Creticum optimum: tamen  
nō malū in aliis regionibus potest inueniri.

Napi seu rapæ sylvestris semen Creticū.

Iris Illyrica, & ex ea ut cæteris medica-  
mentis, odoratior: vnumquodque enim est  
præstantissimum, quod proprium generis  
sui odorem, uti & saporem habet valentis-  
simum: non Libyca, quæ ab Illyrica tantū  
abest, quantū corpus mortuum à viuo.

Agaricum leuissimū est laudatissimum,  
densum, graue, lignosum est deterrimum.

Cinnamomum sit odoratissimū, seu in-  
dicibilem quandam odoris gratiam super  
alia omnia referat, gustanti calidum admo-  
dū percipiatur, non tamen ut molestè ro-  
dat. Colore aut tale, ac si quis lacteū colorē  
cū *quæ*.i. fusco & modicè cyaneo misceat.

Succus glycyrrhizæ Creticus præstantis-  
simus, ut cretica glycyrrhiza.

Opobalsami Iudaici, id est, optimi, notas  
omnes repete ex simplicibus. In quibus etiā  
fusiū horum singulorum proborum indi-  
cia legas licet.

Myrrha optima opocalpaso aut liquore  
aliquo non vitiata: sit autem Troglodytis  
aut Minæ, à regionibus, ubi præstantissi-  
ma gignitur.

Croc



Crocus sit Corycius, à Corycio antro, in quo nascitur: vel potius ali<sup>9</sup> odoratissimus. & longo tēpore in vigore suo persistens, ac flauissimus. Nā robore odoris præsentanei, & diuturnitate, & flauitie optimus est iudicandus, non proceritate Corycio præcipua.

Zingiber non pertusum, sed siccum & acre esto.

Rheon densum contractumq; substantia validè astringēs, si viget ac integrū est: nam citò perforatur. Quod autem coctū est, rarius est, ac nihil aut minimum astringēs: huius loco rhā barbarum Auicēna substituit.

Pentaphyllum siue sit tormentilla vulgaris, siue aliud, interea tamen dum lis dirimitur, cape tormentillam.

Calamiathe Cretica montana melior.

Prasiū albū & Creticū, velex editis locis.

Petroselinum sit Macedonicum: idem amarissimum est atque acerrimum.

Stœchas Cretica, vel ex Stœchadibus insulis: sic enim lego in Gal. non Cycladibus.

Costus sit, qualem ex Diosc. in simplicibus pinximus.

Piper longum natium. ob id in aqua insolubile, album in simplicibus.

Dictamni herbæ Cretensis folia, nō cum vulgo radices fictitiæ.

Iūcus odoratus sit Arabicus. Flos melior,

S.



sed rarus aduehitur, quòd eum in viis Arabiæ frequētissimum iucundissimè pascant cameli: solo odoris vigore discernitur. Illius enim odoris gratia citò vanescit.

Thus sit *ἀμντον* masculinque.

Casia optima, q̄ surculis, & corticis tenuitate, gustu, odore sit cinnamomo simillima.

Indica nardus radix est, quæ tamen à spice similitudine spica nardi dicitur.

Polium, chamædrys, chamæpitys, hypericum, gentiana, thlaspi, nigrum veratrū, & alia quædā Cretica paulò præstantiora sunt Italicis. Si tamē ver totum siccum fuerit æstatis modo, Cretenfibus Italica non multò sunt inferiora, Sefeli Massiliense.

Styrax sit, qui in arūdinibus ex Páphyliā affertur, & paucissimus gignitur, tāq; diuersus ab hoc copioso styrace, quàm falernū vinum ab eo quod in tabernis venditur. Cape calidissimum, odore & sapore valētissimū.

Thlaspi Creticum, colore *ὠχροξανθον*, figura rotundum, multò minus milio. Præstat verò ex Cappadocia alterum. multò nigrius, & maius prædicto, nō exactè rotūdū.

Ani Creticum, vel ex regionibus siccis & altis.

Hypocisthis                      ~ Vtrūq; quale Diosc.  
Malabathri folium ~ describitur.

Terebinthina sit Chia potius, quā cū Androma



dromacho Libyca: aut cū aliis Pōtica. Chia enim oībus aliis odore & sapore præcellit.

## VIPERARVM DELECTVS,

*& ex his ritè paratis pastillorū theriacorum compositio, ex Galeni libris.*

**V**iperæ deligantur magnæ, bene nutritæ, corpore toto & ventre crassiore, subflauæ, collo valde prominenti, capite latiore, oculis rutilis ac subrubētibus, interritis, trucibus, ac ferino aspectu, præsertim irritatæ, meatu magis ad extrema caudæ vergente, cauda non inuoluta sed potiùs conuersa, validæ, bene mobiles, tamen incessu quieto & tardo. Hac enim re fœmina *Nicander* differt à masculo: & quòd ea caninos & *in theria.* acutos dentes habet, plures duobus masculo propriis in capite acuminato: ad delectum quèd i præter hæc tēpus venationis harum, & in his enecādis apparētia, de quibus mox dicam, pertinent. *Engix*, id est, viperas *Gal. in fi.* Crito vult capi in fine veris, aut trygeto, *lib. I. anti.* id est, autumnī medio: cauendam verò æstatem ab initio ad canis ortū, & huic succedentis oporæ tempus, cū fructus fugaces eduntur, & bilis hominibus copiosissima suboritur. Galenus quoque viperas venatur exacta hyeme, veris initio, vbi latebris relictis in apricū prodierint, & nemora petunt, ac subdiales semitas, & semine ma-



rathri oculos recreant, suntq; iā audaces & celeres, nec virus tam maleficum retinent. Nam delitescentes maligniorem vim tabificam in se contrahunt, quia nulla ex parte digeruntur, tuncq; serpens omnis solet vocatum γάρας, id est, senium & exuvium colligere, quod est crassissimū quoddam regumentum tempore quo delituit contractum magis quā aetate animalis. Non statim igitur ubi latebras egressæ sunt, capiendæ, sed permittendæ aliquandiu, & aëre frui, & consueto vesci cibo, hoc est, herbis quibusdam & animalibus, ut buprestibus, cantharidibus, pityocampis: hæc enim idonea ipsarum sunt alimenta. Nec te moueat, quod Crito in fine veris capit, Galenus initio veris: lib. autem simplicium vndecimo, ineunte æstate optimam viperarum carnem prodit. Nam hæc tempora sunt finitima, & parui momenti est horum differentia, si ceteras conditiones ante venatum necessarias, quas nuper dixi, obseruaris. Ne autem capiantur æstate media, quia tunc caro earum fitim efficit, ut semper earum, quæ in locis maritimis, aut aqua salsa. Neque capiantur mox, ubi latebras reliquerunt, quod tunc earum caro frigida est & sicca, ac male nutrita, sed tempore inter hæc medio, desinente scilicet vere, nondum verò inchoata æstate:



æstate : vel si ver admodum hyemale extiterit, æstatis initio non longè à Pleiadum ortu. Non capiendæ item prægnantes, quia emaciatae sunt. Capiendæ autem sunt notandæ magnitudinis viginti, aut paulò plures. Hæc enim quantitas medicamento non erit nimia, vt ad totius confecturæ copiam sufficiat, vel pro quantitate compositionis accipiendæ sunt. Capita & caudas recens caprarum & adhuc viuentium præcide, vt cum sanguine virus effluat. Præcides verò in magnis viperis ad digitos quatuor: Damocrates autē capita ad tres digitos prius, postea caudam ad paulò maiorem quantitatem præcidit apud Galenum, quòd hæ partes sunt virulentæ magis & duræ, & modicæ carnis. At Gale. lib. vndecimo simplicium caudam negat præcidendam, quòd quæ ad hanc excremēta tam liquida quàm sicca esse possunt, exenteratis viperis facile eluantur: quod autem in ore est venenum, ineluibile est. Idem verò in libro de Theriaca ad Pisonem aliorum sententiam sequutus caudam tollit, quod sordidiorem (inquit) substantiæ portionem pars hæc magis exercita plenius trahit, vt quæ piscium caudis proximæ sunt partes, ob frequentem motum magis nutritæ sunt. Quòd si post amputationem dictarum partium



protinus exangues ac immobiles & mortuæ fiant, tanquàm theriacæ inutiles reiciantur. Contrà quæ aliquandiu post præcisionem motum aliquem retinent, & sanguinẽ diutius fundunt, præstantissimæ, quia virtutem habent *ωγὸς τὸ σκόλειον*, id est, ad feruendum non ignauam sed validam.

Partibus his resectis, intestina exime, quia sunt excrementorum receptacula. Cute deinde vt anguillis detracta, & tota pinguedine ceu inutili exempta, corpus reliquum aqua pura probè lotum in fictile vas elegantissimè constructum, vel ollam, vel cacabum, vel leberem probè extersum & splendidum immitte cum aqua fontis pura, anethoq; viridi, tunc enim viret. Fasciculum verò mediocrem anethi sicci Damocrates imponit. Coque mox igni ex carbonibus perustis, aut lignis ob siccitatem *ἀνάπνοισ*, id est, sine fumo, aut potius ex vitium samentis, cum pauco salis recentis, si apto tempore cepisti viperas: sin estate, sine sale. Hũc autem salẽ statim initio imponit Gal. libr. II. simplic. dum coquitur verò, miscet lib. 2. ad Glauconẽ, quæ tenui discrimine distant. Id autem fit ad compositi suauitatem, quæ etiam causa pastillis theriacis ad læuorem tusis & cribratis vtendi tempore salem miscet, libr. II. simplic.

Vbi



Vbi iam percoctæ sunt, vt caro ossa & spinas promptè relinquat, & edi possit, deponere ab igni, aqua exime, carnes a spinis viris olentibus & abiiciendis, accurate secretas, ac probè tritas cum pane friato misce, & pastillos forma.

Panis sit purissimus ex purissima semida li, id est, similagine & flore farinæ, salsus, fermentatus, non hipnites, id est, coctus sub testa, sed clibanites, id est, coctus diligenter in clibano, alioqui medicamentum facilè acefceret. In sicca domo tã bene sit ficcatus, vt in mortario ad leuorem tundi possit.

Panis momētum miscet Andromachus, id est, partem dimidiã, vel tertiam, vel quartam, interdum quintam, quantum scilicet pastillis formandis sufficiat. Panis vnciam vnã carnibus viperarum sexdecim accumulatis miscet Crito. Panem triticeum purum æquali pondere miscent Damocrates & Magnus. Eum panem maximè friatum & læuissimè in mortario tritum misce cum carnibus accuratè, & subige, vt nulla viperinæ carnis portio non læuigata maneat. His probè tritis affundunt parum iusculi decocti plerique, & Galenus in Theriaca ad Pisonem, & Actuarius: libro autem simplicium vndecimo, panem requirit siccum, vt contundi in mortario pos-



fit: tamen tundendo non miscetur carni, sed decocto viperarum maceratur, & caro in mortario coquorum teritur, donec sit levis, tuncque pani miscetur, sic ex pane non sicco, sed per viperarum decoctum irrigato, diu se, & Casarianos ante se medicos præparasse Galenus scribit: sed quia ægrè siccescebant, & caro putrescebat, panis verò acescebat, cognitum errorem Galenus emendavit, & iusculum miscere desuit. Quum ex pane sicco facilius siccentur pastilli, quàm irrigato, & panis per se in læuorem tritus carni viperinæ etiam per se prius exactè læuigatæ melius miscetur, & fiunt cycli vel cyclisci, id est, orbiculi, vel ἀγίσκοι, id est, pastilli, (quæ alio diminutiuo λυκίσκια καὶ ἀγίσκια vocat Damocrates) vel τροχίσκοι, id est, rotulæ tenues mel mediocres opobalsamo modico subacti. Nā crassi, ut qui cum iure sunt facti, antequàm siccescāt, carnem viperarū putrescere, & panem acescere permittunt. Mox ubi erunt formati trochisci, siccentur in domo calida sicca, & in eadem reponantur. Sit autem domus hæc sublimis, & meridiem spectet, aut saltem non septentrionem, ut bona diei parte domus accipiat solis radios, sic tamē ut pastillos in vmbra locatos solis splendor & radius non attingat. Sic enim facilè siccabuntur,

&

*I. i. ii. sim  
plic.*



& si continenter verteris, vtraque parte æqualiter. Nisi autem vertantur, parte superna plus iusto siccantur, inferna humidiores, dum diutius manet, putrescere periclitantur. Siccati in eadem domo etiam extra solis radios condantur, continuè vertendo aliis diebus plurimis vt quindecim: post donec theriacen sis præparaturus, repone vase vitreo, vel aureo potius quàm stanneo, vt quod plumbi mistura adulteratur. Quod autem ex argento non purgato fit, celerimè huic ærugo obnascitur. Ob id ex vtroque metallo, stanno inquam, & argèto non purgato, vasa non in hac solùm, sed in cæteris quoq; antidotis vitabis. Præstaret tamen non multò post his pastillis vti. tamen efficares adhuc sunt post annum, & post tempus etiam longius. Nam probè initio siccati & repositi annis tribus & quatuor in vigore permanent, si modò puluerem ipsis obductū linteis puris aliquoties abstergas. Cuius diu adhærescentis occasione perforantur, tuncq; inutiles euadunt, alioqui vtilis, etiam si plurimum inueterentur.

PASTILLORVM SCILLI-  
ticorum confectio.

*Pastilli  
scillini li.*

**S** Scillam bonæ magnitudinis (non tamen  
admodum magnam & enormem) bene  
habitam & nutritā, albam, recentē ex terra

*I. anti. &  
lib. de the.  
ad Pison.*

S 5



sumes, cū folia eius & caulis exactè inaruerit, seu vt Crito iubet, quando triticum metunt: tunc enim potissimū viget. Corticosa eius parte & radice lignosa omni adempta, corpus reliquū maza seu farina tritici optimi, recentis, fermentata & subacta circumline (quidam etiam cum cortice maza circundant) non autem gypso aut luto cum Critone: id enim sordidum est. Deinde in calido cinere copioso vel clibano calido, si quis adest, cum panibus quoque, vel *ἰωνῶν*, id est, testa furnacea, vel cacabis, vel patinis quibus panes coquuntur. Coques autem æqualiter, & donec maza bene ficcata in crustum omnino durescat & abrūpatur, ac festuca in scillę corpus per rimas demissa prout recipiatur.

Crusto abiecto, scillę medullam cū Critone, id est, scillę ipsius partes interiores tenerrimas, exactè tritā misce cū farina erui candidi (non albū enim est vehemēter amarum) parum torrefacti. Farina autē hęc sit optima, recentissima, adamussim leuigata, tenui cribro creta, vt sit vna farine pars, scillę duplum cum Critone & Damocrate & Magno: vel cū Andromacho minore, duę partes farine, vt 3. nonaginta: scillę verò tres, vt drach. centū viginti. Sed largior hęc farina, vt parcior est dimidia cum Damocrate



crate & aliis. Portio autem farinæ & scillæ æqualis Galeno magis placet, ceu fingendis pastillis aptior.

Quidam huius farinæ penuria micam panis friatam, vt in pastillis theriacis addunt. Formantur autem trochisci mediocres, & siccantur ac reponuntur vt theriaci.

### HEDYCHROON MAGMA

*sic conficit. Andromachus.*

Mari, amaraci ana drac. duas.

Asari, aspalathi, schœnu anthus, calami aromatici, phur	} ana drach.
Pontici, xylobalsami, opobalsami, costi, cinnamomi.	

Myrrhæ, folij malabathri, costi, casia, nardi Indicæ, ana drach. sex.

Amomi duplum.

Mastiches Chiæ drachmam vnam.

Omnia vino falerno sparge, fac magma.

### HEDYCHROI MAGMA

*tis compositio alia ex Magno Galeni.*

Aspalathi radicis corticis, calami aromatici, schœnu anthus, phur, costi, asari, xylobalsami, casia, mastiches, fuliorum malabathri.	} ana drachm. sex.

Nard



Nardi Indicæ drach. sexdecim. Croci drachmas nouendecim. Amaraci drachmas viginti. Cinnamomi, amomi, myrrhæ ana drachm. viginti quatuor vino falerno excipe, & opobalsami contactu. Pastillos fin-  
*\* Piperis* ge, sicca in vmbra. Pastillos Hedychroos  
*lōgi 3.24* pater: cui iisdem propè componit bis Actuar. sed pon  
*ponit An.* deribus, vt hîc quoque, mutatis, & quibus-  
*credēdum* dam omisissis, quibusdam additis.  
*magis quā*

filio ponē-  
 ti tantum  
 drac. sex.

## THERIAGES

compositio.

Illius e-  
 nim pōde-  
 ra carmi-  
 ne elegia-  
 co scripta  
 de praua-  
 ri non po-  
 tuerūt: fi-  
 lîj prosa  
 scribentis  
 potuerūt.

Pastillorum scilliticorum drachmæ qua-  
 draginta octo Andromachus, & cum eo cæ-  
 teri: sed Demetrius tempore Galeni factus  
 etiam archiatros, tantum drachmas qua-  
 draginta sex miscebat.

Pastillorum theriacorum  
 Magmatis sicci hedichroi } ana drach. vi-  
 \*Piperis nigri Damocra. } ginti quatuor.  
 Opij

Rof



Rosarum siccarum folio-  
rum

Scordij Cretenfis

Buniadis dulcis seminis,  
gongilidis agrestioris  
seminis alij.

Iridis Illicæ odoræ

Agarici albi Pontici

Cinnamomi.

Hæc duo omittit Andro-  
machus pater, addunt fi-  
lius & Damocrates.

Succi glycyrrhizæ, sicci  
addit Damoc.

Opobalsami Iudaici bo-  
ni

*Nap.*

*Ruel.*

*Act. A-*

*uc.*

*Rap. Ni.*

Singulorum  
drachmę duo  
decim.



Myrrhæ Trogloditidis  
 Croci Corycij, vel potioris  
 Zingiberis ficci & acris  
 \*Rhabar bari. Rhei Pontici integri  
 Pentaphylli radice  
 Anice. Calaminthes siccæ, hoc est,  
 nepithæ Romanis dictæ.  
 Prasij seminis, vel cum Da-  
 mocrate,  
 Σφαρίων, id est, verticillo-  
 rum marrubij  
 Petroselini Macedonici mō-  
 tani, tenuis seminis  
 Stœchados Creticæ, vel à  
 Stœchadibus insulis  
 Costi candidi  
 Piperis albi & longi. Cyanei  
 Andropater.  
 Dictamni herbæ Cretensis.  
 Σχοίνου ἁλῆς & Damocrates:  
 λαρφίων alij, id est, iunci  
 odore floris, σχοίνου ἐνώ-  
 δους alij  
 \*ἀμύρον. Thuris \*insecti,  
 masculi Casie fistulæ nigræ corticis  
 alij. Nardi Indicæ

Singulo-  
 rum drach.  
 sex.

Polij



Polij Cretensis comæ  
Seseleos

\*Stryacis Pamphylj

\*Thlaspeos tenuis Creten-  
sis, vel potius Cappadocis  
magni

Ameos

Chamedryos } campestris

Chamepityos } Cretens.

Hypocistidos succi flauētis

Malabathri foliorum

Terebinthinæ

Nardi Gallicæ puræ

Gentianæ radices

Anisi seminis torrefacti

Mei Athamantini

Succi acaciæ adhuc humidæ

-Damo.

Fœniculi Cretensis seminis

Terræ Lemniæ

Chalcitidis tostæ

Amomi vuæ

Acori

Phu pontici

Carpobalsami

Hyperici Cretensis seminis

Gummeos

Cardamomi

\*liquida

Amic.

Calami-

ta Nic.

\* θλάσ-

πε & λε.

π/ης.

Singulo-

rū drach-

mæ qua-

tuor An-

dromac.

drachmæ

duæ Da-

mocra-

tes.

Lacryma

aliq.

Carda-

mi, id est,

našturtij.

Dau



Anicē &  
Nicol.

Mumia

Nicol.

Belgear.

Anicēna

addit.

Aristolo.

lōgē Nic.

rotundē

Anicēna.

Dauci puri Cretici seminis

Galbani, χαλβάνης, χαλβά  
vidis

Andromachus senior.

Sagapeni recentis & veri

Opopanacis

Bituminis Iudaici

Castorei seu castoris testi-  
culorum

Comē centaurij Cretici te-  
nuis non recentis

Radici tenuis aristolo-  
chia propē siccatae

Singulorum

drachm. duae

Androm. 3.

vna Damo-

crates prae-

stantiss. Me-

dicus, in lib.

de antidoto-

rū cōpositio-

ne versibus

scripto. Cæ-

tera Andro-

macho con-

sentit.

Mellis Attici drachmas cētū quinquaginta, seu libras decem Androm. vini falerni, quod sufficit. Aliā ordine contrario scribit Galenus, incipiens vbi alij desinunt: à minimis enim pōderib⁹ incipit, & desinit in maxima, à quibus alij incipiunt. Incipit enim Dauci fructus, opopanacis, &c. ana drachm. duas. Polij comæ, seseleos &c. ana duplū, id est, drach. quatuor. Myrrhæ, croci &c. ana drach. sex. vbi etiā χαλαμή additur: reliqua eodem ordine, dupla tamen proportionē.

Ex his patet Adromachō per omnia cōsentire Damocratē, præterquā in duobus dictis pōderibus. Xenocrates etiā studio sē incomponendis medicamentis versatus, per  
om.



omnia Andromacho cōsensit, præter quàm quòd sagapeni drachm. tātūm duas miscet. Magnus tempore Galeni etiā Imperatoris archiatros sagapeni etiam drachmas tātūm duas, & chalciteos miscet. Cinnamomū autem duplicat, & duos vini falerni sextarios infundit. Alij autem qualicunque vini mensura vtuntur, vt postulat vsus. Cetera omnes Andromacho consentiunt.

Modus componendi Theriacen.

Pastilli theriaci, scillini, magma hedichroi dicta prius tria genera, scilicet, herbæ, radices, semina. Piper\* album & longū, rosæ sic-  
cæ, agaricum, crocus si siccus fuerit, sphragis  
Lēnia, chalcitis tosta, amomū, cinnamomū,  
casia fistula, opobalsam. acacia (præterquàm  
si mollis sit & liquida) castoreum. \*aspala-  
thus, sicca hæc terātur in pila Aegyptia, vel  
alia quoq; durissima, ne aliqua huius substā-  
tia inter tundēdum extrita, cum his prædi-  
ctis remisceatur. Læuigata hæc cribro re-  
nuissimo incernātur, vt in corpus prōptiūs  
penetrent. Myrrha autem & crocus si non  
sit siccus, vino macerata læuigentur, si tibi  
ita fieri tutiūs videbitur, vt crocus natura  
humidius non teratur. Omnes item opī, vt  
sagapenum, opopanax, opium, acacia (si  
liquidior est, & tundi contumax) succus  
hypocisthidis, succus glycyrrhizæ, vino per

*Ad ver-  
bum hæc  
omnia ex  
Galen.  
mutuatur  
Actuar.  
\*nigrum  
addit  
Act.  
\*ασφαλ-  
θος Ac.*

T



fusi soluatur, & ad laeuigationē fiat idonei.

Sed thlaspi & gongilidos semen satius est per se in pila tūdere (quia cū aliis tusa mortario hærent) leinde vinum affundere, quoad exactè dissoluantur, tunc misce his quæ vino macerata & laeuigata fuerunt. Sic thus per se in mortario terere præstat, sed leuiter ne late scat: & cretum in pröptu habere, vt inspergas his quæ vino leuigata sunt. Gummi vino infusum macerari potest, ac ipsum vel per se vel cū thure laeuigare. Sic quadā ex vino, alia per se laeuigāda. Cū hæc omnia vniēdi tempus erit, in vase duplici liquetur cum melle, prima resina therebintina, post hanc styrax & galbanum prius confracta & contusa in pila pistillis aut vectibus ferreis, paucissimo mellis crudi addito. Vbi hæc nostris digitis dilatata fuerint, iam liquata in melle resinæ excipiantur, & operculo vasi aquæ insidenti imposito dissolue & coque. His enim vasi iniectis satius est mel nō amplius commouere his liquefcentibus, arida immitte his quæ laeuigata ex vino fuerunt, & misce denuò, dum abundè crassescant. Atque ita paulò post his quæ in mortario sunt, cochleari magno quæ liquefacta sunt paulatim affunde tepida, & vir aliquis robustus ipsa in vnitatem cogat.

Vbi probè coierint, & crassamēta adepta fuerint,



fuerint, crassamq; massam ostenderint, mel-  
 lis cocti mediocriter & despumati non hil-  
 iniice: mox aliquam tritorum & cretorum  
 portionem: deinde rursus mellis quippiam:  
 postea liquefacta misce tepida, & omnia in  
 \*mortario grandi, cochleari magno valen- \* *δυνία.*  
 ter contere, & adice quæ ex aridis super-  
 sunt, & mel. Vbi omnia in mortario per  
 cochlear vnita fuerint, omnia è mortario  
 tunc in \*pilam conicere oportet, ac vecti- \* *ἡμον.*  
 bus ferreis omnino puris & nihil aruginis  
 habentibus, continenter tundere, inclinendo  
 vectes extremos opobalsamo, donec totam  
 eius portionem absumpseris: sic enim prom-  
 ptè opus absolues: siquidem lentore medi-  
 camenti vectes detinentur, & ægrè à tun-  
 dentibus leuantur. Præstat autem in sole  
 tundere: sic enim citius omnia in vnitatem  
 coguntur. Postea pilam quæ medicamen-  
 tum continet, tege, & post quatuor aut  
 quinque dies similiter in sole contunde, at-  
 que id iterum & iterum post sex aut septem  
 dies, vsque ad duos menses, aut omnino ad  
 quatuor dragintra dies feceris.

Tunc manu opobalsamo pauco intincta  
 in vasa pretiosa reponatur: sic tamen vt illa  
 non repleantur, sed spatium aliquod relin-  
 quendum, quo perspiret. Adhæc oper-  
 culum sæpe detrahendum est, vt liberius



exhalet, & maturior ipsius vsus tibi cōtingat: longo enim tempore ad coctionem sui antidotus indiget, vt postea dicetur.

Color eius quia virtutem non mutat, paruifaciendus est: nigricat autem nisi propter chalcitidem malè vltam, flauum aut fuscum fiet, quæ quauis pauca sit (nam drac. quatuor) aliorum tamen colorem superat.

Sic autem componit Damocrates:

Succos, lacrymas, metallica ex vino terit, ad mellis crassitiē arida cetera tusa, & creta tenui cribro protinus iniicit, & miscet probe melle adiecto. Postea bis tēve feruefactum, vbi rursus rigauit, imponit vasi vitreo, argenteo, aureo, stanneo, corneo: vel ollæ densæ, non vasi ligneo.

Omnia ad theriaces compositionem necessaria sunt abundè exposita. Tamen temerarius fuerit, qui ex sola lectione theriacem cōponere aggredietur: semel enim cōpositionem spectare omnino est necessarium. Descriptiones verò theriaces ab Andromacho patre, Damocrate, Critone versibus expressæ magis recipiendæ sunt, quòd memoria faciliùs tenentur, & quòd mensuræ & pondera in eis adulterari nequeant.

Vires antidoti Theriacæ ex Andromacho seniore primo libr. antid.

Gal. & Damocrate.

Effic



Efficacissima est Theriaca contra potum papaveris, cicutæ, hyoscyami, aconitum, Medææ pharmaca, cantharidas, morsum viperæ, ceraſten, diſſadæm, dryadem, hæmorrhœon, phalangia, hydruſm, epichæruſm, amphisbenam, rubetam, cherſydrum, canis rabidi morſum, potionem veneni. Valida etiam eſt ad ſtomachum æſtuatẽ flatuſ ſtomachi, colicũ dolorem à flatibus, phthiſim incipientem, aſthma, pleuritidem, empyema, icterum, hydropem, ſpaſmum, tetanum, opiſthotonon, emproſthotonon, veſicæ vlcus dolens, iſchuriam, ſatyriafin, renum dolorem. Peſtem, & alia propè innumerabilia, quæ ſcribuntur in lib. de commodis thariaces.

## V S V S T H E R I A C E S.

Datur Theriace vt Mithridatios, & cæteræ antidoti, ad præcautionem quidem fabæ Aegyptiæ magnitudine ſemel cum tribus aquæ calidæ cyathis.

Ad curationem verò ſumpti iam veneni quotidie bis detur quadruplo vel quintuplo aucta. Capitur autem hora ſomni, vel manè, vel vtroque tempore. Manè quidem hiſ, qui die ægrotant: veſperè verò hiſ, quibus nox eſt moleſtior.

Da autem potui nec recēs nimis, nec veſtate peraridum, quale ſi fuerit, cum pauco

Li. I. ant.

Damocr



melle iterum feruefac, & diu tere, tandem habebis vtile, quod valebat nihil, sed inualidius, cò quòd semel tantum miscuisti. Recens verò prapollentem adhuc habet opij frigiditatē, eòq; stupefacit, nec præstat quidpiā promissarum prius virium, quoad fuerit percocta. Tempore autem longo, plurimum annis duodecim ad coctionem eget antidotus: vigentior autem validiorque est ab anno quinto, sexto, septimo, præsertim in his, qui à virulentis feris, aut cane rabido morfi sunt, & pharmacis lethalibus petiti. Hi enim omnes cum grauem noxam ab his venenis acceperint, potentiore theriace indigent. In aliis verò affectibus vbi tanta noxæ causa non est, sufficit vel sexagenaria theriace. Potens enim est ad annos triginta.

Valida autem & vicens iudicatur, si data post medicamentum aliquod purgatorium, sua virtute, medicamento purgantis efficaciam euincat, & medicamentum purgare prohibeat. Quòd si purget, perinde ac si homo theriacem non sumpsisset, liquidò constat adulterinam esse, ac vires eius inualidas: aut vetustate confectas esse, vt ne medicamento quidem virtutem superare potuerit. Quam tamen Marco Antonino Imperatori ex recepte cinnamomo primi generis parauit Galenus,



Ienus, sumpsit statim Imperator, non preteritis adhuc mensibus duobus integris, non expectata medicamenti coctione, Galen. i. antidotorum.

Theriace ut Mithridatios singulis diebus sumpta, omnino à deleteriis & lethalibus pharmacis securos reddit: sumitur autē ad fabæ Aegyptiæ quantitatem ex aqua, aut vino, aut melle, aut per se.

Huius quotidiano usu Aurelius Antoninus Romanorum Imperator (cui etiam medicus fuit Galenus) à graui sopore, quo in actionibus suis cum premebatur, sanatus est, adempta papaueris lacryma. Cum autem postea bonam noctis partem duceret infomnem, tum ob siccitatem naturalem (erat enim siccioris temperamenti natura) & ex longo usu medicamenti siccatis acquisitam, tum ob omissum consueti & soporiferi medicamenti usum, coactus est etiam theriacam cum papaueris lacryma compositam, sed inueteratā adiicere. Nam in huiusmodi medicamenti opium vetustate mitescit.

Morsus ab animali venenato sumpta theriaca omnino euadit, & hac præsumpta si post mordetur, non moritur. Quod saepe pretores in noxiis hominibus probarūt. Gr. in aliis animalib<sup>9</sup>. Quotidie tota vita fanis



salubriter sumitur Theriace, siue venenum metuant, siue vt diuus Marcus Imperator, corporis iuuādi gratia, hoc vsu etiam affatim, & veluti alimento quodam. Vnde initium magnæ estimationis Theriaces, & vires actionis eius hominibus innotuerunt, & sub illius seculi maximis Imperatoribus in publicum vsus eius prodiit.

Antidotus Esdræ (quisquis is fuerit) eadē propè pollicetur, quæ Theriace, sed hac multo est ad omnia imbecillior, ob id obscurata euiluit quouis modo parata. Nam Actuario ex 27. cōponitur: Aërio & Paulo ex 47. nec iis omnino iisdem nec eodem pondere: Nicolao ex centum quadragintaquatuor.

Ambrosiam & Athanasium à iunioribus Medicis nominatas esse antidotos, docet Gale. libro 8. meth. hæsq; calfacere & siccare, vt Theriacen. Has quoque tres antidotos Ambrosiam, Athanasiam, Theriacen, sumptuosas esse dicit li. 14. meth. & salubriter sumi contra internos abscessus, præsertim viscerum, vt collectum humorem in halitum resoluant, & digerant, & in libr. sanit. tuendæ harum meminit.

Antidotum Mithridatis Athanasium triplex, libr. 2. antidotorum. Est & Athanasia hepatica Alexandri Tralliani, & Athanasia Oribasij apud Paulū, & Ambrosia Philippi



lippi Macedonis, lib. 2. antido. quarum nulla est hodie in usu, aut non admodum frequenti, quod harum loco Mithridarios aut Theriace recipiatur, adeo magna omnium fide & summis successibus probata, ut myropolæ quidam circumforanei in Gallia questum vicatim faciunt suis, nescio quibus, compositionibus, quas tamen Mithridatij & Theriaces nomine diuendunt. Hæ igitur Athanasie, Ambrosie, Acharisti, Hadriani, Hemagogi, & aliarum quarundam Arabibus celebratarum compositionum loco fuerint, ut veluti postliminij iure in usum redeant, cum eadem omnia præstent, multo; felicius, quam Arabum compositiones ex istis excerptæ, additis aut ablatiis quibusdam, neque his magni momenti.

AVREA ALEXANDRI  
ANTIDOTVS.

Recipit asari	}	Ana drach. duas &	
Carpobalsami		dimidiam. ss. Had.	
Seminis hyoscyami			
Caryophyllorum	}	Ana drac. 2. 36. Had.	* Μύρτα, id est, bac- cas myrti Aetna.
* Myrrhæ omnes			
legunt,			
Ciperi			
Opij Thebaici			

T S



Opobalsami

Cinnamomi

Folij

Zedoariæ

Zingiberis

Costi

Corallij rubri

Cassia lignæ

Euphorbij

Tragacanthi

Thuris

Styracis

Nardi Celticæ

Mei

Cardamomi

Sesileos

Napeos, seu semi-

Sarxiphagi Act. ra-

dicis saxifragiæ alij

Anethi

Anisi

Xylaloës

Rhei Actuarii. Rha barbari &amp;

Rei Pontici Arnaldus.

Luphiæ compositæ Actua. Aliptæ

moschata, quod idem est, alij.

Castorij

Spicæ nardi

Galangæ Actua. &amp; cæteri.

Ana drachmam

vnam. 18. Had.

nis sinapi. Eius loco  
selinõ. i. apium Act.Hoc Actuarius o-  
mittit.

Opop



Opopanax	
Anacardij	
Mastiches	
Sulfuris vini, omnes.	
Pæoniæ radicis	Ana
Eryngij	exa-
Rosarum Actuar. omittit.	gium
Thymi                      Acori	dimi-
Pulegij. Eius loco habet Actua-	dium,
rius Halicacabi.	Actu.
Aristolochiæ longæ Actuarius	dr. dr.
utriusque alij.	sed
Gentianæ	dra. r.
Corticis radicis mandragoræ	& di-
Chamædryos	midij.
Phu. Act. radicis Valerianæ alij	Arnal
Baccarum lauri	dus.
Dauci Cretici, Ameos	
Macropiperis	
Leucopiperis, oēs præter Actua.	
Xylobalfami	
Carui, omittit Actuarius	
Amomi	
Petroselinij seminis	
Libyftici semin. Actua. leuiftici	
Seminis rutæ                      (alij.	
Seminis finonis. Eius loco hyf-	
sopi habet Actuarius, & addit	
electri, id est, succini	

Auri



Auri }  
 Argenti } { Lima-  
                   } { turæ  
                   } { tenuif  
                   } { limæ

Margariton, Aët. am-  
 barum margarita-  
 rum non pertusa-  
 rum & pertusarum  
 alij.

βλάτῃς, Aëtuar. id est,  
 onychis.

Osis cordis ceruini.

Eboris

Calami } Ana ℥.s seu drach. sex, Aëtuar.  
 odora i } alij tantum grana 9. vel 8.

Pyretri

Mellis quantitatem sufficientem: mellis de-  
 spumati libras tres, Arnald. Mel tacet Aët.

Hæc antidotus aurea, vel ab auro quod  
 recipit, vel à pretio & virium præstâtia di-  
 citur. Cuius autem Alexâdri an Philosophi, an  
 Medici, vel alterius, compertum non habeo.

Efficax est contra defluxiones capitis fri-  
 gore conceptas, oculorum lacrymas exsiccat,  
 dentiû dolores lenit, & capitis omnes cru-  
 ciatus à frigido vel humido illita frôti. Co-  
 mitiales, insanos, vertiginosos, paralyticos,  
 apop



apoplecticos mulcet. Tabidis, russiculosis, asthmaticis, sanguinē screantibus, cardiacis, ischiadicis, colicis, nephriticis, dysuriæ, strāguriæ, ischuriæ presenti est auxilio. Calculos renum & vesicę cōminuit. Quotidianis & tertianis febrib⁹ circa accessionis initiū cū decocto stœchados eximiē medetur. Has eius vires ab Actuārio celebratas fusi⁹ explicat Arnaldus in lib. de antidotis: sed si ad Mithridation & Theriacen spectes, vsu plurimo maiorū nostrorū probatissimas antidotos, & omnia hęc ac multò plura felicissimē prestātes, nihil est, quod Arabū Aureā, Hadrianum, &c. antidotos laudes. Initio, stupefacit vt theriace, inueterata, coctis simul omnibus calida euadit, affectibus ob id frigidis salutaris hęc aurea. Aurū, argentū, ebur albū tenuissimē limatū vult Arnald. Balsamū melle modico dissolutū miscetur.

Dosis est quantitas auellana.

Adscripserā quoq; his alias antidotos *διὰ  
 λόννων βαφινών: διὰ μέσχα διὰ ἀγομάτων, διὰ  
 λουπρών, διὰ μαργάρων, διὰ ἄνθων, διὰ πανάγδων,*  
 arteriacas, thoracicas, stomachicas, cathar-  
 ticas, hieras, trypheras, & alias reliquas v-  
 surpari hodie consuetas. Cataporia quoque  
 mitiora, valentiora, mediocria. Trochiscos  
 item atq; condita & syrupos, in quibus su-  
 mendorū materia ferē continetur. Sed cūm  
 mihi



mihi Mesue antidotarium esset in manibus plurimâq; iam dictorum ex Mesue ipso descripsissem, æquius putavi ea omnia ad Mesuem referre, ne dictum dicerem.

## DE SVCCIS MELLE, AVT SACCHARO CONDITIS.

**Q** Voniã facilius est impleri potu quã cibo, tam sanis quàm ægris, & potus ob liquiditatem linguam promptius & altius afficit, ac os ventriculi cæterasq; partes, quas celeriter permeat, maximè solliciti fuerunt maiores nostri de potu ægris iucundò & salubri: partim ad sitim extinguendã & partes principes roborãdas: partim ad liberandas obstructions, finiendãq; alterando putredinem: partim ad tenuandum crassa excrementa, incidendum, & tergendum lenta: partim ad ea vi naturæ iã secreta vacuandum per urinas aut sudores, interim per vomitum & deiectionem, si præsertim cò natura vergebat. Quam rem indicat potio ptissanæ, vinum ex aqua, hydromeli, oxymeli Hippocratis libr. 3. rat. victus in morbis acutis. Idem declarat Galenus suo oxymelite in sanitate tuenda, & methodo medendi, & suo hydromelite, cui interdum ad crassa tenuandum, & lenta incidendum, tergend



gendum, vt promptius purgarentur, inco-  
 quebat hyssopum vel thymū, vel pulegiū, *Ap. 24.*  
 vel calaminthen, vel origanum, vel satu- *libr. 1. &*  
 ream, vel aliquam ex his similibus. Idē Ori *libr. quos*  
 basij, Aëtij, Pauli, Tralliani, ἡδεα ὠφέλιμα, *purgare*  
 πώματ'α, προπόματ'α ἀποζέματ'α, id est, suaues, *oportet.*  
 vtilēs potionēs, propinationes, deferuefacta  
 ex herbis vel radicibus, & decocto molun-  
 tur. Idem Actuarij potionēs febricitantium  
 inscripte. Idem recentiorum præcipuē Ara-  
 bum promittunt, & præstant syrupi, vel  
 quasi ex Syria delati primū ὁπωί, id est, suc-  
 ci conditi, vt Hermolao videtur, vel συρῶν-  
 τες ὁπωί, id est, trahētes succi, quāquā pau-  
 ci facultate trahendi sint præditi: vel corru-  
 pto nomine pro σύνωποι, vel pro σιγάπια,  
 qua voce Actuarius & Simeon vtuntur. De  
 quibus & aliis egrorum potionibus cur hīc  
 fusiū non scribam, paulō antē docui: mihi  
 nunc satis est, pauca quædam stomatica &  
 stomachica ex Galeno adscribere, quæ sy-  
 ruporum typus quidam fuerint.

Diacydoniω Galeni appetentiam lan- *Lib. 8. cō-*  
 guentem excitat, coctionem ciborum iu- *pha. par.*  
 uat, iecur & vētrem totū roborat, ventricu-  
 li dispositiones propē omnes, exceptis quæ  
 ab æstu vehemēti fiunt, modicē iuuat. Re-  
 cipit carnis malorum cydoniorum, mellis,  
 acetij albi, ana li. tres. Piperis, zingiberis ana

vnc.



uncias tres. Petroselini Macedonici vnciam  
 vnam. Paulo aliter in fine libr. 6. sanit. tuen-  
 da. Succum malorum cotoneorum, stru-  
 thiorum (quæ maiora sunt & dulciora) mel-  
 lis boni Attici ana sextarios Romanos  
 duos, aceti sextarium vnum & semissem, aut  
 si abunde sit acris, satis est sextarius vnus. Vbi  
 modicè super prunas coxeris ad mellis At-  
 tici spissitudinē, & despumaueris, adde zin-  
 giberis vncias tres, piperis albi vncias duas.  
 vnc. j. libr. 8. f. partes: deinde igni simili re-  
 coques, ad mellis crassitudinē. Si id astringe-  
 re magis voles, fac ex cotoneorum succo.  
 In calido autem ventriculo aut bilioso au-  
 fer piper & zingiber: in frigido & pituito-  
 so zingiberis vnc. quatuor, piperis vnc. tres,  
 vel duas & dimidiam. In mediis tempera-  
 mentis dimidium misce. i. zingiberis vnc.  
 vnam & semis, piperis vnc. vnam, libr. 6. san-  
 tuend. vnum aut duo cochlearia sunt dan-  
 da. libr. 8. method.

Diacydonion medicamentosius est apud  
 Nicolaum tale: Carnis cydoniorum excor-  
 ticorum, exēteratorum, in aqua elixorum  
 li. tres tere, cerne: deinde in mellis despuma-  
 ti lib. quatuor & semisse, coque semper mo-  
 uēdo rudicula, donec crassescat, nec digitos  
 inquinet. Ab igne deposito misce paulatim  
 rudicula semper ducēdo cinnamomi vnc. i.  
 &



& semiss. zingiberis vnc. vnam piperis, galangæ ana semunc. caryophyllorum, nucis moschatæ ana 3. tres, spicæ nardi, xylaloës, macis, cardamomi ana 3. duas, zeduaris 3. vnam. Est apud Mesuen eius descriptio triplex inusitata. Dia cydoniorum, μέλον, catharticum Alexander ad podagram describit. Hodie succum & carnem cydoniorum saccharo cōdîmus sine aromatibus, ad mense dona secundæ præcipuum, & aluum cohibendum.

Nicolaus ex succi mororum hortensium lib. semiss. succi batinorum libra vna, mellis lib. semiss. sapæ vnc. trib. coquit donec marmori affusum ipsi inhæreat, & digito tactū parum sequatur, mox in se resiliat, ad palati excoriationes, ardorem faucium & gulæ, ac initium synanches.

Mesues amborum mororū succi ana lib. 1. semiss. & sapæ & mellis ana lib. vnā, coquit ad mellis spissitudinem. Cōpositius fit addendo aluminis, myrrhæ, croci, omphacij ana, si opus est. Succus per se initio est efficacior, etiā aliis astringentibus, rho, balustio, rosis: mistus post principiū cum mel le est melior succus.

Dia moron Galeni stomaticum seu ad partes oris inflammatas dum affluit materia. Succi mororum libras quinque coque

Lib. 6. cō.

ph. part.

Her. as e-

tiam.

V



*succū per* per se ad sordiū consistentiam, postea cum  
*se praco* mellis libra vna. Id medium est, ac plurimis  
*quit, sta-* admodum placet, vt neq; de mellis dulcedi  
*tum cum* ne, nec de succi austeritate cōquerantur. Sa-  
*n elle.* lubre initio phlegmonarum oris: quas si va  
*Sapam ne* lētius vis repellere, succi rhois vel omphacij  
*adde cum* 3. vnā, vel duas, vel tres toti symmetriæ mi-  
*Arabibus* scebis, vel florem rosarū, vel rosas ipsas, ba-  
*diamoro,* lau tium, cytinum, malicorium, gallam im-  
*etiā si fal-* maturam, piceæ aut thuris corticem, succū  
*sō astring-* hypocistidis, aut lentisci, & alia astringētia  
*gat sapa* nō corruptitia, qualia sunt misy, fori, chal-  
*Dioscori-* citis, chalcāthum: nisi quod huius 3. vna to-  
*di: nec ad-* ti medicamento miscetur, vbi in ore, gula,  
*datur à* stomacho, vētriculo vlcerosa est dispositio:  
*Gale. Aē-* plus autem chalcanti ad vlcus malignum  
*tio, Pau-* & putridum dictarum partium. Vbi autem  
*lo, Tral-* constitit fluxio, misce toti compositioni  
*liano.* croci, myrrhæ ana sesquidrachmī ad phle-  
 gmonem coquendam. Crocus enim astringē-  
 do myrrham multo se tenuiorem & ca-  
 li liorē intrò in altum impellit, vbi succos  
 tenuat, & à croco foras citius efferri p̄hibi-  
 ta digerit. Adit Andromachus croci. myr-  
 rhæ, aluminis scissi ana 3. vnā, alij huius 3.  
 duas. Idem probe addit glycyrrhizæ 3. vi-  
 ginti, quæ asperitatem ex austeris ori inna-  
 tam mitiget. Eiusdem succus stomaticis o-  
 mnibus antidotis mistus præstantiores eas  
 reddit.



reddit. Coquunt eandem gargarismata ex ficis pinguibus, ex mulsâ aquosa, ex calenti sapa, oleo lentiscino in vase duplici calfacto, vel ex aqua calente. Coquentibus autē his in statu vtendum, in declinatione valenter digerentibus.

Cocta phlegmone vel etiā scirrhusa digerens aliquid toti medicamento incoque, vt nitri, vel spumæ nitri ℥. semis, vel sulfuris viui sextatē, vel sapam, cui incoctū sit origanum, hyssopum, pulegium, saturea, thymus, calamintha sylvestris & domestica, seu mentha odorata, quā à grato odore Græci veteres hedyosmon vocarunt. Medium facultate hoc remediū mediocribus phlegmonis & maiorum statui confert.

Crocus autem & myrrha, & si qua alia aromata miscēda sint, adde in fine coctionis, & cū ab igne es medicamentū sublaturus, agitando, donec omnia pulchrè cogantur. Nam largior ipsorum coctio vires eis adimit.

Multiplex igitur est diamori compositio, quia affectus per tempora varius est. cui medetur, & ob id quod non omnes eadem mistionis mensura delectat.

Diabarinon, id est, succo mororum bati seu rubi est valentius diamoro, infirmius diacaryo. Ob id Mesues & Nicolaus



ambos succos miscent, succi mororum domesticorum lib. β. succi mororum batinarum lib. vnam, mellis lib. β. sapæ vnc. tres.

Si verò simplicem illā habeat medicus, sufficit in omne tempus phlegmones, additis tunc quæ vnumquodque postulare videbitur. Multiplex etiam est Alexandro: cui etiam & Actuatio diacaryon describitur, sed Galenum sequimur.

Dia *λαγύου* stomaticon suaue, paratu facillimum, omnium efficacissimum ad oris phlegmonas ob essentiae tenuitatem, Galeno inuentum & consuetissimum.

Cortices exteriores nucum virētium & vigentium finita æstate tere in pila, succum per linteum cola, cum melle coque, despumando ad melleā crassitiem: hoc in partes quatuor diuide, vt Galenus semper diuisit, primam serua syncerā, pueris, mulieribus, viris delicatis vtēdam, ob eius dulcedinem. Id etiam solum mediocres phlegmonas interdum persanat celerrimè. Secundæ parti astringentium aliquid misce, ad repellendum affluentem adhuc initio phlegmones sanguinem. Tertiæ croci & myrrhæ portionem ad coquendū vigentem iam phlegmonem, cū scilicet fluxio cessauerit.

Quartæ sulfur viuum aut nitrum, & acria quædam ad digerendum, quod ex humore phlegm



phlegmonem faciente fuerit impactum: quoniam ea quæ affluerunt, vacuationem postulant.

Cum autē pauper medicus has quatuor cōpositiones propter sumptum parare nequeat, nec qui iter agit, has secum circumferre, satius est facere cōpositionem vnam mediam, ex succo mole aut mensura quintuplo ad mel, quale diamoron fecimus, & tēpore vtendi pro varia indicatione à morbi tempore & ægri natura hæc prædicta adiungere.

Similia his stomatica sunt, sed viribus inferiora *διὰ γλέυκε*, id est, ex musto & sapa, *διὰ ρόιον*, id est granatorum succo, *διὰ ἀρχάδων*, id est, ex pyris sylvestribus, *διὰ μήλων*, id est, ex cydoniis. Et ex cestianis, mespilis, cormis, & aliis fructibus astringentibus tritis, pressis, relidēdo depuratis, colatis, cum melle coctis. Sunt autem hæc omnia non modò stomatica, sed etiam stomachica & eustomacha, id est, quæ degluta iuuant stomachum. Diacarion autem caco stomachum est, ac stomacho noxium, plurimo melle eget: post id Diabatinon, Diamoron, sed *διὰ μήλων, διὰ ρόιον διὰ ἀρχάδων* parciore. In horum medio est succus mespilorum, cornorum, *brabylων*, prunorum. Succo igitur cydoniorum & pyro-



rum syluestrium, & plurimorum fructuum  
misce æqualem mellis portionem. Succus  
autem astringentium insigniter, vt corno-  
rum duplicatum, & interdum triplicatum  
mel requirit, Gal. libr. 6. & 8. comp. ph. part.

Διὰ γλίυκιν & fit ex mensura quauis mu-  
sti austeri, quod ex vuis amineis postremū  
fluxerit (nam quod primum fluxit, est liqui-  
dus & aquosus) & melle, additis his, quæ  
diamoro & diacaryo misceri posse diximus  
astringentibus, coquentibus, digerentibus  
ealem proportionem. Διὰ γλίυκιν Crito-  
nis etiā ad aurium & sedis vitia utilis com-  
positio est, Gal. libr. 6. comp. phar. part. Si  
autem ex musto dulci fiat, mitigat quidem,  
sed minus repellit: ex musto autem austeri  
& dulcis medio, vim mediam obtinet. Co-  
quit id Andromachus ad quartæ partis con-  
sumptionem: alij ad melleam crassitiē, de-  
inde colant, & mel simul coquunt, præfer-  
rim vbi succus est liquidior: vbi verò cras-  
sus, mel ei statim coctionis initio miscet: &  
valet phlegmonarū oris initio, incremēto,  
& statui: ad declinationem verò tedas pin-  
gues tufas incoque. Si sumptuosius vis medi-  
camentum aliquod ex his, adde casia corti-  
cem, vel nardum Indicam, vel folium ma-  
labathri, vel singulorū trium ana ʒ. vnam  
vel sesquidrach. pro libra vna mellis. Si di-  
uitibus



uitibus paras, amomum misce quātum cro-  
cum, aut myrrham, aut alumen, percolato  
stomachico mastichen Chiam interdum  
miscuit Galenus. Hæc stomatica vel gar-  
garizantur, vel illinuntur, vel ore sape &  
diu continentur, vel etiam horum quædam  
prædicta deuorantur, & stomatica fiunt.

Stomatice *δυσήστωρ*, id est, granatis auste-  
ris acidis, dulcibus, maturis & integris equa-  
li portione tritis cum corticibus, coctis cum  
melle, stomacho resolutis & cibos auersanti  
idonea est.

Crito autem aliter granatorum dulcium  
cum corticibus \* tritorum & expressorum \* *κικαυ-  
μύων.*  
sextarios sex, mellis boni sextarium vnum  
coquit ad mellis crassitiē, deinde addit alu-  
minis scissi vnc. vnam, myrrhæ semūciam.

Alia eiusdē ad vlcera oris & aphthas, id  
est, oris pustulas, succi granatorum dulcium  
heminas sex: coque igni lento in vase æreo  
ad tertias, deinde adde cinnamomi, casia,  
myrrhæ, ana drachmas, vñ omphacij, cro-  
ci, nardi Indicæ ana drachmam semissem,  
mellis heminam. Vtraque suo tempore præ-  
stantissima. Paulo diuersius Andromachus  
apud Galenum stomachicam hanc compo-  
nit, sed viribus propè iisdem.

Medicamenta stomatica ex succo moro-  
rum, batinorum, granatorum, cydoneorū,



cornorum, corticum nucum multa, ut  
 vides, medici scripserunt, ponderibus &  
 mensuris variantes: alij enim omnia vel a-  
 stringentia, vel digerentia, vel utraq; ini-  
 ciunt, nonnulli adimunt, alij aliud. Item hi  
 plus illi minus induunt. In quibus confide-  
 randum est, quod copiosius est inditum, an  
 astringēs ac repellēs est, an lenit, & coquit,  
 an digerit: ita nanq; licebit ipsis probè uti.  
 His affines sunt & succi per se ficcati sole vel  
 igne, vel cum melle, aut saccharo, aut  
 utroque cocti: hiq; tam herba-  
 rum quàm fructuum, quos  
 iure meritissimo sy-  
 rupis multis nul-  
 la sepe  
 ratione compositissi-  
 mis prætuleri-  
 mus.


FINIS.





INDEX RERVM OMNIVM  
QVAE HOC OPERE CON-  
TINENTVR.

A



<i>Bortum prohi-</i>	<i>Acidus sapor</i>	265
<i>bentia</i>	<i>Acorus</i>	20
<i>Abrotanū</i>	<i>Acorus verus, galanga</i>	
<i>Abscessus co-</i>	<i>maior hodie dicitur</i>	<i>ibid.</i>
<i>quentia</i>	<i>Acorus palustris</i>	21
<i>Absinthium</i>	<i>Acorus verus vnde adue</i>	
<i>Absinthij facultas</i>	<i>hatur</i>	<i>ibid.</i>
<i>Absinthium Pōticum vi-</i>	<i>Acorus videtur quibusdā</i>	
<i>detur esse Romanū Me-</i>	<i>calamus aromaticus</i>	
<i>sues</i>	<i>ibidem</i>	
<i>Absinthiū nostrum</i>	<i>Actiones secundas &amp; ter-</i>	
<i>ibid.</i>	<i>tias ex primis &amp; simpli-</i>	
<i>Acacia</i>	<i>cibus colligimus</i>	252
<i>Acacia vulgò dicta nullo</i>	<i>Adeps omnis</i>	180
<i>errore vsurpatur pro ve-</i>	<i>Adiantum</i>	52
<i>terum</i>	<i>Adiψ</i>	96
<i>Acantha</i>	<i>Admouendorum varius</i>	
<i>Acer sapor</i>	<i>applicandi modus</i>	624
<i>Acerbus sapor</i>	<i>Adulteria simplicium à</i>	
<i>Acetabulum</i>	<i>quibus fiunt</i>	501.504
<i>Acetum</i>	<i>Aër quando causa salu-</i>	
<i>Achoras curantia</i>		



# INDEX.

bris	344	neceſſe eſt compoſito medi-	
Aëromeli	117	camento uti	209
Aerugo	163	Agallochum	112
Aes uſtum	162	Agaricus	21
Aetites	176	Agarici facultas	22
Affectus ſpecies à quibus		Agarici doſis	22.424
indicatur	488	Agaricus dictus ab Aga-	
Affectus parvus, recens,		ria Sarmatiae regione	
ſuperficiarius, mitior apo	22		
ſtulat medicamenta : in		Agaricus quomodo corri-	
contrario, contra	391	gitur	ibid.
Affectibus applicanda me		Agaricus ſeruatur quin-	
dicamenta equalia viri-		que annis	ibid.
bis	392	ἀγγέον διπλόν	585
Affectus quando plures		ΑγνϞ	53
ſunt implexi, urgentio-		Agrimonia	58
ri maior vis remediorum		Allium magnetis vim ob-	
in compoſito opponenda		tundit	286
ibidem		Alcē	130
Affectus præter naturam		Alcēs doſis	424
quomodo facilius pellun-		Alopecia quomodo admo-	
tur	433	uentur medicamēta	485
Affectus in ore ex fluxio-		Alopeciam difficile quo-	
ne curantia	104	modo curamus	344
in Affectibus compoſitis		Alopecias ſanantia	77.
urgentioris eſt habenda		181.286.Ϟ 470.379	
ratio	208	Alphos ſanātia	32.47.77
in Affectibus compoſitis		85.173	
eiuſdem naturæ minus		Alterci ſuccus	129
		Al	



# INDEX.

<i>Althaea</i>	23	190.187	
<i>Althæe faculias</i>	23	<i>Animalia et eorum par-</i>	
<i>Althæa unde dicatur ib.</i>	tes		178
<i>Alumen</i>	169	<i>Anisi semen</i>	83
<i>Aluum emollientia</i>	52	<i>Anodynum quod</i>	258
<i>Aluum subducentia</i>	107	<i>Anthera</i>	78
130.142.170		<i>Αἰσβαλλόμενα simplicia</i>	
<i>Alyssos</i>	54	ordine alphabeti	520
<i>Amaracus</i>	62	<i>Antidoton quid</i>	342
<i>Amaracinum unguen-</i>		<i>Antidotus Esdra</i>	664
<i>tum</i>	ibidem.	<i>Antidota ante siue post</i>	
<i>Amaracinum unguen-</i>		<i>deletaria quomodo su-</i>	
<i>tum diuersum à sampsy</i>		<i>menda</i>	430
<i>chino</i>	ibidem.	<i>Apiastrum</i>	64
<i>Amarus sapor</i>	266	<i>Apium satiuum</i>	23
<i>Ambrosia antidotus</i>	664	<i>Apium vulgare est Eleo-</i>	
<i>Ameos semen</i>	83	<i>selinon</i>	ibid.
<i>Amianthus lapis</i>	176	<i>Apiorum genera omnia</i>	
<i>Amomum</i>	82	idem pollent	24
<i>Αμπας</i>	153	<i>Aphthas curantia</i>	106
<i>Αμπειλ &amp; λιωνή</i>	27	<i>Appetitū excitātia</i>	28
<i>Amphisbena</i>	286	95.147	
<i>Amphora</i>	63	<i>Arabistarum componen-</i>	
<i>Amygdala</i>	93	<i>di medicamenta ratio</i>	
<i>Anacardus</i>	ibid.	<i>damnatur</i>	299
<i>Anasarce auxiliāt.</i>	293	<i>Arancium malum</i>	99
<i>Anastomoticū quod</i>	255	<i>Argentum</i>	156
<i>Aneihum</i>	54	<i>Argentum viuum</i>	ibid.
<i>Anginis quæ prosunt</i>	75	<i>Ari radix</i>	24
		<i>Ari</i>	



# INDEX.

<i>Ari masculi succus</i>	129	<i>Asparagus</i>	27
<i>Aristolochia</i>	24	<i>Asparag<sup>9</sup> Regius et H-</i>	
<i>Aristolochia triplex radi-</i>		<i>lius.</i>	<i>ibid.</i>
<i>cis figura Gal. distincta</i>		<i>Asparagus Petrus</i>	<i>ibid.</i>
<i>ibidem</i>		<i>Aspera arteria affectus</i>	
<i>Aristolochia quando effo-</i>		<i>&amp; laringis quomodo cu-</i>	
<i>dicda, &amp; quomodo ser-</i>		<i>rantur</i>	474
<i>uanda</i>	25	<i>Asperitates arterie leniē-</i>	
<i>Armenia terra</i>	177	<i>tia</i>	34.147.155
<i>Armenius lapis</i>	173	<i>Asphaltos</i>	178
<i>Arnoglossum</i>	64	<i>Asphodelus</i>	22
<i>Aromata quæ sunt</i>	191	<i>Asphodelus autumnō le-</i>	
<i>Aromatica medicamen-</i>		<i>gitur</i>	<i>ibid.</i>
<i>ta</i>	114	<i>Asphodelus muribus re-</i>	
<i>Aromata tenuis essentia</i>		<i>nenum</i>	<i>ibid.</i>
<i>facile exanimatur</i>	192	<i>Assando quomodo medi-</i>	
<i>Aromata sunt miscenda</i>		<i>camēta preparatur</i>	545
<i>ad finem coctionis</i>	380	<i>Asthmaticis quæ prosunt</i>	
<i>Arrhenicon</i>	160		86.185.146.187
<i>Arthritis in plethorico</i>		<i>Asthmaticis quæ obsunt</i>	
<i>corpore quomodo curan-</i>			89
<i>da</i>	467	<i>Astrorū ortum &amp; occa-</i>	
<i>Arthritica</i>	276.293	<i>sum negligit Galenus</i>	
<i>Arthriticis quæ prosunt</i>		<i>in rsu medicamētorum</i>	
	35.182		454
<i>Asarum</i>	25	<i>Astrorū ratio in quibus-</i>	
<i>Asarum quando fodien-</i>		<i>dam plantis colligendis</i>	
<i>da</i>	<i>ibid.</i>	<i>observatur</i>	19.312
<i>Aselli</i>	188	<i>Attrahens quod</i>	255
			<i>At</i>



# INDEX.

<i>Aurea Alexandri anti-</i>		<i>tur quid sciendum ibidē.</i>
<i>dotus</i>	665	<i>Basis ipsius coctio, assa-</i>
<i>Aurea Alexandrina vi-</i>		<i>tie, tritura, vstio, lotio,</i>
<i>res</i>	668	<i>Et etiam rationem Si-</i>
<i>Auribus purulentis con-</i>		<i>ne quo obtinent</i>
<i>uenientia</i>	70.293	354
<i>Auribus quomodo medi-</i>		<i>Basi adduntur quæ toti</i>
<i>camenta infunduntur.</i>		<i>parti sunt familiaria.</i>
	470	355
<i>Aurium dolorem sedan-</i>		<i>Basi adduntur quæ ipsam</i>
<i>tia</i>	47	<i>in partes remotissimas</i>
<i>Aurum</i>	156	<i>conuebant</i>
<i>Austerius sapor</i>	265	<i>ibidem</i>
<i>Autoris ratio in utendis</i>		<i>Basis ob quatuor ad par-</i>
<i>nomnibus medicamen-</i>		<i>ticulam aliquam dedu-</i>
<i>torum, &amp; ponderū scri-</i>		<i>citur</i>
<i>bendis</i>	620	<i>ibidem</i>
		<i>Basi adduntur quæ ipsam</i>
		<i>deductam ad partem ei</i>
		<i>affigant</i>
		<i>ibidē</i>
		<i>Basis sine quibus affectū</i>
		<i>profligare nō potest ibi.</i>
		<i>Bases congeneres miscen-</i>
		<i>tur, nempe mite aliquod</i>
		<i>vehementi, ut habeatur</i>
		<i>medium</i>
		320.
		<i>Bases diuersæ quare mi-</i>
		<i>scuntur</i>
		317
		<i>Basi adduntur medica-</i>
		<i>menta, quæ in suo vigo-</i>
		<i>re consistunt</i>
		354
		<i>Basibus admiscenda non</i>
		<i>solum</i>

## B

**B** *Alanus myrepfica.*

27.94

*Balaustium*

72

*Balsamum*

101

*Basiliscus*

286

*Βασιλικον καρπὸς*

84

*Basis medicamenti quo-*  
*modo deligatur*

314

*Basis & radix medica-*  
*menti quid*

315

*Basis ut rectē constitua-*

*Basibus admiscenda non*  
*solum*



# INDEX.

solum quæ ipsam ad	Borago	ibidem	
partem familiarem du-	Bombacis semen	84	
cant, sed etiam quæ in	Branchos sanantia	151	
ea retineant	381	Brassica	55
Βάτ & ἰλαΐ &	109	Brassica succus	128
Bdellium	151	Brassica marina	55
Bechica quæ	262	Bryonia radix	26
Behen	27	Buhonas coquentia	180
Ben	94	Buglossus	55
Bersilium lignum	112	Buphthalmi flos	72
Besanum, Besasa	67	C	
Beta	57	Abaret Gallorum	
Betonica	ibidem	Cest Asarum	25
Bilem atram purgantia		Cacochyma quæ	263
97.110.173.281		Cadmia	165
Bilem atrā facientia	125	Κάλ &	609
Bilem flavam ducentia.		Calaminthe	57
140.107.95.96.132		Calamus aromaticus	28
Bilis flava coquēda	278	Calami aromatici electio	
Bilem utranque vacuan		ibidem.	
tia	32.42.281	Calculos renum confrin-	
Bilem utrāque & pitui-		gentia	45. 85. 103. 151.
tam ducentia	282	174	
Bilem & pituitam ducen		Calculos frangentia	29.
tia	283	34.54.147.178	
Biliosis conuenientia	125	Calculos vesicæ diminue-	
Biliosis contraria	132	tia	70
Βλάτ & βύζαντ &	190	Calor quas actiones edat	
Blitum	55	224	
		Calx	



# INDEX.

<i>Calx viva</i>	173	<i>Cari semen</i>	86
<i>Cancanum</i>	145	<i>Carice</i>	103
<i>Canceris quæ profunt</i>	165	<i>Carpesium</i>	102
167.173		<i>Carpobalsamum</i>	101
<i>Cancrorum cinis</i>	188	<i>Κάρυον βροχιδιόν</i>	105
<i>Canella nostra quid</i>	181	<i>Caryophyllum</i>	73
<i>Cantharides</i>	189.285	<i>Casia</i>	103.108
<i>Caphura</i>	146	<i>Casia fistula</i>	102
<i>Capillos tollētia</i>	147.161	<i>Cassia fistulæ dosis</i>	426
<i>Capillos redd.</i>	52.95.136	<i>Castorium</i>	185
<i>Caput quæ roborant</i>	154	<i>Catharrhos sanātia</i>	90
<i>Capitis dolorem facien-</i>	151.177		
<i>tia</i>	287	<i>Cathartica quæ</i>	261
<i>Capitis dolori ab æstu</i>		<i>Catheretica quæ</i>	259
<i>quæ profunt</i>	340.460	<i>Catheretica quomodo</i>	
<i>Capiti quomodo admoue-</i>		<i>adhibenda</i>	464
<i>mus medicamenta</i>	458	<i>Causlica</i>	86.137.161
<i>Capiti quales cucuphæ op</i>		<i>Causlica quomodo adhi-</i>	
<i>plicentur</i>	ibid.	<i>benda</i>	465
<i>Cipparis radice cortex</i>		<i>Κεχράμυδις</i>	81
23		<i>Centaurij magni radix</i>	
<i>Cipparis flos &amp; fructus</i>	28		
<i>ibid.</i>		<i>Centaurium minus</i>	ibid.
<i>Carbunculos perrumpen-</i>		<i>Cephatica</i>	266
<i>tia</i>	70	<i>Cephalalgicis profunt</i>	
<i>Cardamum</i>	86	30.71.96.154.148.188	
<i>Cardamomum</i>	ibid.	<i>Cera</i>	128
<i>Ciriliaca</i>	269	<i>Cera liquabilibus vt ma-</i>	
<i>Cardus benedictus</i>	56	<i>teria miscetur</i>	178
		<i>Kip</i>	



# I N D E X.

Κεράμιον	609	Χυλὸς ῥόϞ Pontica	129
Cerasi gummi	147	Χυλὸς δάκρυον, ὁ πὸς Gra	
Cerati Galeni vsus	480	cis confunduntur	134
Cerebella passerum	182	Cicatricem quæ inducūt	
Cerebrũ roborãtia	33.136		162
Cerebri meningum vul-		Cichorium	56
nera glutinantia.	58	Cicuta	58
Cerussa	167	Cimolia terra	177
Cessatio à vacuationibus		Cinnamomum	115
aliis, causa est saepe per		Cinnamomi atas	ibid.
accidens huius. vel hu-		Cinis hirundinum	190
ius vacuationis.	356	Cinnabaris	179
Calcanthus	164	Cirsium	55
Chalcitis	ibid. & 165	Citrage	64
Χαλυδὼς	587	Citrum	99
ΧαμαβάρϞ	109	Clarificatio succorũ quo-	
Chamadrys	57	modo fit.	538
Chamapitys	58	Clyster largior siue par-	
Chermes	190	cior quib⁹ infundit	538
Χάμη	612	Cnici semen	87
Charadas sanantia.	90	Cnici seminis dosis.	425
	138	Coccali.	98
Χοϊνίξ	613	ΚάκηϞ Orientis	25
Cholagoga	280.281	Coccus baphica	87
Chondrilla	57	κοχλιάριον	613.614
Χοῦς	610	Coctio propriè quid	278
ΧρυσοβάλανϞ	95		279
Chrysocolla	172	Coctionis signa vnde su-	
Χυλὸς	122. 133	mantur.	279
			Coct



# INDEX.

<b>Coctio expellendorum hu-</b>	<b>Composita medicamenta</b>
<b>morum abusiue apud</b> 201	
<b>practicos dicitur</b> 278	<b>Composita medicamenta</b>
<b>Coctionem iuuantia</b> 33	<b>unde nomina sumpse-</b>
95.119.120.671	<b>runt</b> 625.626
<b>Coctiones medicamento-</b>	<b>Composita non cognosci</b>
<b>rum quomodo fiut</b> 540	<b>distincte, nisi simplicia</b>
<b>Cxliacis quæ prorsus</b> 113	<b>noscantur</b> 220
114. 132.179.	<b>Composita si nobis satis-</b>
<b>Κόχλη</b> 612	<b>faciunt, quò simplicio-</b>
<b>Cognatio quadam est in</b>	<b>ra, eò meliora</b> 203
<b>sonis &amp; corporibus so-</b>	<b>Composita veterū noscū-</b>
<b>noris</b> 297	<b>tur, cognita simplicium</b>
<b>Cognatio quadam inest</b>	<b>facultate et q̃itate</b> 122
<b>rebus, naturarumq; si-</b>	<b>Comp siti forma ad quid</b>
<b>mitudo, ob quam alia</b>	<b>utilis</b> 405
<b>trahant, alia auersan-</b>	<b>Compositi forma varia-</b>
<b>tur</b> 284	<b>tur interdum, ut sit effi-</b>
<b>Colicum affectum sanā-</b>	<b>cacius medicamētū ibid.</b>
<b>tia</b> 96.290.291	<b>Compositi forma ad quos</b>
<b>Colletica quæ</b> 260	<b>scopos constituatur</b> 406
<b>Colocynthe</b> 100	<b>Compositorum vires tem-</b>
<b>Colocinthidis dosis</b> 429	<b>pore n̄ utantur</b> 419
<b>Color medicamentū gra-</b>	<b>Compositionem mediam</b>
<b>tius reddens</b> 363.364	<b>vnā habebit, qui alias</b>
<b>Colore cōmendantia</b> 147	<b>parare non p̄test, aut</b>
<b>Colophonā</b> 144	<b>circunferre</b> 675
<b>Cōmunia de p̄prio cuique</b>	<b>Compositiones particu-</b>
<b>medicam. vsu</b> 420.421	<b>lares faciendæ, qua in</b>

X



# INDEX

maiores recipiuntur	600	Cortices	115
Congius	603	Cortices radicū meliores	
Coni	98	sunt earū medullis	310
Conseruatio medicamen-		Coryza sanantia	151
torum	386. & seq.	Κόρινθ & Κορινθίων	
Conseruationi medica-		ιατρικόν	584
mentorū locus idoneus		Costus	29
eligendus	388	Κοτύλη	611. & seq.
Conseruat omnia quæ sic-		Κοτύλη etiā vid. ē dimi-	
cāt, et humiditatem ex-		diū sextarij sig.	605. 614
cremitosā absumūt	387	Κουλις vel Κολις	603
Consistentia non solum		Crassa & lēta ex pecto-	
ad gratiam, sed ad me-		reducentia	31. 36. 41.
lius agendum facit	374		60. 71. 87. 88. 93. 98
Contraria in compositio-		Crassantia	253
ne quæ dicantur	315	Crassos & lentos humo-	
Contraria contrariorum		res purgātia	33. 60. 67
remedia	214	Crocus	73
Conuulsioni, quæ reme-		Croci electio	74
dio sunt	287. 293	Crocus quō obseruā.	ibid.
Corroborantia	31. 73. 87.	Cretica terra	177
	153. 182. 187. 190	Crustas facientia	160.
Cordis palpitatiōni con-			164. 133
ferentia	31. 34. 153	Cubeba	102
Corallus	176	Cucumeris semen	85
Coriandrum	86	Cucumeris fructus	100
Cornu cerui et capræ	183	Cucumeris agrestis ra-	
Cornu rhinocerotis	ibid.	dix	30
Corruda	26	Cumini semen	87
		Cupre	



# I N D E X.

Cupressi pilule	99	Dialapvōp stomaticum	
Curcuma	29	ibidem.	
Cyanus.	172	Diacydonium Gal.	671
Κύαθ & vel cyathus		Diacydomiō Nicolai	672.
607.608.612.614		Diacidonium quibus de	
Cyclamini radix	29	tur, & qua mēsurā	456
Cydonia	99	Diacnici dosi	429
Cynan. his illinitur	30	Diacodij dosi	ibid.
Cyperis	28	Διά γλίυκε & cōposi.	67
Cyperus Indicus	29	Διά λαρυγίων puluis	455
Cyperus Babylonicus ibi.		Diamoron Galeni, &	
Cyphros compositio	631	eius vsus	673.
Cystica.	274. 292	Διά πέτρων stomatice	680
		Diarrhœas sanantia	61
D			
Asypodium	76		70
Daucus	30.	Diatrion pipereō ad quæ	
Deletaria quantitate so-		sumitur	456
la	152	Dictamni radix	30
Denarij partes	600	Dictamni radix vulga-	
Δηνάρι &	592	ris est pseudodictāni	31
Densans quod	255	Διοσκούρι quid, & ad quæ	
Dites puros eff. 122. 183		à Gal. refertur	485
Dentalis lapis	173	Diospolitici puluis quo-	
Deſictes pueros iuuā. 288		modo sumitur	456
Dentium dolori idonea		Diphryges	163
71. 146. 480		Dissoluenſo quō, & quæ	
Deſtillatio quid, & eius		preparantur	530. 531
diuerſi modi	558	Διτάλας & c.	588
Diabatinon	676	Dinitibus ſumptuoſiora	



# INDEX.

remedia miscemus quā	Ebrietati resistentia	285
pauperibus	Ebur	183
Δοι Aug	Eccatharticū quod	257
Doli & adulteria medi-	Ecphrastica	ibid.
camentorum	Ecstatica quæ	262
Dolores sedantia	Elaterium	30.100.132
Doronicum	Elenj radix	31
Δοxxuñ	Elephantiā curāt.	173.293
Drachma	Elleborus duplex	32
Drach. partes	ήμιχοϊνικον	614
Dracunculi radix	ήμικοῦλιον	611
Ducere pistillo medica-	ήμίλιτρον	501
menta quid	ήμιμναία	588
Duella	ήμιούγγιον	593
Dulcis sapor	ήμιώβολον	587
Dupondius	ήμιτάλαντον	588
Durum	ήμίξιστον	611
Durū, molle quotuplici-	Empetri facultas	428
ter dicatur corpus	Emphrastica quæ	257
ibid.	Emplaston medica.	206
Durū corpus, id est, seipso	Emplasticum quod	256
dum sanū erat, durius,	Emplastrum diachalci-	
quot modis fiat, & quo-	teos quomodo componen-	
modò mollescat	dum, & eius vsus	478
254	Endiuia	57
Dysenteriiis conferentia	Enterocœlas sanātia	174
43.61.64.70.77.13.	Epicerastica quæ	262
132.177.179.183.288.	Epilepsiā excitātia	188
289	Epilepsiam curantia	54.
<b>E</b>		92.
<b>E</b> Brietatē faciēt.		
154		



# INDEX.

92.146.182. 287. 294		F	
<i>Epilepsiam ex atra bile</i>		<b>F</b>	<i>Aba Græca</i> 602
<i>curantia</i>	173	<i>Facultas prima m.e-</i>	
<i>Epithymum</i>	74	<i>dicamēti est reliquarum</i>	
<i>Epithymi dosis</i>	425	<i>veluti basis cōs.</i>	219
<i>ἐψυμα</i>	123	<i>Facultatibus primis no-</i>	
<i>Epuloticum quod</i>	260	<i>scēdis qd satis fuerit ibi.</i>	
<i>Epyssopum</i>	75	<i>Facultas secunda quæ</i>	223
<i>Eranius lapillus</i>	175	<i>Facultates simpliciū cor-</i>	
<i>Erica</i>	75	<i>rumpi in compositione</i>	
<i>Eruca</i>	87	<i>quibusdā visum est</i>	419
<i>Eruum</i>	ibid.	<i>Facultates particulares à</i>	
<i>Erysimi semen</i>	88	<i>partibus vocatæ</i>	264
<i>Eryngij radix</i>	32	<i>Facultates particulares</i>	
<i>Eryngij succus</i>	129	<i>quatenus singulis partis</i>	
<i>Escharoticum quod</i>	259	<i>affectibus cōueniāt</i>	266
<i>Esula</i>	32	<i>Febres biliosas sanantia</i>	
<i>Euchyma quæ</i>	262	<i>ex densitate cutis</i>	73
<i>Eufragia</i>	59	<i>Februm omnium vnicū</i>	
<i>Eupatorios herba</i>	290	<i>remedium</i>	ibid.
<i>Eupatorium</i>	58. 289	<i>Febriles æstus cohibentia</i>	
<i>Eupatorium etiam Pen-</i>	65		
<i>taphyllum dicitur Ga-</i>		<i>Fella animalium</i>	186
<i>leno</i>	59	<i>Ficus</i>	103
<i>Euphorbium, vel Euphor</i>		<i>Ficiūm succus</i>	129
<i>bia</i>	137	<i>Filicis radix</i>	33
<i>Euphrosynon Græcis Bu</i>		<i>Fistulus am quæ remedio</i>	
<i>glossus dicitur</i>	55	<i>sunt</i>	177
<i>Exasperantia quæ</i>	263	<i>Flatūs dissipātia</i>	32. 33.



# INDEX.

41.48.67.83.86.87.	Furfures emendat̃ia	37	
Flos aris	162	G	
Flores quando legēdi	71.	G Agate	174
72		G Gaiacum lignum	
Fluxiones capitis siccant̃ia	113.294		
	38	Galanga	29.33
Fluxiones biliosas cohibent̃ia	65.108.180	Galbanum	138
Fluxiones thoracis siccant̃ia	38.104.177	Galenus simplicia quomodo explorabat	502
Fluxiones intestinorum siccant̃ia	38	Galeopsis	58
Fluxionum in inguina, pedes, articulos &c. & phlegmonarū incipientium remedium	177	Galla	103
Fecunditatē faciēt̃ia	67	Gallitrichum	59
Feniculus	33	Gastrica	270
Fenum graecum	88	Genista	75
Foliatum vnguentum	61	Gentiana	34
Fomēta ventriculo quomodo imponenda	481	Γιγαῖα	81
Frigida calidi obtin.	208	Gingivas mollitie fluidas quae tergent	183
Friges quas actiōes edat	237. & deinde	Glaucium	132
Fructus quid	93	Glycyrrhiza	34.132
Fructus plantarum quomodo diligendi	309	Gramen	34
Furaria	59	Γράμμα	588
		Grana paradisi	86
		Guilielmus Pelissierius Episcopus Mōpessulanus de simplicibus incognitis scripsit	108
		Gummi	145
		Gypsum	172
		H	



# INDEX.

<b>H</b>		lidam iuuantia	36
<b>H</b> Aematites	175	Hepatis quæ tollunt in-	
<b>H</b> æmodiã ab acer-		temperiem à corruptis	
bis & acidis natam sa-		humoribus	ibid.
nantia	65.228.299	Hepati quæ feris impo-	
<b>H</b> æmorrhagiam sistētia		nantur	459
	64.70.250	Hepati indurato quæ il-	
<b>H</b> æmorrhagiam à nari-		linuntur	94
bis quæ sistunt	133	Hepatica	131.184.271.
<b>H</b> æmorrhoides curātia			289
	95.173	Hepaticis quæ ratione	
<b>H</b> æmorrhoides quæ ape-		miscentur valde refri-	
riunt	130.186	gerantia	334
<b>H</b> ammoniacum	137	Hepaticis quæ prosunt	
<b>H</b> armola	67		123.289
<b>H</b> astula regia	26	Hepatoriũ, Hepatitis	59
<b>H</b> ederæ lacryma	147	<b>H</b> erbæ	49
<b>H</b> edychroi magmatis cõ-		<b>H</b> erbæ quomodo siccan-	
fectio	651	de	ibid. m.
<b>H</b> emicrania frigida qui-		<b>H</b> erbæ quedam siccate	
bis curatur	485	calidiores	ibid.
<b>H</b> emicranica remedia		<b>H</b> erbarũ quæ partes ad	
qualia esse debent	342	medicamenta accipien-	
<b>H</b> emina	605.608	de	311
<b>H</b> epar expurgantia	26.	<b>H</b> ermodaelylus	34
	45.57.65.70.90.93.	<b>H</b> ermodaelyli dos	427
	99.142.312.	<b>H</b> ermodaelylus neoteri-	
<b>H</b> epar vulpis	184	corum est veteribus in-	
<b>H</b> epatis intemperiem ca-		dielylus	35



# INDEX.

<i>Hernias sanantia</i>	151	<i>Iecur lupi</i>	184
<i>Hippolapathum</i>	61	<i>Impetigines que tollunt</i>	
<i>Humiditas quas actio-</i>	146		
<i>nes edat</i>	251	<i>Incantationibus non est</i>	
<i>Hiiores oēs pueris &amp; p-</i>		<i>habenda fides</i>	299
<i>gnantibus ducentia</i>	102	<i>Infusione quomodo &amp;</i>	
<i>Humores crudos coquen-</i>		<i>que praparantur</i>	533
<i>ti.</i>	54.62		534
<i>Hydragega</i>	282	<i>Inſtrumenta precipua</i>	
<i>Hydromelitos facultas</i>		<i>pharmacopolarum</i>	581
	428	<i>Intemperiem frigidam co</i>	
<i>Hydropicos iuuatia</i>	24.	<i>quentia</i>	38.41.124
	41.75.95.184.239.293	<i>Intemperies calidus sa-</i>	
<i>Hypercathartica q̄</i>	262	<i>nantia</i>	131.136
<i>Hyperſarcoſin que tol-</i>		<i>Intemperies frigidus hu-</i>	
<i>lunt</i>	161.172	<i>midas sanantia</i>	93.126
<i>Hypocisthis</i>	132	<i>Intertriginem curantia</i>	
<i>Hyoſcyamus</i>	60		160
<i>Hyſopum</i>	ibidem	<i>Inteſtina roboratia</i>	141
<i>Hysterica</i>	275	<i>Inteſtina puerorum pur</i>	
	I	<i>gantia</i>	174
<i>Iaſtis</i>	174.239	<i>Intybum olus</i>	56
<i>Ichoras pruritū excitā</i>	109		75
<i>tes que digerūt</i>	170	<i>Iridis radix</i>	36
<i>Ictericis que profunt</i>	26.	<i>Iris Illyrica eſt optima</i>	
	30.58.67.290.485	<i>ibidem.</i>	
<i>Iecur roborantia</i>	38 59.	<i>Iſatidis radix</i>	37
	III.114.141.142.312.	<i>Iſchiadicis que profunt</i>	
	480.671		23.32.58.75.485

Iua



# INDEX.

<i>Iua</i>	58	<i>dicamenta preparantur</i>	
<i>Iuba media</i>	112	552.553	
<i>Iuniperi fructus</i>	104	<i>Lauri folia et fructus</i>	61
<i>Iuniperi gummi</i>	148	<i>Lebes</i>	584.585
<i>Iuglans</i>	105	<i>Lenientia asperatas ca-</i>	
<i>Iuubæ</i>	104	<i>uitates quæ</i>	263
<i>Iuris galli veteris facul-</i>		<i>Lendes interimetia</i>	147
<i>tas</i>	429	<i>Lens</i>	90
	K	<i>Lentes expurgantia</i>	94
<i>Kiri</i>	76	<i>Leporam sanantia</i>	27.32
	L	37.55.90.94	
<b>L</b>	<i>Ac gignentia</i>	33	<i>Λεπτοκόρυον</i> 105
	261		<i>Λεπτόν</i> 587
<i>Lachrymæ</i>	140.141	<i>Lepus marinus</i>	286
<i>Lapathum</i>	61	<i>Λευκοίον</i>	76.77
<i>Lapiscalaminaris</i>	166	<i>Libræ partes</i>	591
<i>Lapis Iudaicus</i>	174	<i>Lichenas sanantia</i>	32.
<i>Lapides</i>	ibidem	148.168	
<i>Larix</i>	144	<i>Lienem absumentia</i>	46
<i>Lasitudo motoria</i>	70.292		
<i>phlegmoræ le quomodo</i>		<i>Lienem expurgantia</i>	45
<i>curatur</i>	340	90.94.142	
<i>Lasitudo internæ tuni-</i>		<i>Lienes induratos liquan-</i>	
<i>ca asperæ arteriæ ex vo-</i>		<i>tia</i>	27.41.46.94.138.
<i>ciferatione quomodo cu-</i>		484	
<i>randa</i>	341	<i>Lignæ</i>	112
<i>Laterum dolores tollen-</i>		<i>Ligula</i>	608
<i>tia</i>	55	<i>Ligusticum</i>	88
<i>Lauatione quomodo me-</i>		<i>Lilij radix</i>	37

X 5



# INDEX.

Limitatio vnica saepe suf- ficat ad ordinationem medicamenti	489	Lumbricos rotundos quæ educunt	289
Limitationes generales et particulares nõ inte- gra non sufficiunt	490	Lupinus	90
Limitationes etiam ne- cessarie ad rectam re- mediorum compositio- nem	493	Lutra	186
Limitationes necessariae ad rectum medicamen- torum vsum	299	Lycium	132
Limones	100	M	
Linanche	75	Macer	119
Λινάριον	89	Macis	120
Liquando fit preparatio	530	Magnes	174
Liquores	134	Maiorana	62
Lithargyros	160	Malabathrum	61
Lithargyros vt materia miscetur valentioribus	377	Malum granatum	104
Lithospermum	90	Mammæ durities discutientia	58
Λιθόσπερμον	113	Mādragoræ radicis suc- cus	129
Lumbricos latos necat	33	Mādragoræ maris ra- dicis cortex	37
Lumbricos quæ necat	51.	Māna Arabū	127.128
86.90.183		Manna thuris	155
		Manna dosis	426.427
		Maron	62
		Maron esse herbam ma- stic vulgò dictam suspi- cio est	ibidem
		Marrubium	61
		Mastice	62.141
		Matricariam esse maio- ranam suspicatur Her- mol	



# INDEX.

<i>molans</i>	63	<i>Medicamenti exhibendi</i>
<i>Μίαξα ὤμης</i>	189	<i>quantitas &amp; qualitas</i>
<i>Μηκόριον</i>	155	<i>ex iisdem sumuntur sco</i>
<i>Medicamentum quid</i>	199	<i>pis</i> 421
<i>Medicamentū simplex ib.</i>		<i>Medicamentum eius sa-</i>
<i>Medicamentorum com-</i>		<i>poris propinandum, quo</i>
<i>positio</i>	201	<i>delectetur aeger</i> 341
<i>Medicamentū vñū sim-</i>		342
<i>plex, interdum quatuor</i>		<i>Medicamenta clemētio-</i>
<i>habet scopos</i>	302	<i>ra initio offerēda</i> 466
<i>Medicamentorum vten-</i>		<i>Medicamenta valentio-</i>
<i>di modis</i>	457	<i>ra quæ indicant sumē-</i>
<i>Medicamentorum vsus</i>		<i>da</i> 343
<i>finis</i>	431	<i>Medicamenti consuetam</i>
<i>Medicamēta vsu ex-</i>		<i>nobis formam facilius</i>
<i>pectatum non præstāt,</i>		<i>toleramus, quàm non</i>
<i>nisi sint actu quod di-</i>		<i>consuetam</i> 464
<i>cuntur</i>	353	<i>Medicamenti præbendi</i>
<i>Medicamenta à quibus</i>		<i>tempus quando Galen.</i>
<i>sumantur</i>	14.15	<i>negligit</i> 419
<i>Medicamenti quibus &amp;</i>		<i>Medic. facultate quadā</i>
<i>quando vtendum</i>	415	<i>natiua convenientē sibi</i>
<i>Medicamentū vsu ex-</i>		<i>suc ū trahunt</i> 283.284
<i>pectatum non præstans</i>		<i>Medicamēta sumpta &amp;</i>
<i>quomodo corrigitur</i>	354	<i>admota non habent vi-</i>
	355.356	<i>res easdem</i> 296
<i>Medicamenti sumēdi vel</i>		<i>Medicamenta quando</i>
<i>admouendi tempus &amp;</i>		<i>D.orum manus</i> 412
<i>occasio</i>	436	<i>Medicamēta quæ curiose</i>
		<i>tere.</i>



# INDEX.

terenda	379	<i>Medicamenti deligendi</i>
<i>Medicamenta ad tempe</i>		<i>indicatio sumitur à par</i>
<i>raturam mediã aptan-</i>		<i>tis natura &amp; usu 336.</i>
<i>da</i>	205	341.422.423
<i>Medicamēta media seu</i>		<i>Medicamenta quæ gra-</i>
<i>polychrestā 341.467</i>		<i>tiora reddunt. 363</i>
<i>Medicamenta polychre-</i>		<i>Medicamenti componen-</i>
<i>sta neque multum ob-</i>		<i>di indicatio à quibus su-</i>
<i>sunt, neq; prosunt, si per</i>		<i>matur, &amp; quorum re-</i>
<i>petuò ijs utamur ibid.</i>		<i>spectu varietur 322.</i>
<i>Medicamenti valētibus</i>		323. & deinde.
<i>cum magna præmedita</i>		<i>Medicamenti sumendi,</i>
<i>tione utendum 422</i>		<i>vel admonēdi usus 431</i>
<i>Medicamen purgās vnū</i>		<i>Medicamētorū finis ibi.</i>
<i>non perpetuò usurpan-</i>		<i>Medicamenta compo-</i>
<i>dum 423</i>		<i>turo quæ noscenda 213.</i>
<i>Medicamentorū purgā-</i>		216
<i>tium delectus secūdum</i>		<i>Medicamenta compo-</i>
<i>Mesuen 305</i>		<i>ta quomodo fiant præ-</i>
<i>Medicamenta purgātia</i>		<i>stantissima 303</i>
<i>quomodo reponēda 307</i>		<i>Medicamēta optima ex</i>
<i>Medicamenta per quæ</i>		<i>contrarijs maiores mi-</i>
<i>melius fiunt 357</i>		<i>scuerunt 205.317</i>
<i>Medicamenta probata</i>		<i>Medicamentorū compo-</i>
<i>ad cōpositionem à qui-</i>		<i>nendorū necessitas 202</i>
<i>bus deliguntur 314</i>		<i>Medicamenta quadam</i>
<i>Medicamenta deligenda</i>		<i>componuntur, ut quod</i>
<i>in suo vigore &amp; bene</i>		<i>secundum naturam est</i>
<i>habita 307</i>		<i>seruamus 336</i>
		<i>Med</i>



# INDEX.

<i>Medicamenta quæ gra-</i>	<i>Melancholicum succum</i>
<i>tius faciunt, quomodo</i>	<i>purgantia</i> 41.42.172
<i>augenda vel minuenda</i>	173.323
399	<i>Melanibium</i> 90
<i>Medicamenti vehemen-</i>	<i>Melilotum</i> 77
<i>tiam quæ remittunt, eius</i>	<i>Melissaphyllon</i> 64
<i>actionem non aboleant.</i>	<i>Menses mouētia</i> 27.29
360	32.33.38.41.45.54.58.
<i>Medicamenti virtutem</i>	61.68.71.80.90.100.
<i>imbecillam quæ augment</i>	146.151.260
<i>aut excitant ibi.</i>	<i>Mensuræ Romanorum</i>
<i>Medicamēta non coau-</i>	<i>et Græcorum</i> 603
<i>gmentāda, cū paucio-</i>	<i>Mensuræ Romana ari-</i>
<i>ribus fieri potest</i> 198.	<i>dorum</i> 607
385	<i>Mensuræ aridorum At-</i>
<i>Medicamentorum com-</i>	<i>tice</i> 613
<i>positio</i> 199	<i>Mensuræ liquidorum</i>
<i>Medicamenti significa-</i>	<i>Græce</i> 609
<i>tio ibidem</i>	<i>Mensurarum Romana</i>
<i>Medicatio in quibus con-</i>	<i>rum notæ</i> 614
<i>sistit</i> 413	<i>Mensurarum Græcarū</i>
<i>Medicus prudens et pe-</i>	<i>notæ</i> 615
<i>ritus quæ nouisse debeat.</i>	<i>Mentem turbantia</i> 86
220	<i>Metalla</i> 156
<i>Mēdipov</i> 615	<i>Metallicorū facultates</i>
<i>Medulla</i> 181	<i>diu rigent</i> 310
<i>Mel</i> 125	<i>Methodus cōponēdi</i> 300
<i>Mel quod valētissimum</i>	<i>Μετρησις</i> 609
308	<i>Meum</i> 38
	<i>Mex</i>



# INDEX.

<i>Mezereon</i>	46	<i>Mvā</i>	588
<i>Meconium</i>	91	<i>Mvā ix/riku</i>	590
<i>Misy</i>	164	<i>Mumia</i>	183
<i>Mistus &amp; cōpositis quan</i>		<i>Muliebri profluvio que</i>	
<i>do vtendum</i>	618	<i>profunt</i>	44.114.132
<i>Mithridatios ad quæ uti</i>		<i>Muccilagines</i>	536
<i>lis</i>	633	<i>Myrica fructus</i>	105
<i>Mithridates</i>	628	<i>Myriophyllum</i>	64
<i>Mithridatij descriptio</i>		<i>Myrobalanus</i>	94
<i>ab Andromacha</i>	629	<i>Myrobalanorum quinq;</i>	
<i>Mithridatij descriptio à</i>		<i>genera</i>	95
<i>Damocrate</i>	630	<i>Μυροβλάνα &amp; ωίσμα</i>	
<i>Modius</i>	607	94	
<i>Molle</i>	253	<i>Myrrha</i>	148
<i>Molybdena</i>	167	<i>Myrrha stacte</i>	150
<i>Morbus quilibet qualia</i>		<i>Myrti germina</i>	105
<i>remedia postulat</i>	461	<i>Μύσγορ</i>	606.612
<i>In Morbi vigore à medi</i>		<i>Myxæ</i>	104
<i>camentis purgantibus</i>			
<i>abstinendum</i>	438		
<i>Morbilis &amp; variolis si</i>		<b>N</b>	
<i>lubria</i>	108	<i>Arcotica quate-</i>	
<i>Morsibus canū quæ me-</i>		<i>nus profunt</i>	331
<i>dentur</i>	293	<i>Narcoticis qñ vtēdū ib.</i>	
<i>Morsibus canis rabidi</i>		<i>Narcoticorum cōpositio-</i>	
<i>quæ medentur</i>	295	<i>nis scopus quis est</i>	333
<i>Morus vtraque</i>	105	<i>Nardus præstātissima</i>	38
<i>Moschus</i>	187	<i>Nardus Gallica</i>	38.39
<i>Μαχαράγου</i>	28	<i>Nardus Syriaca ibidem</i>	
		<i>Nardi electio ibidem</i>	
		<i>Nardi spica &amp; radix</i>	38
		<i>Nas</i>	



# INDEX.

Natura partis cōprehen-	Obstructiones liberantia
dit naturam totius 345	68.87.103
Naturæ proprietates assu-	Obstructionibus renum
mentis medicamen est	quæ subueniunt 26.41.
inspicienda 34	64.93
Nauseam arcent 153	ΟΧΛΟΙ 582
Nephritica 274.292	Oculi dolentis affectus si
Nephriticos curantia 193	gna unde sumantur
Nepitha 57	487
Nervorum vulnera glu-	Oculis pallor ex ictero
timantia 293	quomodo amouetur 485
Nervorum affectibus si	Oculis gratia additur
gidis quæ p̄sunt 41.94	171
Nigella 90	Oculis cruentatis conue-
Nutriendo fit prepara-	nientia 70.
tio. 531	Oculorum claritati con-
Nux vomica 98	ferentia 59.61.67.139.
Nymphæa 77	147
O	Oculorum remedia quo-
ΟΒΟΛΟΙ 588	modo applicantur 472.
Obstructiones lie-	473
rum soluentia 61.69.	Oculorum vlcera qui-
78.93	bus curanda 338
Obstructionibus hepatis	Oculorum fluxiones inhi-
quæ subueniunt 26. 33.	bentia 152.183.293
41.58.61.64.93.107.	Oculorū vulnera sanan-
290	tia 179
Obstructiones thoracis &	Oculorum obstructiones
pulmonis liberantia 107	liberantia 142
	ΟϞ



# INDEX.

Ocymum <i>ocymū</i>	91	randi	338
Odor medicamentū gra		Oculorum cicatrices pur	
tius reddens	366.367	gantia	139
Odora stomachicis mi-		Orobanche	75
scenda	367	Orthopnœæ quæ prosūt	
Odyneron quod	258	78.90.92	
Oenantes radix	40	Orthopnœa et asthma à	
Oesypus	186	crasso & lento humore	
Olea factitia	123	quali consistentia me-	
Oleum	122	dicamentū requirūt	374
Oleum succini vim hebe-		Os à corde cerui	183
tat	285	Os sepia	ibid.
Oleosus sapor	265	Ossa	182
Oliuæ halmades	106	Oxyacanthæ succus	128
ΟλμϞ	681	Oxyacanthæ bacculæ	106
Omphacium	124	ΟξύβαφϞ seu οξύβαφοι	
Opium	91.135	606.611.615	
Opio quādo utimur	332	Οξύποινιξ	97
Opobasamum	101	Ούγγια	592
Opocalpason	150		
Opopanax	136	P	
Opus Cyrenaicus: Medi-		Pæonia radix	41
cus & Syriacus	134	Papaveris gñi	91
Ophthalmia quō paran-		Parotidas curantia	92
da medicamenta	337	Pars vna organi inter-	
Origanum	64	dum subit usum duo-	
Oris halitum commen-		rum, triū, vel quatuor	
dantia	29.33.112	rationem	302
Oris affectus quibus cu-		Partem roborātia medi-	
		camētis miscentur	361
		Par	



# INDEX.

<i>Partibus natura frigidis qualia admouemus</i>	458	de petatur	23.40
<i>Partibus cauis quomodo medicamur</i>	459	<i>Petroselinū Macedoni-</i> <i>con est Hipposelinō</i>	24
<i>Partibus non abhibēda topica, nisi corpore prius toto vacuato</i>	468	<i>Petroselinō Macedoni-</i> <i>cū &amp; Estreaticū</i>	40
<i>Partum mortuū ejciētia</i>	33	<i>Peucedani radix</i>	41
<i>Partum grauidis cōtinētia</i>	176	<i>Pharmacopœi lucri hel-</i> <i>luones</i>	198
<i>Parturientibus conuenientia</i>	24.174.176	<i>Pharmacis lethalibus</i> <i>resistentia</i>	115
<i>Pauperibus remedia ex viliori materia danda</i>	346	<i>Phlegmone quæ reme-</i> <i>dia iuxta morbi tēpo-</i> <i>ra postulat</i>	342
<i>Pediculos occidunt</i>	92.147	<i>Phlegmōes curatio</i>	448
<i>Pentaphylli radix</i>	42	<i>Phlegmonas, oris, sedis,</i> <i>puddēdi, &amp; aliarū hu-</i> <i>midarum partium sa-</i> <i>nantia</i>	130.133.180
<i>Percolatio medicamentorum</i>	572	<i>Phlegmonas digerentia</i>	55.88
<i>Periclymenum</i>	77.78	<i>Phlegmonæ conuenien-</i> <i>tia</i>	23.49.124.154.167.295
<i>Pēsti resistentia</i>	43.178.183.190	<i>Phlegmonas gutturis</i> <i>sine venæ sectione quæ</i> <i>sanant</i>	288
<i>Pēstilētibus putribusq; affectibus resistentia</i>	56.99.115	<i>Phlegmonas gargareo-</i> <i>nis curātia</i>	135.171.187
<i>Petroselinum verū vn-</i>		<i>Phlegmonarum oris re-</i>	



# INDEX.

media, & q̄uo appli-	Pistacium	107
canda 674.675.678	Pituitaria	92
Phlegmonis oculorū &	Pituitam & aquas du-	
oris oleum nō infundi-	centia	282
tur 481	Pituitam crassam ducē	
Phlegmonas hepatis cu-	tia	36.47.100
rancia 147.339	Pituitā crassam à iun-	
Phlegmone stomachi &	cturis ducentia	35
ventriculi quomodo	Pituiton	144
curatur ibidem	Pyxides medicamento-	
Phlegmonis artuū quæ	rum siccorum	585
imponūtur initio 480	Plantago	64
Phlegmagog. 22.32.47	Plantaginis succus	129
87.92.95.100.132.281	Plantæ quid cum ani-	
phlegmā	malibus habeant cō-	
phlegmā palma fructus 97	mune	16
phlegmāes thymari 96	Plantæ omnes legenda,	
phlegmāes βάλαν & 96.97	quando summarum	
Phibificis quæ prosunt	sunt virium	19
74.185	Plantæ singula ex quo	
Phu 42	loco petende ibid.	
phullitis 69	Plātæ diuersimodè esse	
Phymatā curātia 90.91	runtur, modo in ma-	
Pilos quomodo auferi-	sculino, modo fæmini-	
mus 465	no, aut etiam neutro	
Piper 106.107	genere	20
Piperitis 30	Pleuretica	268
Pisces quomodo manu	Plumbum	167
capiantur 98	Pneumonica	268
	Pod	



# INDEX.

<b>Podagra</b> <i>que profunt</i>	<b>Pseudocasia</b>	118
24.36.107	<b>Pseudomelanthiū</b>	90
<b>Polypodij radix</b>	42	<b>Pseudocinnamomū</b> 118
<b>Polypodij dosis</b>	426	<b>Psora</b> 71
<b>Pomorum succus</b>	129	<b>Psoras detergentia</b> 32.
<b>Πῶμα</b>	96	37.90.94.168.
<b>Pompholyx</b>	166	<b>Psyllium</b> 91
<b>Pondo</b>	591	<b>Pterygia oculorum le-</b>
<b>Pōderum notis vulgus</b>	uantia	34
<b>medicorū iniquius rti</b>	<b>Pueri &amp; senes medica-</b>	
<b>tur</b>	602	<b>menta valentia nō fe-</b>
<b>Pondera &amp; mēsurā me</b>	runt	343
<b>dicamentorū vſitatio-</b>	<b>Pulmo vulpis</b>	185
<b>res Galeno, &amp; noſtra</b>	<b>Pulmones purgātia</b>	93
<b>atatis medicis</b>	587	<b>Pulmonum cauernulis</b>
<b>Ponderum Romanorū</b>	vel arterie asperae pus	
<b>notae ex diuerſis auto-</b>	impactum quali con-	
<b>ribus</b>	601	<b>ſiſtentia medicamen-</b>
<b>Ponderum Græcorū no</b>	tum requirit	374
<b>tae &amp; Atticorū</b>	ibi.	<b>Pumex</b> 172
<b>Populus duplex</b>	65	<b>Purgandum quādo ini-</b>
<b>Populeum vnguēiū</b>	67	<b>tio, quando ſub finem</b>
<b>Portulaca</b>	65	<b>morborum</b> 440
<b>Poterium rubrum</b>	108	<b>Purgantia medicamen-</b>
<b>Præparatio quorūdam</b>	ia qua iora danda	
<b>medicamentorum quo</b>	448.449.451	
<b>modo fiat</b>	530	<b>Purgātia vomitu quā-</b>
<b>Pruna</b>	107	<b>do danda</b> 445.446
<b>Pruni gummi</b>	148	<b>Purgatio ſeu mundatio</b>



# INDEX.

medicamentorum	578	modo secunda sequan-	
Purgatio	277	tur facultates	263
Purgationes fiunt inter		Qualitatum primarum	
dum ad precautionem		facultatē quomodo de-	
morborum	447	prehendimus	252
Purgationis tēpus	436	Quantitas simplicium	
Purgationis idoneū tē-		(dosim vocant) in com-	
pus quæ ostendūt	437	posito	390
Purgantia quomodo da-		Quantitas simpliciū in	
mus	477	cōposito à quibus indi-	
Purgatoriorū vis malefi-		cationib <sup>9</sup> sumatur	391
ca quomodo mitigetur		Quantitas remediorum	
	192	maior est, quando affe-	
Purgatoria medicamē-		ctus cum sua causa ea-	
ta	ibidem	dem postulat	393
Purgatorio medicamen-		Quantitas remediorum	
to sumpto piissima cre-		est maior, si partis af-	
mor sorbendus	444	fectæ temperatura &	
Pus mouentia	154	corporis totius est eadē	
Putredinem arcentia			394
	80.125.133.142	Quātitas euacuationis	
Pyropus	175	à quibus sumatur	435
Pyrethrum	41	Quartanas curantia	
Pyrites	175	153.173	
		Quartarius	606
<b>Q</b> ua anni parte		Quid pro quo	520
qui humores		<b>R</b>	
purgandi	453.454	Adices quando	
Qualitates primas quo		euellende	17
		<b>Ra</b>	



# INDEX.

<i>Radices integræ euellē-</i>	<i>fluum est exotica quæ-</i>
<i>de, &amp; quales</i> <i>ibid.</i>	<i>rere</i> 345
<i>Radices quomodo repo-</i>	<i>Remediorū facultas in</i>
<i>nenda &amp; ubi siccanda</i>	<i>duris augetur corpori-</i>
<i>ibi. &amp; 18</i>	<i>bus</i> 398
<i>Radices sibi alimentum</i>	<i>Renes scincorum</i> 185
<i>peculiare trahunt, in</i>	<i>Renes expurgātia</i> 142
<i>solo, &amp; sub cælo con-</i>	<i>Repercutiens quod</i> 255
<i>ueniēti</i> <i>ibidem</i>	<i>Repercutientis vis</i> 256
<i>Rarefaciens quod</i> 255	<i>Resina</i> 141
<i>Raued Seni</i> 44	<i>Resina mitissima</i> 143
<i>Remedia efficacissima</i>	<i>Resinarum humidissi-</i>
<i>quæ sunt</i> 212	<i>ma</i> 144
<i>Remedia mitiora postu-</i>	<i>Rha, Rhaon, Rheon,</i>
<i>lat sensus acrior, valē</i>	<i>Rhion radix</i> 43
<i>tiora obtusior</i> 399	<i>Rha barbarum in hor-</i>
<i>Remedia varianda pro</i>	<i>tis vulgò satum quid</i>
<i>morborū tēporibus</i> 469	<i>sit</i> 44.45
<i>Remediorum quātitas</i>	<i>Rha barbari dosis</i> 426
<i>interdum à maioribus</i>	<i>Rheu Ponticum</i> 44
<i>scrupulosius ascripta</i>	<i>Rhus</i> 108
401.402	<i>Rhyptica quæ</i> 257
<i>Remediorū genera ipsi</i>	<i>Rhibes</i> 108
<i>affectus indicant</i> 395	<i>Rosa</i> 78
<i>Remedij mensuram, &amp;</i>	<i>Rosmarinus</i> 67
<i>simplicium differētiā</i>	<i>Rubia satiuæ radix</i> 45
<i>indicantia</i> <i>ibid.</i>	<i>Rubus</i> 108.109
<i>Remedys paratu facili-</i>	<i>Ructibus acidis quæ</i>
<i>bus presentibus, super</i>	<i>profunt</i> 54



# INDEX.

<i>Ruta</i>	67	<i>Sapor cuique iucundus</i>	
		<i>quis dicitur</i>	372
<i>S</i>			
<i>S. Acchar</i>	126	<i>Sapor cuique iucundus</i>	
<i>Saccharū rubrum</i>		<i>quoad fieri potest, feri-</i>	
<i>ibidem.</i>		<i>uatis medicamenti vi-</i>	
<i>Sagapenum</i>	139	<i>ribus apparetur ibid.</i>	
<i>Sal</i>	170	<i>Sapor medicamentum</i>	
<i>Sal. Armeniacus</i>	171	<i>gratius reddens</i>	369
<i>Sal Hammoniacus</i>	ibi.	<i>Sapphyrus</i>	174
<i>Salsus sapor</i>	265	<i>Sarcocolla</i>	151
<i>Salvia</i>	67	<i>Saxnōlūā</i>	154. 166
<i>Sampsycus</i>	62		260. 205
<i>Sandaracha</i>	162	<i>Saxfīpāyop</i>	45
<i>Sanguis hirci</i>	178	<i>Scabiem &amp; pruritum</i>	
<i>Sanguis draconis</i>	179	<i>sanantia</i>	60. 94
<i>Sanguine purgātia</i>	283	<i>Scabies Hispana</i>	294
<i>Sanguinem in ventri-</i>		<i>Scabiosa</i>	70
<i>culum coagulatum dis-</i>		<i>Scammonia</i>	139
<i>soluentia</i>	180	<i>Scammonij dosis</i>	425
<i>Sanguinem reiciēibus</i>		<i>Scariola</i>	57
<i>que prosunt.</i>	28. 43. 113	<i>Scheda Galeni pharma-</i>	
	132. 146. 175. 176. 177	<i>corum purè &amp; veterū</i>	
<i>Sanguinem &amp; spiritū</i>		<i>more scribuntur</i>	188
<i>purgantia</i>	189	<i>Schistus lapis</i>	175
<i>Sanguinem per urinas</i>		<i>Sxōiv &amp;</i>	79
<i>euocantia</i>	88	<i>Scilla</i>	46
<i>Sanguinis fluorem colli-</i>		<i>Scille succus</i>	129
<i>gentia</i>	130. 172. 295	<i>Scille alba segmēta sic-</i>	
<i>Santalum</i>	113	<i>cantur in umbra</i>	46
		<i>Scil</i>	



# I N D E X.

Scilliticorum pastillorū	Sericum	ibid.	
confectio	649	Sereos species	56
Scirrhus hepatis quæ ad	Sericum crudum	190	
mouenda 340.341	Seseli	92	
Scirrhus emēdantia 18	Sextarius	603.608	
115.135.181.185	Sextula	693	
Scolopendrium 68.69	Siccitas quas edat actio		
Scopus methodi compo-	nes	248	
nēdi medicamēta 197	Sicilicus	593	
Scopus medicamētorum	Sigillum Lemniū	176	
quis sit	414	Simplex in suo genere	
Scopi componendorū me	quod præstātissimum		
dicamentorum quò di-	303.307		
rigendi	300	Simplicia medicamenta	
Scordium	68	quæ	201
Scoria.	163	Simplicia quæ in singu	
Scorpionū ictibus quæ	lis regionibus inueniā		
profunt	174	tur præstātissima	304
Semen & fructus disse	Simplicia medicamenta		
rentia	81	noscēda	215
Semina quæ adolegēda	82	Simplicia natura et tēpo	
Semina frigida	85	re cōpositis priora	216
Semen extinguetia	261	Simplicis vnius vitium	
Semē suppressoria ibi.	sepe totum cōpositū		
Semen gignentia ibid.	corrumpit	309	
Senna	110	Simplicis alicuius cur	
Sennæ dosis	427	maior, aut minor quā	
Septica quæ	259	titas miscetur cōposi	
Seres	189	to	395



# INDEX.

Simplicis quātitas ma- ior miscetur, cuius fa- cultas magis aduersa- tur morbo 396	beti, quod præstātius in suo genere, aut qua eius pars valētior 512
Simpliciū omniū, quod cunque sui generis odo- rem habet valentissi- mum, est probatissi- mum 36	Siliquastrum 30 Sinapi 92 Singultus curantia 96 Sinus glutinantia 130 482.483 Σίγειον 123
Simplicium quorundā quātitas variatur pro temporis ratione 400	Sitim sedātia 100.109 Smiris 175 Smyrniū(id est vulga- re Leuisticum)ὀλούσα τρον Romæ vocari Gal.scribit. 24
Simplicium quātitatē immutat rerū miscen- darum natura 401	Somnū cōciliātia 54.13 Sonchus 17 Soporifera 38.91.136. Sordes gymnasiōrū 186 Sori 164
Simpliciū quātitas quo modo limitanda 398	Sparagus 26 Σπάραξι 585
Simpliciū numerus ad quantitatem refertur 404	Spica vulgaris est pseu- donardus 39 Spicula extrahētia 106 293.295 Σπλάνιον 69
Simplicium quantitas ipsis autoribus inter- dum incerta 403	Splenici cōueniētia 24 rū electio ordine alpha 28.46.69.78.146.184 Sple



# INDEX.

<i>Splenica</i>	273.292	tur 124.135.154
<i>Spodium</i>	166	<i>Stomachicis</i> qua ratio-
<i>Spuma nitri</i>	169	ne miscentur valde re
<i>Squama aris</i>	162	frigerantia 334
<i>Saphis agria</i>	92	<i>Stomatica</i> medicamēta
<i>Stellio</i>	286	debent esse boni saporis
<i>Stenoticum quod</i>	255	pro cuiusq; palato 370
<i>Sternutamenta prouo-</i>		<i>Stomatica</i> cōpositiones
<i>cantia</i>	36	aliquot à 674.in fi-
<i>Stercus canis osibus nu-</i>		nem lib.
<i>triti</i>	287	<i>Stomaticis</i> quando mel
<i>Stercus pueri lupinis</i>		miscendum 380
<i>dulcibus nutriti</i>	288	<i>Stomaticis</i> quomodo vti
<i>Stercus lupi osibus nu-</i>		mur 475
<i>triti</i>	290	<i>Stomaticorū</i> & stoma-
<i>Stercus canum &amp; lupo-</i>		chicorū cōsistentia 275
<i>rum</i> 18.71		<i>Stomaticorū</i> vtendi mo-
<i>Stimmi</i>	171	di varij 677.678
<i>Stœche herba</i>	70	<i>Strobilina</i> resina 144
<i>Στοίχας</i>	79	<i>Strumis</i> conferentia 52
<i>Stœchica</i> 108.270.289		<i>Stupefaciētia</i> 15.91.136
<i>Stomachū</i> roborātia 38.		<i>Stupefaciētia</i> quare re-
155.174.270.99.107		medijs adduntur 331
108.127.141.		<i>Styrax</i> rubra 150
<i>Stomacho</i> aduersa 35.		<i>Styrax</i> 151
47.100.126.170.676		<i>Styracis</i> vis ibidem
<i>Stomachi</i> ardores curā-		<i>Succus</i> , lacryma, liquor
<i>tia</i> 96		sepe confundūtur 134
<i>Stomachicis</i> quæ miscē-		<i>Succi</i> melle aut saccharo



# INDEX.

condiuntur	121.670	Temperamentū proprie-	
Succi	121	tas obseruanda in me-	
Succorum repositio ibi.		dicamentis vt in ali-	
Succinum	152.153	mentis, & expēdendum	
Sudores mouentia	29	quomodo se habeant	
Suffusis quæ profunt		ad hæc aut illa	362
ibi. & 139.150.287		Tensio articularū quot	
Suggillata curātia	133	modis fiat, & quomo	
Sulfur	168	do laxetur	254
Sumenda manē quæ fa		Tenuantia	253
ciunt ad distributionē		Tenuitas & crassities	
alimenti in corpus	456	essentie actionem suā	
Sumendorum varius su		& aliorum interdum	
mendi modus	623	iuuant	378
Summa dicendorum in		Terebinthina	142.143
his libris	207	Terebinthina resina do-	
Suppurantia quæ	258	sis	429
Sycomorus	105	Tergentia	58.60.116.
Σύγριξ ἢ κασία	119	133.136.26.166.257	
T		Terminus pugnantis ge	
ΤΑΧΥΣΟΡ	589	nerosè contra morbum	
Tamar Indus	97	quis sit	481
Tamar Indorū dosis		Teruntur & tundūtur	
426		medicamenta quibus	
Tamarix	46	modis	571
Tapsus barbatus	71	Teruntur medicamenta	
Teles flammis iniectæ ar		propter quas causas	
dentes non consumun-		572.573	
tur	176	Τίταρτορ	711
		Tha	



# INDEX.

Thapsia	140	seruanda	18
Theriaca	634	Tripolium	47
Theriace cōpositio	652	Τρίπολις	589
Theriace decerpta ex Turbitb			47
Mitridatio	635	Turbith dosis	427
Theriace vires	661	Tunica interior vētricu	
Theriace vsus ibidem		ligallarū	183.289
Theriace probatio	662	Tussim antiquam tollē	
Theriaci pastilli quomo	tia		146
do & in quo loco sic-		Tussim ex faucium aspe	
candi	648	ritate coquentia	55
Thlaspī	92	Tusses coquētia	151.478
Thoracem & pulmonē		V	
purgantia	54.61.70.	V Aleriana	42
	96.142	Vasa latioris oris	
Thoracica	268	in genere pharmacopo	
Thus	154	larum	584
Thuris cortex	154.155	Vena & arteria quō di	
Θύρα	581	cantur simplicia	200
Thymum	71	Venarū angustos mea-	
Thymelea	46	tus tergentia	142
Tophos articulorum dis		Venenis resistentia	99.
soluentia	138.180	100.119.150.183.	
Tormentilla	42	Venenosa	60
Tota per tota miscere. so		Venenose fera morsibus	
lius Dei mun <sup>9</sup> est	201	à se factis, suis corpori-	
Tragacanthos	155	bus subueniunt	284
Tragoriganum	64	Venenatis morsibus com	
Tria in simplicibus ob-		ueniētia	30.31.32.43.



# INDEX.

49.115.168.297.478	Verrucas tollentia	93
Venerem excitantia 33.	Vigilias quomodo per re-	
87.98.185.188.293	frigerantia & hume-	
Venerem cohibentia 53.	clatia expugnamus	335
67.167	Vim medicamēti corpo-	
Ventrem purgantia il-	ri noxiam quomodo	
litu	emendamus	361
29		
Ventrem subducentia.	Vinum	123.124
59.131	Vinum protropum	123
Ventrem roborātia 131	Vinum ne acescat, cōser-	
Vētriculo vacuato qua	uantia	70
extrinsecus admouēda	Viperarum caro	190
446	Viperarū preparatio ad	
Ventriculi meatus ape-	pastillos theriacos pa-	
rientia	randos	644.645
115		
Ventriculi os confortan-	Vires easdem nō habent	
tia	sumpta et admota	130
289		
Vētriculo calidiore qui	Viscera refrigerātia	96
sunt, à quibus ledun-	Vitalem virtutem robo-	
tur	rantia	189
415		
Ventriculum roborātia	Vitiliginēs tergētia	31.
59.95.112.120.141.		37.90.94
174.480.671	Vlcerantia	58.93
Venter mergi	Vlcera carne implen-	
289	tia	166
Veratrum		
286	Vlcera purgantia	162
Veratri dosis	Vlcera siccantia	33.55.
426		
Verbascum	ibi.	13.152
71		
Verbenaca recta	Vlcera glutinantia	28.
Veruix		32.
148		



# INDEX.

32.55.64.99.130.152.	Vomitum prouocantia	
126	94.98	
Vlcerationes intestinas	Vomitum sistentia	49.
emendantia	174	108.95
Vlcera sedis & vuluæ	Vomitiorum consisten-	
curantia	186.478	tia 375
Vlcera prehumida pudē	Vretica quæ	260
dorum curantia	54	Vrinas ducentia 25.29.
Vlceribus putridis con-	32.38.41.58.59.67.	
gruentia	58.164.171.	68.71.79.83.85.87
Vlceribus oris vti medē	90.103.126.478	
dū	177.475.476.679	Vrinas crassas & cruē-
Vlceribus gula quæ ad-	tas ducentia	45.78
hibentur	176	Vrna 603
Vlceribus summè inue	Vrtice fructus	92
teratis aut rebellibus	Vstione quomodo medi-	
quæ prosunt.	68.136.	camenta preparantur
167.188.288	548.549	
Vlcera cacoëthe sanan-	Vsus rectus medicamen-	
tia	31.90	torum 412.413
Vlcus cauum quomodo	Vua	III
curamus	204	Vulnera glutinantia
Vnciæ partes	692	37.58.68.87
Vniones	190	Vulpes 188.
Vnguentorum linimē-	X	
torum, ceratorum cōsi-	Ξ Erys	610.614
stentia	Ξ Xylobalsamum.	
Vomitu quæ purgantur	101.114	
446.153.445	Xylaloe	112
	Xy	



# INDEX.

*Xylocinnamomum* 112  
*Ευλοκάσια* 119

Y

Υψιρα

Z

582

**Z** *Edoaria* 48  
*Zingiber* *ibid.*  
*Zizipha* 104  
*Zuchara* 127  
*Zurumbet* 48

FINIS.

*Handwritten signature or mark*



